

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 340 TẬP B (07.2016)

PHẦN VI

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

Quyết định: 2350/QĐ-SHTT, ngày 08/6/2016

Số đơn: 6-2015-00001 (220) Ngày nộp đơn: 14/02/2015

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số: 00048

Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chỉ dẫn địa lý : Long Khánh

Sản phẩm : Chôm chôm

Khu vực địa lý: xã Bình Lộc, xã Xuân Tân, xã Bảo Vinh, xã Bảo Quang thuộc thị xã Long Khánh; xã Xuân Định, xã Bảo Hòa thuộc huyện Xuân Lộc; xã Xuân Thiện, xã Quang Trung, xã Gia Kiệm, xã Gia Tân 3 thuộc huyện Thống Nhất; xã Sông Nhạn, xã Xuân Quế, xã Bảo Bình, xã Xuân Bảo thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (theo bản đồ khu vực địa lý nêu tại Điều 2).

Tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm

* Chôm chôm nhãn Long Khánh:

+ Màu sắc vỏ: xanh, vàng cam và vàng đỏ

+ Mùi: thơm

+ Vị: giòn, ngọt

+ Trọng lượng quả: 23,15 – 30,32 (g/quả)

+ Chiều dài quả: 38,09 – 43,13 (mm)

+ Đường kính quả: 32,85 – 35,66 (mm)

+ Độ dày vỏ: 02,86 – 03,94 (mm)

+ Độ dày cùi: 06,11 – 07,44 (mm)

+ Khối lượng cùi: 11,32 – 14,92 (g/quả)

+ Độ Brix: 17,91 – 19,42 (%)

+ Hàm lượng nước: 76,71 – 81,24 (%)

+ Hàm lượng đường tổng số: 11,18 – 18,24 (%)

+ Hàm lượng vitamin C: 09,74 – 55,25 (mg/100ml)

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 340 TẬP B (07.2016)

* Chôm chôm tróc Long Khánh:

+ Giống: chôm chôm Java

+ Màu sắc vỏ: màu đỏ và đỏ đậm

+ Râu: râu dài, dày và đuôi có đốm xanh

+ Vị: ngọt

+ Trọng lượng quả: 30,17 – 36,26 (g/quả)

+ Chiều dài quả: 41,44 – 45,54 (mm)

+ Đường kính quả: 35,10 – 38,40 (mm)

+ Độ dày vỏ: 03,21 – 04,11 (mm)

+ Độ dày cùi: 06,63 – 08,18 (mm)

+ Khối lượng cùi: 13,66 – 17,19 (g/quả)

+ Độ Brix: 17,74 – 19,45 (%)

+ Hàm lượng nước: 76,84 – 80,86 (%)

+ Hàm lượng đường tổng số: 10,57 – 13,68 (%)

+ Hàm lượng vitamin C: 14,03 – 52,89 (mg/100ml)

Tính chất đặc thù về điều kiện địa lý:

* Đặc thù về địa hình:

Khu vực địa lý có 2 dạng địa hình là địa hình đồi lượn sóng và địa hình núi thấp, trong đó địa hình đồi thoái lượn sóng chiếm trên 80% diện tích, độ dốc từ 3 - 8°.

* Đặc thù về khí hậu:

Khu vực địa lý có tổng lượng mưa trung bình cả năm từ 1630mm - 2190mm; nhiệt độ trung bình năm từ 25,4⁰C - 26,6⁰C; độ ẩm trung bình cả năm dao động từ 78,5% - 83%, tổng lượng bốc hơi trung bình năm dao động từ 1030mm - 1240mm; tổng số giờ nắng trung bình năm dao động từ 2330 giờ - 2600 giờ.

* Đặc thù về thổ nhưỡng

- Khu vực địa lý có điều kiện thổ nhưỡng đặc trưng của vùng đất đỏ ba zan, thành phần sét và thịt pha sét, độ chua trung bình pH từ 4,02 - 5,12, các cation trao đổi trong đất dao động từ mức thấp đến trung bình và dung lượng cation trao đổi (CEC) ở mức trung bình (12,33 - 17,07 meq/100g), đất giàu chất hữu cơ (1,75 - 3,33%), thành phần dinh dưỡng đa lượng ở mức trung bình đến giàu, hàm lượng lân và kali dễ tiêu (8,44 - 24,93mg/100g), hàm lượng sắt tổng số trong đất rất cao (Fe từ 12,31 - 17,95%), hàm lượng vi lượng (Mn, Cu, Zn, B...) trong đất cao.

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 340 TẬP B (07.2016)

Quy trình kỹ thuật sản xuất

Trồng và chăm sóc cây chôm chôm

- Giống cây chôm chôm: Hai giống tương ứng với 2 loại sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý là giống chôm chôm nhãn (chôm chôm nhãn Long Khánh) và chôm chôm java (chôm chôm tróc Long Khánh). Nhận giống bằng cách ghép hoặc chiết cành.

- Làm cỏ và giữ ẩm cho cây: Thực hiện làm cỏ bằng máy hoặc thủ công; giữ ẩm cho cây bằng phân hữu cơ và lá cây hoai mục sẵn có trong vườn.

- Tia cành: Sau mỗi đợt thu hoạch, cắt tia toàn bộ đọt cành, độ dài cành bấm bỏ là 30cm; tia bỏ chồi vượt; tia bỏ cành sâu bệnh, cành đan chéo ngoài tán, cành dưới tán, cành trong tán để thúc đẩy cây mọc chồi non và cho quả vụ sau.

- Chăm sóc cây để ra hoa: Xiết nước vào đầu mùa khô từ 3-6 tuần tùy độ lớn, sức sinh trưởng của cây và đặc điểm của đất.

- Bón phân: Bón phân nhử (bón ít) và tưới nhử (tưới ít) vài ngày trước khi bón đậm, tưới đậm và đều trở lại. Khi phát hoa đạt 10-15cm, tưới nước lại nhưng không tưới quá nhiều, đến khi hoa nở, giảm lượng nước tưới. Nguồn nước tưới không bị nhiễm mặn ($\text{NaCl} < 2\text{g/l}$ nước).

- Tăng đậu quả chôm chôm bằng cách: Trồng xen cây hoặc ghép cành chôm chôm đực, kết hợp nuôi ong mật trong vườn chôm chôm, phun chế phẩm Siêu Bo hoặc Ramale (pha 30cc trong 6-8 lít nước), khi gié hoa bắt đầu nở đến nở 30%, phun trên 2-3 gié hoa trên chòm của tán cây và khoảng cách chòm 2-4m, phun lặp lại 2-3 lần, cách nhau 2-3 ngày/lần.

- Theo dõi và xử lý các loại sâu bệnh trên cây: khi phát hiện sâu bệnh, sử dụng các biện pháp phòng trừ, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu hóa học, ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học và biện pháp thủ công truyền thống.

Thu hoạch và bảo quản

- Thời gian từ khi ra hoa đến thu hoạch quả khoảng 100-120 ngày. Khi quả chín, màu sắc của vỏ quả có màu từ đỏ vàng đến đỏ sậm, râu của vỏ quả đỏ nhưng chóp râu có màu vàng, xanh thay đổi tùy vào giống.

- Thu hoạch quả làm nhiều đợt, không để quả quá chín mới thu hoạch.

- Sau khi thu hoạch, cần phân loại chôm chôm, loại bỏ những quả chôm chôm sâu bệnh, bị thối, bị lép...

- Bảo quản ở nhiệt độ $10-15^{\circ}\text{C}$ trong túi PE có đục lỗ trong vòng 10 ngày, trong túi PE dày kín trong vòng 12 ngày.