



(12) **BẢN MÔ TẢ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH THUỘC BẰNG ĐỘC QUYỀN  
GIẢI PHÁP HỮU ÍCH**

(19) **Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)  
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ**

(11)



**2-0002922**

(51) **C07D 311/02; A61K 36/48**  
2020.01

(13) **Y**

(21) 2-2020-00308

(22) 07/07/2020

(45) 25/06/2022 411

(43) 25/09/2020 390A

(73) Trường Đại học Phenikaa (VN)

Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

(72) Tô Đạo Cường (VN); Ngũ Trường Nhân (VN); Nguyễn Phi Hùng (VN); Trần Mạnh Hùng (VN); Nguyễn Phương Đại Nguyên (VN); Dương Anh Tuấn (VN); Trần Đăng Thạch (VN).

(54) QUY TRÌNH PHÂN LẬP VÀ TÍNH CHẾ HỢP CHẤT DELPYXANTON B CÓ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM TỪ CÂY BỨA TRÂU (*GARCINIA DELPYANA PIERRE*)

(57) Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình phân lập và tính chế hợp chất delpyxanton B có tác dụng điều trị viêm từ vỏ thân cây Bứa trâu (*Garcinia delpyana* Pierre). Quy trình theo giải pháp bao gồm các bước: a) chuẩn bị nguyên liệu; b) chiết bột vỏ thân cây Bứa trâu; c) thu các cao chiết và phân đoạn chứa hợp chất delpyxanton B; d) thu hợp chất delpyxanton B thô; và e) tinh chế hợp chất delpyxanton B. Quy trình theo giải pháp thu được hợp chất delpyxanton B có công thức (1). Hợp chất delpyxanton B thu được từ quy trình theo giải pháp có tác dụng điều trị viêm trên cơ sở ức chế sự sản sinh NO.

### **Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập**

Giải pháp hữu ích thuộc lĩnh vực công nghệ hóa sinh và các hợp chất thiên nhiên, cụ thể là giải pháp đề cập đến quy trình phân lập hợp chất delpyxanton B từ vỏ thân cây Bứa trâu (*Garcinia delpyana* Pierre). Hợp chất delpyxanton B thu được từ quy trình theo giải pháp này có thể được sử dụng trực tiếp hoặc phối hợp với các thảo dược khác để sản xuất sản phẩm có tác dụng điều trị các bệnh viêm.

### **Tình trạng kỹ thuật của giải pháp hữu ích**

Các bệnh viêm là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh ung thư, tim mạch, Alzheimer, tiểu đường typ II, xương khớp, tự miễn dịch, thần kinh, các bệnh về phổi. Tỷ lệ nhiễm, mức độ nghiêm trọng và sự phức tạp của các bệnh này đang gia tăng nhanh chóng, từ đó làm tăng đáng kể gánh nặng chi phí về chăm sóc sức khỏe.

Có nhiều phương pháp để điều trị viêm và một trong những phương pháp hay được sử dụng phổ biến hiện nay là sử dụng thuốc. Các loại thuốc phổ biến nhất hiện nay được sử dụng để điều trị các bệnh viêm là các lớp thuốc corticosteroid, các lớp chất kháng-histamin, các lớp chất không steroid, decongestant, chất kháng cholinergic, chất ổn định tế bào Mast, v/v. (xem tài liệu của C. A. Kontogiorgis và D. J. Hadjipavlou-Litina, “Non Steroidal Anti-Inflammatory and Anti-Allergy Agents”, *Current Medicinal Chemistry*, 2002, 9, 89-98). Ngoài ra, các thuốc thay thế như thuốc kháng viêm/dị ứng không steroid (Non-steroidal alternative inflammatory drugs - NSAID) có nguồn gốc tổng hợp như clorpheniramin, cetirizin, levocetirizin, diclofenac, acuvall, bromfenac, nevanac, v/v. (xem tài liệu của W. Xiao, O. A. Oreoluwa, M. M. Heidi, “Pulmonary and Nasal Anti-Inflammatory and Anti-Allergy Inhalation Aerosol Delivery Systems”, *Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry*, 2011, 10, 215-229). Các loại thuốc này tuy đã thành công về mặt thương mại nhưng có tác dụng phụ như rối loạn tim mạch, xuất huyết dạ dày và rối loạn hô hấp.

Do đó, việc tìm kiếm các hợp chất mới có tác dụng điều trị viêm từ nguồn thiên nhiên, đặc biệt là nguồn dược thay thế cho các loại thuốc tổng hợp đã được quan tâm

và đầu tư nghiên cứu. Đối với chi Bứa (*Garcinia*), các tác giả đã phát hiện ra tác dụng kháng viêm và chống ung thư (xem tài liệu của D. S. El-Agamy, G. A. Mohamed, N. Ahmed, M. A. Elkablawy, M. A. Elfaky, W. M. Elsaed, S. G. A. Mohamed, và S. R. M. Ibrahim, “Protective Anti-Inflammatory Activity of Tovophyllin A Against Acute Lung Injury and Its Potential Cytotoxicity to Epithelial Lung and Breast Carcinomas”, *Inflammopharmacology*, 2020, 28, 153-163), kháng khuẩn (xem tài liệu của S. Nanasombat, N. Kuncharoen, B. Ritcharoen, và P. Sukcharoen, “Antibacterial activity of Thai medicinal plant extracts against oral and gastrointestinal pathogenic bacteria and prebiotic effect on the growth of *Lactobacillus acidophilus*”, *Chiang Mai Journal of Science*, 2018, 45, 33-44), chống oxy hóa (xem tài liệu của N. Aboutorab, B. Sham Baharin, R. Abdul Rahman, J. Selamat, và C.G. Hean, “Effects of indirect sonication pretreatment and solvent extraction on the xanton content and its antioxidant activities of freeze dried mangosteen (*Garcinia mangostana* Linn.) pericarp powder extracts”, *International Food Research Journal*, 2018, 25, 2453-2458), chống tăng lipid máu (xem tài liệu của B. Datchanamurthy, K. Manimekalai, và K.J. Salwe, “Evaluation of hypolipidemic activity of fruit rind extracts of *Garcinia gummigutta* in diet-induced hyperlipidemic rats”, *Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research*, 2019, 12, 104-110), kháng virus (xem tài liệu của A. Adnan, Z.N. Allaudin, H. Hani, H.S. Loh, T.J. Khoo, K.N. Ting, và R. Abdullah, “Virucidal Activity of *Garcinia parvifolia* Leaf Extracts in Animal Cell Culture”, *BMC Complementary and Alternative Medicine*, 2019 19, 169) và chống tiểu đường (xem tài liệu của G. K. Das, Satyavir, và S. B. Puranik, “Isolation of *Garcinia mangostana* Extract to Evaluate Antioxidant and Anti-Diabetic Activity in Animals”, *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Research*, 2019, 14, 10) của các cao chiết và hợp chất phân lập được. Tuy nhiên, tác dụng kháng viêm của các cao chiết cũng như các hoạt chất phân lập được từ loài Bứa trâu (*Garcinia delpyana* Pierre) lại chưa được nghiên cứu. Do đó, giải pháp sau đây đưa ra quy trình phân lập và tinh chế hợp chất delpyxanton B có tác dụng kháng viêm kết hợp sử dụng phương pháp dẫn đường sinh học. Dựa vào kết quả sàng lọc hoạt tính kháng viêm, cao chiết ete dầu hỏa (petroleum ether) được lựa chọn để tách, tinh chế hợp chất này có hoạt tính sinh học, cụ thể là có tác dụng điều trị viêm thông qua ức chế sự sản sinh oxit nitric (NO).

### Bản chất kỹ thuật của giải pháp hữu ích

Giải pháp hữu ích nhằm giải quyết vấn đề nêu trên, cụ thể là giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình phân lập và tinh chế hợp chất delpyxanton B từ vỏ thân cây Bứa trâu (*Garcinia delpyana* Pierre) có tác dụng điều trị viêm và hợp chất delpyxanton B thu được từ quy trình này.

Theo khía cạnh thứ nhất, giải pháp đề xuất quy trình phân lập và tinh chế hợp chất delpyxanton B có tác dụng ức chế sự sản sinh NO từ vỏ thân cây Bứa trâu (*Garcinia delpyana* Pierre), trong đó quy trình này bao gồm các bước:

a) chuẩn bị nguyên liệu bằng cách thu vỏ thân của cây Bứa trâu, loại bỏ tạp chất, chặt nhỏ, rửa sạch và sấy khô đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 50 đến 60°C và xay nhỏ đến kích thước khoảng 0,2 mm thu được nguyên liệu bột vỏ thân cây Bứa trâu;


b) chiết nguyên liệu bằng cách chiết nguyên liệu bột vỏ thân cây Bứa trâu với ete dầu hỏa theo tỷ lệ 1/5 (khối lượng/thể tích) sử dụng thiết bị chiết Soxhlet, thời gian chiết từ 40 đến 60 phút ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 50 đến 60°C, sau khi thu dịch chiết, loại dung môi thu cao chiết ete dầu hỏa (GDPE);

c) thu phân đoạn chứa hợp chất delpyxanton B bằng cách nhồi phân cao chiết ete dầu hỏa (GDPE) thu được ở bước b) lên cột sắc ký silica gel có kích cỡ hạt 230 đến 400 mesh, tiến hành rửa giải với hệ dung môi ete dầu hỏa/axeton lần lượt theo tỷ lệ 100/1, 30/1, 10/1, 5/1, 4/1 và 3/1 (thể tích/thể tích), thu phân đoạn ete dầu hỏa/axeton tỷ lệ 3/1 và có kí hiệu GDPE-6; cao chiết có kí hiệu GDPE-6 tiếp tục được nhồi lên cột sắc ký silica gel có kích cỡ hạt 230 đến 400 mesh, tiến hành rửa giải với hệ dung môi ete dầu hỏa/axeton lần lượt theo tỷ lệ 10/1 và 5/1 (thể tích/thể tích), thu phân đoạn ete dầu hỏa/axeton tỷ lệ 5/1 và có kí hiệu GDPE-6-2;

d) thu hợp chất delpyxanton B thô bằng cách nhồi phân cao chiết ete dầu hỏa có kí hiệu GDPE-6-2 thu được ở bước c) lên cột sắc ký silica gel có kích cỡ hạt 230 đến 400 mesh, tiến hành rửa giải với hệ dung môi diclometan/axeton lần lượt theo tỷ lệ 10/1, 4/1 và 2/1 (thể tích/thể tích), thu phân đoạn diclometan/axeton tỷ lệ 2/1 và có kí hiệu GDPE-6-2-3;

e) tinh chế hợp chất delpyxanton B bằng cách nhồi phân đoạn có kí hiệu GDPE-6-2-3 thu được ở bước d) lên cột sắc ký ODS với chất hấp phụ là silica gel pha đảo RP-18 có kích cỡ hạt 40 đến 63 µm theo tỉ lệ 1/10 (khối lượng/khối lượng) với hệ

dung môi rửa giải là axetonitril/nước (lần lượt theo tỷ lệ 2/1, 3/1 và 4/1, thể tích/thể tích), sau khi cô loại dung môi, thu được hợp chất delpyxanton B tinh thể hình kim, màu vàng và có công thức (1) sau:



Theo một phương án ưu tiên, trong đó bước chiết bằng ete dầu hỏa đều được thực hiện 3 lần.

Theo một phương án ưu tiên, trong đó hệ dung môi rửa giải trong bước thu phân đoạn chứa hợp chất delpyxanton B thô là *n*-hexan/axeton theo tỷ lệ axeton tăng dần từ 0 đến 100%.

Theo một phương án ưu tiên, trong đó còn có bước tinh sạch hợp chất delpyxanton B bằng cách hòa tan sản phẩm thu được trong hệ dung môi axeton/nước hoặc metanol/nước để thu hợp chất delpyxanton B tinh khiết trên 95%.

Theo một khía cạnh thứ hai, giải pháp đề cập đến hợp chất delpyxanton B có công thức (1) được sử dụng trực tiếp hoặc phối hợp với các thảo dược khác làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm điều trị bệnh viêm.

### Mô tả chi tiết giải pháp hữu ích

Sau đây, giải pháp được mô tả một cách chi tiết với các phương án thực hiện quy trình phân lập và tinh chế hợp chất delpyxanton B có tác dụng điều trị viêm từ vỏ thân cây Bứa trâu (*Garcinia delpyana* Pierre) và hợp chất delpyxanton B thu được từ quy trình này cùng với các ví dụ minh họa cụ thể. Tuy nhiên, các ví dụ minh họa này chỉ nhằm làm rõ bản chất của giải pháp chứ không nhằm hạn chế phạm vi yêu cầu bảo hộ của giải pháp.

Theo khía cạnh thứ nhất, giải pháp đề cập đến quy trình sản xuất hợp chất delpyxanton B có tác dụng điều trị viêm từ vỏ thân cây Bứa trâu (*Garcinia delpyana* Pierre), trong đó quy trình này bao gồm các bước: a) chuẩn bị nguyên liệu; b) chiết bột vỏ thân cây Bứa trâu; c) thu các cao chiết và phân đoạn chứa hợp chất delpyxanton B; d) chiết hợp chất delpyxanton B; e) thu hợp chất delpyxanton B thô; và f) tinh chế hợp chất delpyxanton B.


Trong bước chuẩn bị nguyên liệu, thu vỏ thân của cây Bứa trâu, loại bỏ tạp chất, chặt nhỏ, rửa sạch, sau đó sấy khô ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 40 đến 60°C và xay nhỏ (đến kích thước 0,2mm) thu được nguyên liệu bột vỏ thân cây Bứa trâu.

Trong bước chiết nguyên liệu bột vỏ thân cây Bứa trâu, tiến hành chiết ba lần phần bột thu được ở trên bằng ete dầu hỏa theo tỷ lệ 1/5 (khối lượng/thể tích) sử dụng thiết bị chiết Soxhlet với thời gian chiết từ 40 đến 60 phút ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 50 đến 60°C. Sau khi thu dịch chiết, loại dung môi dưới áp suất giảm thu cao chiết ete dầu hỏa (GDPE).

Trong bước thu phân đoạn chứa hợp chất delpyxanton B, đưa cao chiết GDPE thu được ở bước trên lên cột sắc ký silica gel có kích cỡ hạt 230 đến 400 mesh, tiến hành rửa giải với hệ dung môi ete dầu hỏa/axeton lần lượt theo tỷ lệ 100/1, 30/1, 10/1, 5/1, 4/1 và 3/1 (thể tích/thể tích), thu phân đoạn ete dầu hỏa/axeton tỷ lệ 3/1 và có kí hiệu GDPE-6; cao chiết có kí hiệu GDPE-6 tiếp tục được nhồi lên cột sắc ký silica gel có kích cỡ hạt 230 đến 400 mesh, tiến hành rửa giải với hệ dung môi ete dầu hỏa/axeton lần lượt theo tỷ lệ 10/1 và 5/1 (thể tích/thể tích), thu phân đoạn ete dầu hỏa/axeton tỷ lệ 5/1 và có kí hiệu GDPE-6-2.

Trong bước thu hợp chất delpyxanton B thô, đưa phân đoạn có kí hiệu có kí hiệu GDPE-6-2 thu được ở bước trên lên cột sắc ký silica gel có kích cỡ hạt 230 đến 400 mesh, tiến hành rửa giải với hệ dung môi diclometan/axeton lần lượt theo tỷ lệ 10/1, 4/1 và 2/1 (thể tích/thể tích), thu phân đoạn diclometan/axeton tỷ lệ 2/1 và có kí hiệu GDPE-6-2-3;

Trong bước thu hợp chất delpyxanton B tinh, đưa phân đoạn có kí hiệu GDPE-6-2-3 thu được ở bước trên lên cột sắc ký ODS với chất hấp phụ là silica gel pha đảo RP-18 có kích cỡ hạt 40 đến 63 µm theo tỉ lệ 1/10 (khối lượng/khối lượng) với hệ dung môi rửa giải là axetonitril/nước (lần lượt theo tỷ lệ 2/1, 3/1 và 4/1, thể tích/thể tích), sau khi cô loại dung môi, thu được hợp chất delpyxanton B tinh thể hình kim, màu vàng và có công thức (1) sau:



Theo một phương án ưu tiên, trong đó hệ dung môi rửa giải trong bước thu phân đoạn chứa hợp chất delpyxanton B thô là *n*-hexan/axeton theo tỷ lệ axeton tăng dần từ 0 đến 100%.

Theo một phương án ưu tiên, trong đó còn có bước tinh sạch hợp chất delpyxanton B bằng cách hòa tan sản phẩm thu được trong hệ dung môi axeton/nước hoặc metanol/nước để thu hợp chất delpyxanton B tinh khiết trên 95%.

Theo một khía cạnh thứ hai, giải pháp đề cập đến hợp chất delpyxanton B thu được bằng quy trình theo giải pháp, trong đó hợp chất delpyxanton B có công thức (1) được sử dụng trực tiếp hoặc phối hợp với các thảo dược khác làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm điều trị bệnh viêm.

### **Ví dụ thực hiện giải pháp hữu ích**

*Ví dụ 1: Phân lập và tinh chế hợp chất delpyxanton B từ vỏ thân cây Bứa trâu (Garcinia delpyana Pierre).*

Thu vỏ thân cây Bứa trâu, loại bỏ tạp chất, chặt nhỏ, rửa sạch, sấy khô ở nhiệt độ khoảng 60°C đến khối lượng không đổi sau đó nghiền nhỏ thành bột (có kích thước 0,2mm) và thu được 2kg bột. Phần bột này được chiết ba lần bằng ete dầu hỏa (3 x 10L) sử dụng thiết bị chiết Soxhlet với thời gian chiết khoảng 60 phút ở nhiệt độ nằm trong khoảng 60°C, sau khi cô quay loại bỏ dung môi thu được cao ete dầu hỏa (GDPE 64g). Cao chiết GDPE (64g) được đưa lên cột sắc ký với chất hấp phụ là silica gel (có kích cỡ hạt 230 đến 400 mesh) và hệ dung môi rửa giải là ete dầu hỏa/axeton theo tỷ lệ 100/1, 30/1, 10/1, 5/1, 4/1 và 3/1 (thể tích/thể tích) thu được phân đoạn có tỷ lệ ete dầu hỏa/axeton là 3/1 và có kí hiệu là GDPE-6 (9,3g). Phân đoạn GDPE-6 (9,3g) tiếp tục được đưa lên cột sắc ký với chất hấp phụ là silica gel (có kích cỡ hạt 230 đến 400 mesh) và hệ dung môi rửa giải là ete dầu hỏa/axeton theo tỷ lệ 10/1 và 5/1 (thể tích/thể tích) thu được phân đoạn có tỷ lệ ete dầu hỏa/axeton là 5/1 và có kí hiệu là GDPE-6-2 (700mg). Phân đoạn GDPE-6-2 (700mg) tiếp tục được đưa lên cột sắc ký với chất hấp phụ là silica gel (có kích cỡ hạt 230 đến 400 mesh) và hệ dung môi rửa giải là diclometan/axeton lần lượt theo tỷ lệ 10/1, 4/1 và 2/1 (thể tích/thể tích) thu được phân đoạn có tỷ lệ diclometan/axeton là 2/1 và có kí hiệu là GDPE-6-2-3 (150mg). Hòa tan phân đoạn có kí hiệu GDPE-6-2-3 (150mg) lên cột sắc ký ODS với chất hấp phụ là silica gel pha đảo RP-18 (có kích cỡ hạt 40 đến 63µm) theo tỉ lệ 1/10 (khối lượng/khối lượng) với hệ dung môi rửa giải là axetonitril/nước (lần lượt theo tỷ lệ 2/1, 3/1 và 4/1,

thể tích/thể tích) thu được hợp chất có tên là delpyxanton B (15 mg) có công thức (1) tinh thể hình kim, màu vàng.

*Ví dụ 2: Định tính và định lượng hợp chất delpyxanton B được phân lập và tinh chế từ vỏ thân cây Bứa trâu.*

Hợp chất tinh thể hình kim, màu vàng thu được ở Ví dụ 1 được xác định về mặt định tính và định lượng bằng các phương pháp đã biết trong lĩnh vực kỹ thuật này. Kết quả như sau:

*Đặc tính của hợp chất delpyxanton B có công thức (1)*

- Tên theo IUPAC: 2-(3,7-dimetylocta-2,6-dienyl)-1,3-dihydroxy-6,7-dimetoxyxanten-9-on.

- Mô tả: Hợp chất tinh thể hình kim, màu vàng, tan tốt trong dung môi chloroform. Xác định định tính bằng sắc ký lớp mỏng trên bản mỏng silica gel pha đảo tráng sẵn 60 RP-18 F<sub>254</sub>S (Merck), dung môi triển khai là *n*-hexan/axeton = 5/1 (v/v); *R<sub>f</sub>* = 0,45.

- CTPT: C<sub>25</sub>H<sub>28</sub>O<sub>6</sub> (M=424).

- Phổ khối phân giải cao HREIMS *m/z* 425,1696 [M + H]<sup>+</sup>.

- Phổ cộng hưởng từ hạt nhân: <sup>1</sup>H-NMR (500 MHz, CDCl<sub>3</sub>) δ<sub>H</sub> (ppm): 6,38 (1H, s, H-4); 6,86 (1H, s, H-5); 7,57 (1H, s, H-8); 3,45 (2H, brd, *J* = 7,0 Hz, H-11); 5,31 (1H, dt, *J* = 1,0; 7,0 Hz, H-12); 2,07-2,13 (4H, m, H-14/H-15); 5,06 (1H, t, *J* = 7,0 Hz, H-16); 1,60 (3H, s, H-18); 1,84 (3H, s, H-19); 1,68 (3H, s, H-20); 13,39 (1H, s, 1-OH); 3,98 (3H, s, 6-OCH<sub>3</sub>); 4,00 (3H, s, 7-OCH<sub>3</sub>); <sup>13</sup>C-NMR (125 MHz, CDCl<sub>3</sub>) δ<sub>C</sub> (ppm): 160,2 (C-1); 108,7 (C-2); 162,2 (C-3); 94,1 (C-4); 156,0 (C-4a); 99,5 (C-5); 155,6 (C-6); 146,7 (C-7); 114,7 (C-8); 113,3 (C-8a); 179,9 (C-9); 103,2 (C-9a); 152,4 (C-10a); 21,4 (C-11); 121,2 (C-12); 139,9 (C-13); 39,7 (C-14); 26,4 (C-15); 123,7 (C-16); 132,2 (C-17); 17,7 (C-18); 16,3 (C-19); 25,7 (C-20); 56,5 (6-OCH<sub>3</sub>); 56,4 (7-OCH<sub>3</sub>).

Cấu trúc hóa học của hợp chất có công thức (1) được so sánh với cơ sở dữ liệu về hợp chất hóa học và khẳng định rằng hợp chất có công thức (1) là hợp chất có tên delpyxanton B.

*Ví dụ 3: Xác định hoạt tính ức chế sự sản sinh NO của hợp chất delpyxanton B phân lập từ vỏ thân cây Bứa trâu (Garcinia delpyana Pierre) trên dòng đại thực bào RAW 264.7.*

+ Nuôi cấy tế bào:

Tế bào RAW 264,7 được nuôi trong môi trường DMEM-F12, FBS 10% đến độ phủ 70–80%, sau đó tế bào được cấy chuyển vào đĩa 96 giếng để thực hiện thí nghiệm với các thay đổi về nồng độ LPS, mật độ tế bào, các điều kiện gây đối tế bào, thời gian ủ với LPS. Sau đó, 50µL dịch nổi trong đĩa 96 giếng nuôi tế bào (sau khi đã ủ với LPS và đạt được các chỉ tiêu về thời gian và thành phần thí nghiệm) được chuyển sang đĩa 96 giếng khác và bổ sung một thể tích 50µL thuốc thử Griess, ủ 10 phút. Đo OD bước sóng 550nm.

+ Phương pháp xác định hoạt tính ức chế sự sản sinh NO của hợp chất delpyxanton B phân lập từ vỏ thân cây Bứa trâu (*Garcinia delphyana* Pierre).

Tế bào RAW 264,7 được cấy vào đĩa 96 giếng với mật độ  $10^4$  tế bào/giếng, ủ trong 12 giờ ở điều kiện 37°C, 5% CO<sub>2</sub>. Hút bỏ môi trường cũ và thay thế bằng môi trường chứa 1% FBS, ủ trong 6 giờ. Sau đó, thay môi trường cũ bằng môi trường có chứa hợp chất delpyxanton B (hoặc đối chứng dương-Celastrol) ở các nồng độ khác nhau và LPS nồng độ 0,5µg/mL, ủ 24 giờ. Hút 50µL dịch nổi trong mỗi giếng sang đĩa 96 giếng khác và bổ sung 50µL thuốc thử Griess, ủ 10 phút. Đo OD tại bước sóng 550nm. Khả năng ức chế sự sản sinh NO được tính bằng công thức:

$$\text{Khả năng ức chế} = \frac{\text{OD}_{550\text{nm}} \text{ kích thích LPS không trị liệu} - \text{OD}_{550\text{nm}} \text{ kích thích được trị liệu}}{\text{OD}_{550\text{nm}} \text{ kích thích LPS không trị liệu} - \text{OD}_{550\text{nm}} \text{ không kích thích LPS}} \times 100 (\%)$$

Bảng 1. Hoạt tính ức chế sự sản sinh NO của hợp chất delpyxanton B phân lập từ vỏ thân cây Bứa trâu

| Hợp chất      | IC <sub>50</sub> (µM) |
|---------------|-----------------------|
| Delpyxanton B | 28,2 ± 0,9            |
| Celastrol     | 1,0 ± 0,1             |

Tác dụng ức chế sự sản sinh NO của hợp chất delpyxanton B được thể hiện ở bảng 1. Hợp chất delpyxanton B có tác dụng ức chế trung bình sự sản sinh NO với giá trị IC<sub>50</sub> = 28,2 ± 0,9 (µM) so với chất đối chứng dương-Celastrol (IC<sub>50</sub> = 1,0 ± 0,1 µM). Với tác dụng ức chế trung bình sự sản sinh NO, hợp chất delpyxanton B có tiềm năng trong điều trị viêm, từ đó định hướng hợp chất delpyxanton B có/hoặc không phối hợp với các thảo dược khác làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm có tác dụng điều trị bệnh viêm.

### Hiệu quả đạt được của giải pháp hữu ích

Quy trình của giải pháp hữu ích cho phân lập và tinh chế hợp chất delpyxanton B với độ tinh khiết  $> 95\%$  từ vỏ thân cây Bứa trâu (*Garcinia delphyana* Pierre) với hiệu suất chiết cao và có tác dụng điều trị viêm trên cơ sở ức chế trung bình sự sản sinh NO. Bằng cách sử dụng sắc ký cột và điều chỉnh hệ dung môi tối ưu, quy trình cho phép chiết được hoạt chất có hiệu suất chiết cao, từ đó mở ra một hướng sản xuất có khả năng cung cấp nguyên liệu cho ngành dược trên cơ sở các hoạt chất có nguồn gốc từ tự nhiên.

Hợp chất delpyxanton B thu được từ quy trình theo giải pháp đã được chứng minh có tác dụng điều trị viêm trên cơ sở ức chế trung bình sự sản sinh NO. Bằng cách sử dụng sắc ký cột kết hợp với hệ dung môi tối ưu, quy trình theo giải pháp cho phép thu được hoạt chất delpyxanton B có tác dụng ức chế trung bình sự sản sinh NO. Hợp chất delpyxanton B theo giải pháp có tiềm năng phát triển thành dược phẩm hoặc thực phẩm chức năng hỗ trợ trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh viêm.

## YÊU CẦU BẢO HỘ

1. Quy trình phân lập và tinh chế hợp chất delpyxanton B có tác dụng kháng viêm từ cây Bứa trâu (*Garcinia delopyana* Pierre), trong đó quy trình này bao gồm các bước:


a) chuẩn bị nguyên liệu bằng cách thu vỏ thân của cây Bứa trâu, loại bỏ tạp chất, chặt nhỏ và sấy khô đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 40 đến 60°C và xay nhỏ đến kích thước khoảng 0,2mm thu được nguyên liệu bột vỏ thân cây Bứa trâu;

b) chiết nguyên liệu bằng cách chiết nguyên liệu bột vỏ thân cây Bứa trâu với ete dầu hỏa theo tỷ lệ 1/5 (khối lượng/thể tích) sử dụng thiết bị chiết Soxhlet, thời gian chiết từ 40 đến 60 phút ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 50 đến 60°C, sau khi cất loại dung môi thu được phần cao chiết;

c) thu phân đoạn chứa hợp chất delpyxanton B bằng cách nhồi phần cao chiết thu được ở bước b) lên cột sắc ký silica gel có kích cỡ hạt 230 đến 400 mesh, tiến hành rửa giải với hệ dung môi ete dầu hỏa/axeton theo tỷ lệ 100/1, 30/1, 10/1, 5/1, 4/1 và 3/1 (thể tích/thể tích) thu được phân đoạn có tỷ lệ ete dầu hỏa/axeton là 3/1 và phân đoạn có tỷ lệ ete dầu hỏa/axeton là 3/1 tiếp tục được nhồi lên cột sắc ký với chất hấp phụ là silica gel (có kích cỡ hạt 230 đến 400 mesh) và hệ dung môi rửa giải là ete dầu hỏa/axeton theo tỷ lệ 10/1 và 5/1 (thể tích/thể tích) thu được phân đoạn có tỷ lệ ete dầu hỏa/axeton là 5/1;

d) thu hợp chất delpyxanton B thô bằng cách nhồi phân đoạn ete dầu hỏa/axeton là 5/1 thu được ở trên lên cột sắc ký với chất hấp phụ là silica gel (có kích cỡ hạt 230 đến 400 mesh) và hệ dung môi rửa giải là diclometan/axeton lần lượt theo tỷ lệ 10/1, 4/1 và 2/1 (thể tích/thể tích) thu được phân đoạn có tỷ lệ diclometan/axeton là 2/1; và

e) tinh chế hợp chất delpyxanton B bằng cách nhồi phân đoạn có tỷ lệ diclometan/axeton là 2/1 lên cột sắc ký ODS với chất hấp phụ là silica gel pha đảo RP-18 có kích cỡ hạt 40 đến 63µm theo tỉ lệ 1/10 (khối lượng/khối lượng) với hệ dung môi rửa giải là axetonitril/nước theo tỷ lệ 2/1, 3/1, và 4/1 (thể tích/thể tích), sau khi cô loại dung môi, thu được hợp chất delpyxanton B tinh thể hình kim, màu vàng và có công thức (1):



(1)