



(12) BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ THUỘC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

(19) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

(11)



1-0052561

(51)⁷ A61K 31/713

(13) B

(21) 1-2017-01700

(22) 09/10/2015

(86) PCT/US2015/054881 09/10/2015

(87) WO 2016/057893 14/04/2016

(30) 62/062,751 10/10/2014 US; 62/147,976 15/04/2015 US; 62/214,602 04/09/2015 US

(45) 27/10/2025 451

(43) 25/05/2018 362A

(73) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. (US)

300 Third Street, Cambridge, MA 02142, United States of America

(72) QUERBES, William (US); FITZGERALD, Kevin (US); BETTENCOURT, Brian (US); LIEBOW, Abigail (US); ERBE, David, V. (US).

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.)

(54) CHẤT CAN THIỆP ARN (RNAI) SỢI KÉP CÓ TÁC DỤNG ỨC CHẾ SỰ BIỂU HIỆN GEN HAO1 (HYDROXYAXIT OXIDAZA 1 (GLYCOLAT OXIDAZA)), CHẾ PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM CHỨA NÓ

(21) 1-2017-01700

(57) Sáng chế đề cập đến tác nhân ARNi, ví dụ tác nhân ARNi sợi kép, có tác dụng ức chế sự biểu hiện gen HAO1 (hydroxyaxit oxidaza 1 (glycolat oxidaza)). Tác nhân ARNi theo sáng chế có gần như tất cả các nucleotit được biến đổi có tác dụng ức chế gen HAO1 trong tế bào, chẳng hạn như tế bào ở đối tượng, ví dụ, động vật có vú, chẳng hạn như người mắc rối loạn có liên quan đến HAO1. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm và dược phẩm chứa tác nhân ARNi nêu trên.

```
(SEQ ID NO:1) .
>gi|11184232|ref|NM_017545.2| Hydroxyaxit oxidaza (glycolat oxidaza) 1 (HAO1)Homo sapiens, mRNA
CTGGGATAGCAATAACCTGTGAAAATGCTCCCCGGCTAATTTGTATCAATGATTATGAACAACATGCTA
AATCAGTACTTCCAAAGTCTATATATGACTATTACAGGTCTGGGGCAAATGATGAAGAACTTTGGCTGA
TAATATTGCAGCATTTTCCAGATGGAAGCTGTATCCAAGGATGCTCCGGAATGTTGCTGAAACAGATCTG
TCGACTTCTGTTTTAGGACAGAGGGTCAGCATGCCAATATGTGTGGGGGTACGGCCATGCAGCGCATGG
CTCATGTGGACGGCGAGCTTGCCACTGTGAGAGCCTGTCAGTCCCTGGGAACGGGCATGATGTTGAGTTC
CTGGGCCACCTCCTCAATTGAAGAAGTGGCGGAAGCTGGTCTCTGAGGCACCTTCGTTGGCTGCAACTGTAT
ATCTACAAGGACCGAGAAGTCACCAAGAAGCTAGTGCGGCAGGCAGAGAAGATGGGCTACAAGGCCATAT
TTGTGACAGTGGACACACCTTACCTGGGCAACCGTCTGGATGATGTGCGTAACAGATTCAAACCTGCCGCC
ACAACTCAGGATGAAAAATTTTGAACCAAGTACTTTATCATTTTCTCCTGAGGAAAAATTTGGAGACGAC
AGTGGACTTGCTGCATATGTGGCTAAAGCAATAGACCATCTATCAGCTGGGAAGATATCAAATGGCTGA
GAAGACTGACATCATTGCCAATTGTTGCAAAGGGCATTTTGAGAGGTGATGATGCCAGGGAGGCTGTTAA
ACATGGCTTGAATGGGATCTTGGTGTGCAATCATGGGGCTCGACAACCTCGATGGGGTGCCAGCCATATT
GATGTTCTGCCAGAAATTGTGGAGGCTGTGGAAGGGAAGGTGGAAGTCTTCTGGACGGGGGTGTGCGGA
AAGGCACTGATGTTCTGAAAGCTCTGGCTCTTGGCGCAAGGCTGTGTTTGTGGGGAGACCAATCGTTTG
GGCTTAGCTTTCCAGGGGGAGAAAGGTGTTCAAGATGTCTCGAGATACTAAAGGAAGAATTCCGGTTG
GCCATGGCTCTGAGTGGGTGCCAGAATGTGAAAGTCATCGACAAGACATTGGTGAGGAAAAATCCTTTGG
CCGTTTCCAAGATCTGACAGTGCACAATATTTTCCCATCTGTATTATTTTTTTCAGCATGTATTACTTG
ACAAAGAGACACTGTGCAGAGGGTGACCACAGTCTGTAATCCCCACTTCAATACAAAGGGTGTGTTCT
TTTCCAACAAAATAGCAATCCCTTTTATTTTCAATTGCTTTTGACTTTTCAATGGGTGTCCTAGGAACCTTT
TAGAAAGAAATGGACTTTCATCCTGGAATATATTAAGTGTAAAGAAAGAAACATTGAAAATGTGTTTAG
ACAACGTCATCCCTGGCAGGCTAAAGTGCTGTATCCTTTAGTAAATTTGGAGGTAGCAACACTAAGGT
GAAAAGATAATGATCTCATTGTTTATTAACTGTATTCTGTTTACATGTCTTTAAACAGTGGTTCTTAA
ATTGTAAGCTCAGGTTCAAAGTGTGGTAATGCCTGATTACAACCTTTGAGAAGGTAGCACTGGAGAGAA
TTGGAATGGGTGGCGGTAATTGGTGATACTTCTTTGAATGTAGATTTCCAATCACATCTTTAGTGTCTGA
ATATATCCAAATGTTTTAGGATGTATGTTACTTCTTAGAGAGAAATAAAGCATTTTTGGGAAGAAT
```

HÌNH 1

Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập

Sáng chế đề cập đến việc ức chế đặc hiệu sự biểu hiện của gen HAO1. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến tác nhân ARNi sợi kép có tác dụng ức chế sự biểu hiện của gen HAO1 (hydroxyaxit oxidaza 1 (glycolat oxidaza)). Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm và được phẩm chứa tác nhân này.

Tình trạng kỹ thuật của sáng chế

Chứng tăng oxalat niệu nguyên phát Typ 1 (PH1) là rối loạn lặn nhiễm sắc thể thường của sự chuyển hóa glyoxylat. Sự giải độc glyoxylat ở gan bị suy yếu do sự đột biến của gen AGXT, mà mã hóa cho enzym alanin-glyoxylat aminotransferaza (AGT) ở thể peroxi ở gan. AGT1 là enzym cuối cùng trong sự phá vỡ chuyển hóa của hydroxyprolin. Sự mất chức năng AGT để biến đổi chất chuyển hóa trung gian glyoxylat thành glyxin gây ra sự tích lũy và sự khử glyoxylat thành glycolat mà được oxy hóa thành oxalat bằng enzym glycolat oxidaza (GO), còn được gọi là hydroxyaxit oxidaza (HAO1).

Sự điều hòa của glyoxylat, tiền chất then chốt của oxalat, xảy ra ở nhiều vị trí trong tế bào bao gồm ty thể, thể peroxi và bào tương. Oxalat dư thừa ở bệnh nhân PH1 không thể được bài tiết hoàn toàn bởi thận dẫn đến sự tạo thành và sự lắng đọng của tinh thể canxi oxalat ở thận và đường tiết niệu. Sự tổn hại thận được gây ra bởi sự kết hợp của độc tố hình ống từ oxalat, chứng nhiễm canxi thận và sự tắc nghẽn thận bởi sỏi. Hơn 30% bệnh nhân tiến tới bệnh thận giai đoạn cuối (ESRD).

Gen HAO1 mã hóa cho enzym Hydroxyaxit Oxidaza 1, còn được gọi là Glycolat Oxidaza ("GO"). Protein HAO1 được biểu hiện chủ yếu ở gan và là 2-hydroxyaxit oxidaza có hoạt tính nhất trên glycolat.

Ở mẫu chuột mắc PH1, khi gen AGT1 bị làm khuyết, hàm lượng oxalat trong nước tiểu được giảm đi khi gen HAO1 bị làm khuyết.

PH1, AGXT, và HAO1 được mô tả trong tài liệu dưới đây: Angel L. Pey, Armando Albert, và Eduardo Salido, "Protein Homeostasis Defects of Alanine-Glyoxylate

- 2 -

Aminotransferase: New Therapeutic Strategies in Primary Hyperoxaluria Type I," BioMed Research International, vol. 2013, Bài báo ID 687658, 15 trang, 2013.

doi:10.1155/2013/687658; Cochat và Rumsby (2013) NEJM 369:7; Salido và cộng sự (2006) PNAS 103:18249; Baker và cộng sự (2004) American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology Công bố ngày 1 tháng 10 năm 2004 Vol. 287 no. 4, H1771-H1779 DOI: 10.1152/ajpheart.00234.2004.

Bản chất kỹ thuật của sáng chế

Sáng chế đề xuất hợp phần có chứa tác nhân ARNi, ví dụ, tác nhân iARN mạch kép, hướng đích HAO1. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp sử dụng hợp phần theo sáng chế để ức chế sự biểu hiện HAO1 và để điều trị các rối loạn kết hợp HAO1, ví dụ, PH1.

Mô tả vắn tắt các hình vẽ

Hình 1 thể hiện trình tự nucleotit của mARN HAO1 *Homo sapiens* (SEQ ID NO:1).

Hình 2 thể hiện trình tự nucleotit của mARN HAO1 *Mus musculus* (SEQ ID NO:2).

Hình 3A là biểu đồ với kết quả của việc sàng lọc in vitro của thể liên hợp GalNac-siARN GO (HAO) trong tế bào gan khỉ cynomolgous sơ cấp.

Hình 3B là biểu đồ với đường cong đáp ứng liều lượng của thể liên hợp GalNac-siARN GO (HAO) trong tế bào gan khỉ cynomolgous sơ cấp.

Hình 4A là biểu đồ với kết quả của sự đánh giá in vivo của thể liên hợp GalNac-siARN GO (HAO) ở chuột C57B6 sau liều lượng đơn lẻ.

Hình 4B là biểu đồ với kết quả của sự đánh giá in vivo của thể liên hợp GalNac-siARN GO (HAO) ở chuột C57B6 sau liều lượng lặp lại.

Hình 5A là biểu đồ thể hiện hàm lượng oxalat trong nước tiểu ở chuột bị bất hoạt (KO) AGXT sau khi điều trị bằng thể liên hợp GalNac-siARN GO (HAO).

Hình 5B là biểu đồ thể hiện hàm lượng glycolat trong nước tiểu ở chuột KO AGXT sau khi điều trị bằng thể liên hợp GalNac-siARN GO (HAO).

Hình 6A là biểu đồ thể hiện hàm lượng mARN AGXT ở mẫu chuột nhất mắc PH1 72 giờ sau liều lượng đơn lẻ của siARN AGXT.

- 3 -

Hình 6B là biểu đồ thể hiện hàm lượng oxalat trong nước tiểu ở mẫu chuột nhắt mắc PH1 72 giờ sau khi điều trị bằng thể liên hợp GalNac-siARN GO (HAO).

Hình 6C là biểu đồ thể hiện hàm lượng oxalat trong nước tiểu ở mẫu chuột nhắt mắc PH1 được theo dõi trong 49 ngày với việc dùng liều lượng hàng tuần liên tục vào ngày 14 và 21 của cả AF-011-63102 và AD-62994 và lấy nước tiểu 24 giờ như được thể hiện.

Hình 6D là biểu đồ thể hiện khoảng thời gian bất hoạt HAO1 ở chuột nhắt. Được thể hiện là hàm lượng mARN một tuần hoặc bốn tuần sau khi kết thúc 4 liều lượng (tương ứng với ngày 28 và 49 trên Hình 6C) và được biểu diễn tương ứng với hàm lượng được phát hiện thấy ở chuột nhắt được điều trị bằng PBS.

Hình 7 thể hiện mạch bổ sung ngược chiều của trình tự nucleotit của mARN HAO1 *Homo sapiens* (SEQ ID NO:3).

Hình 8 thể hiện mạch bổ sung ngược chiều của trình tự nucleotit của mARN HAO1 *Mus musculus* (SEQ ID NO:4).

Hình 9 thể hiện trình tự nucleotit của mARN HAO1 *Macaca fascicularis* (SEQ ID NO:5).

Hình 10 thể hiện trình tự nucleotit của mARN HAO1 *Rattus norvegicus* (SEQ ID NO:6).

Hình 11 thể hiện mạch bổ sung ngược chiều của trình tự nucleotit của mARN HAO1 *Macaca fascicularis* (SEQ ID NO:7).

Hình 12 thể hiện mạch bổ sung ngược chiều của trình tự nucleotit của mARN HAO1 *Rattus norvegicus* (SEQ ID NO:8).

Hình 13 thể hiện sự sàng lọc in vivo của thể liên hợp GO GalNac.

Hình 14 là biểu đồ thể hiện sự đánh giá in vivo của thể liên hợp GO-GalNac ở chuột.

Hình 15 là biểu đồ thể hiện sự đánh giá đáp ứng liều lượng của thể liên hợp GO-GalNac ở chuột.

Hình 16 là biểu đồ thể hiện sự đánh giá đáp ứng liều lượng của thể liên hợp GO-GalNac ở chuột.

Hình 17 là biểu đồ thể hiện sự đánh giá đáp ứng liều lượng ở chuột.

- 4 -

Hình 18 là hai biểu đồ thể hiện mối quan hệ của sự bất hoạt mARN với hàm lượng glycolat trong huyết thanh ở chuột.

Hình 19 là hai biểu đồ thể hiện mối quan hệ của sự bất hoạt mARN với hàm lượng glycolat trong huyết thanh ở chuột nhắt.

Hình 20 là biểu đồ thể hiện sự ức chế phụ thuộc liều lượng của mARN HAO1 bởi ALN-65585 ở tế bào gan cyno sơ cấp.

Hình 21 là hai biểu đồ thể hiện hàm lượng mARN HAO1 và hàm lượng glycolat trong huyết thanh sau khi điều trị liều đơn lẻ bằng ALN-GO1 ở chuột.

Hình 22 là biểu đồ thể hiện khoảng thời gian của việc làm câm mARN HAO1 sau khi điều trị liều lượng đơn lẻ bằng ALN-GO1 ở chuột.

Hình 23 là biểu đồ thể hiện hàm lượng mARN HAO1 và hàm lượng glycolat trong huyết thanh sau khi điều trị liều lượng đơn lẻ bằng ALN-GO1 ở chuột nhắt.

Hình 24 là hai biểu đồ thể hiện các hàm lượng oxalat và glycolat trong nước tiểu ở mẫu chuột mắc chứng tăng oxalat niệu nguyên phát typ I sau liều lượng đơn lẻ của ALN-GO1.

Hình 25A là biểu đồ thể hiện hàm lượng mARN HAO1 ở mẫu chuột nhắt mắc chứng tăng oxalat niệu nguyên phát typ I sau liều lượng đơn lẻ của ALN-GO1.

Hình 25B là biểu đồ thể hiện hàm lượng oxalat trong nước tiểu ở mẫu chuột nhắt mắc chứng tăng oxalat niệu nguyên phát typ I sau liều lượng đơn lẻ của ALN-GO1.

Hình 26 là hai biểu đồ thể hiện mARN HAO1 và hàm lượng oxalat trong nước tiểu ở mẫu chuột nhắt mắc chứng tăng oxalat niệu nguyên phát Typ I sau khi dùng liều lượng lặp lại của ALN-GO1.

Hình 27 là hai biểu đồ thể hiện hàm lượng mARN HAO1 và hàm lượng glycolat trong huyết thanh sau khi dùng liều lượng lặp lại ở động vật linh trưởng không phải là người.

- 5 -

Mô tả chi tiết sáng chế

Sáng chế đề xuất hợp phần có chứa tác nhân ARNi, ví dụ, tác nhân ARNi mạch kép, hướng đích HAO1. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp sử dụng hợp phần theo sáng chế để ức chế sự biểu hiện HAO1 và để điều trị các rối loạn kết hợp HAO1.

I. Định nghĩa

Để sáng chế được hiểu rõ hơn, một số thuật ngữ được xác định trước tiên. Ngoài ra, cần lưu ý rằng bất cứ khi nào giá trị hoặc khoảng giá trị của thông số được nêu ra, dự định rằng giá trị và khoảng trung gian cho các giá trị được nêu ra cũng là một phần của sáng chế.

Các mạo từ số ít được sử dụng ở đây để đề cập đến một hoặc nhiều hơn một (*tức là*, ít nhất một) đối tượng ngữ pháp của mạo từ này. Ví dụ, "chi tiết" nghĩa là một chi tiết hoặc nhiều hơn một chi tiết, ví dụ, nhiều chi tiết.

Thuật ngữ "bao gồm" được sử dụng ở đây có nghĩa là, và được sử dụng thay đổi với, cụm từ "bao gồm nhưng không giới hạn ở".

Thuật ngữ "hoặc" được sử dụng ở đây có nghĩa là, và được sử dụng thay đổi với, thuật ngữ "và/hoặc," trừ trường hợp có chỉ dẫn rõ ràng khác.

Như được dùng trong bản mô tả này, "HAO1" dùng để chỉ gen mã hóa cho enzym hydroxyaxit oxidaza 1. Các tên gen khác bao gồm GO, GOX, GOX1, và HAOX1. Protein này còn được gọi là glycolat oxidaza và (S)-2-hydroxy-axit oxidaza. Mã số truy cập GenBank của mARN HAO1 ở người là NM_017545.2; mARN HAO1 ở khỉ cynomolgous (*Macaca fascicularis*) là XM_005568381.1; mARN HAO1 ở chuột (*Mus musculus*) là NM_010403.2; mARN HAO1 ở chuột nhắt (*Rattus norvegicus*) là XM_006235096.1.

Thuật ngữ "HAO1," như được dùng trong bản mô tả này, còn dùng để chỉ các biến thể trình tự ADN có trong tự nhiên của gen HAO1, chẳng hạn như dạng đa hình nucleotit đơn lẻ (SNP) trong gen HAO1. Các SNP ví dụ có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu các biến thể NCBI dbSNP Short Genetic có sẵn ở www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP.

Như được dùng trong bản mô tả này, "trình tự đích" dùng để chỉ phần liên tục của trình tự nucleotit của phân tử mARN tạo thành trong quá trình phiên mã của gen HAO1, bao gồm mARN mà là sản phẩm của việc xử lý ARN của sản phẩm phiên mã sơ cấp.

- 6 -

Như được sử dụng ở đây, thuật ngữ "sợi chứa trình tự" dùng để chỉ oligonucleotit chứa mạch nucleotit mà được mô tả bởi trình tự được đề cập đến bằng cách sử dụng danh pháp nucleotit chuẩn.

Mỗi "G," "C," "A" và "U" thường biểu thị một nucleotit mà lần lượt chứa guanin, xytosin, adenin, và uraxil làm bazơ. "T" và "dT" được sử dụng thay thế cho nhau trong bản mô tả này và chỉ deoxyribonucleotit trong đó nucleobazơ này là tymin, ví dụ, deoxyribotymin, 2'-deoxytymidin hoặc tymidin. Tuy nhiên, sẽ hiểu rằng thuật ngữ "ribonucleotit" hoặc "nucleotit" hoặc "deoxyribonucleotit" cũng có thể chỉ nucleotit cải biến, như được mô tả thêm dưới đây, hoặc gốc thay thế đại diện. Chuyên gia trong lĩnh vực biết rõ rằng guanin, xytosin, adenin, và uraxil có thể được thay thế bằng các gốc khác mà hầu như không làm thay đổi đặc tính bắt cặp của bazơ của oligonucleotit chứa nucleotit có gốc thay thế này. Ví dụ, không làm giới hạn sáng chế, nucleotit chứa inosin làm bazơ của nó có thể bắt cặp bazơ với nucleotit chứa adenin, xytosin, hoặc uraxil. Do đó, nucleotit chứa uraxil, guanin, hoặc adenin có thể được thay thế trong các trình tự nucleotit theo sáng chế bằng nucleotit chứa, ví dụ, inosin. Các trình tự chứa các gốc thay thế này là các phương án của sáng chế.

Các thuật ngữ "iARN", "tác nhân ARNi," "tác nhân iARN," "tác nhân cản trở ARN" như được dùng thay thế lẫn nhau trong bản mô tả này, dùng để chỉ tác nhân mà có chứa ARN như khi thuật ngữ đó được xác định trong bản mô tả này, và mà làm trung gian cho sự phân cắt được hướng đích của bản phiên mã ARN *thông qua* con đường phức hợp làm cảm ứng ARN (RISC). iARN định hướng sự thoái hóa đặc hiệu trình tự của mARN thông qua quy trình dưới dạng sự cản trở ARN (ARNi). iARN điều biến, *ví dụ*, ức chế, sự biểu hiện của HAO1 trong tế bào, *ví dụ*, tế bào ở đối tượng, chẳng hạn như đối tượng động vật có vú.

Theo một phương án, tác nhân ARNi theo sáng chế bao gồm ARN sợi đơn mà tương tác với trình tự ARN đích, *ví dụ*, trình tự mARN đích HAO1, để định hướng sự phân cắt của ARN đích. Không muốn bị ràng buộc bởi lý thuyết, tin rằng ARN sợi kép dài được đưa vào tế bào bị phá vỡ thành siARN bằng endonucleaza Typ III còn gọi là Dicer (Sharp và cộng sự. (2001) *Genes Dev.* 15:485). Dicer, enzym giống ribonucleaza-III, xử lý dsARN thành ARN cản trở ngắn có 19-23 cặp bazơ mang đặc điểm hai phần nhô 3' bazơ (Bernstein, và

- 7 -

cộng sự., (2001) *Nature* 409:363). Sau đó siARN được kết hợp vào phức hợp làm câm cảm ứng ARN (RISC) trong đó một hoặc nhiều helicaza tháo xoắn cặp đôi siARN, làm cho sợi đôi nghĩa bổ sung có thể hướng dẫn sự nhận diện đích (Nykanen, và *cộng sự.*, (2001) *Cell* 107:309). Khi liên kết với mARN đích thích hợp, một hoặc nhiều endonucleaza trong RISC phân cắt đích để gây ra việc làm câm (Elbashir, và *cộng sự.*, (2001) *Genes Dev.* 15:188). Do đó, theo một khía cạnh sáng chế đề cập đến ARN sợi đơn (siARN) được tạo ra trong tế bào và mà thúc đẩy sự tạo thành của phức hợp RISC để đem lại việc làm câm gen đích, *tức là*, gen HAO1. Theo đó, thuật ngữ "siARN" cũng được sử dụng ở đây để chỉ ARNi như được mô tả ở trên.

Theo phương án khác, tác nhân ARNi có thể là sARNi sợi đơn mà được đưa vào tế bào hoặc cơ quan để ức chế mARN đích. Tác nhân ARNi sợi đơn liên kết với RISC endonucleaza Argonaute 2, enzym này sau đó phân cắt mARN đích. Các sARNi sợi đơn thường có 15-30 nucleotit và được cải biến hóa học. Thiết kế và thử nghiệm của siARN sợi đơn được mô tả trong Sáng chế Mỹ số. 8,101,348 và trong Lima và *cộng sự.*, (2012) *Cell* 150: 883-894, toàn bộ nội dung của mỗi tài liệu này được kết hợp ở đây để tham khảo. Trình tự nucleotit đối nghĩa bất kỳ trong số các trình tự nucleotit đối nghĩa được mô tả trong bản mô tả này có thể được sử dụng dưới dạng siARN sợi đơn như được mô tả trong bản mô tả này hoặc dưới dạng được cải biến hóa học bằng phương pháp được mô tả trong tài liệu Lima và *cộng sự.*, (2012) *Cell* 150;:883-894.

Theo phương án khác nữa, sáng chế đề xuất phân tử oligonucleotit đối nghĩa sợi đơn hướng đích HAO1. "Phân tử oligonucleotit đối nghĩa sợi đơn" bổ sung với trình tự trong mARN đích (*tức là*, HAO1). Phân tử oligonucleotit đối nghĩa sợi đơn có thể ức chế sự dịch mã theo phương thức tỷ lệ bằng cách bắt cặp bazơ với mARN và làm tắc nghẽn theo cách vật lý bộ máy dịch mã, xem Dias, N. và *cộng sự.*, (2002) *Mol Cancer Ther* 1:347-355. Theo cách khác, phân tử oligonucleotit đối nghĩa sợi đơn ức chế mARN đích bằng cách lai với đích này và phân cắt đích này thông qua sự phân cắt nhờ ARNazaH. Phân tử oligonucleotit đối nghĩa sợi đơn có thể có chiều dài từ 10 đến 30 nucleotit và có trình tự bổ sung với trình tự đích. Ví dụ, phân tử oligonucleotit đối nghĩa sợi đơn có thể có chứa trình tự mà có ít nhất là khoảng 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hoặc nhiều nucleotit liên tiếp từ trình tự nucleotit đối nghĩa bất kỳ trong số các trình tự nucleotit đối nghĩa được mô tả

- 8 -

trong bản mô tả này, *ví dụ*, các trình tự được nêu trong bảng bất kỳ trong số các Bảng 1 hoặc 2, hoặc liên kết vị trí đích bất kỳ trong số các vị trí đích được mô tả trong bản mô tả này. Phân tử oligonucleotit đối nghĩa sợi đơn có thể gồm ARN, ADN được cải biến, hoặc hỗn hợp của chúng.

Theo phương án khác, "ARNi" đề dùng trong chế phẩm, việc sử dụng, và phương pháp theo sáng chế là ARN sợi kép và được đề cập ở đây là "tác nhân ARNi sợi kép," "phân tử ARN sợi kép (dsARN)," "tác nhân dsARN," hoặc "dsARN". Thuật ngữ "dsARN", dùng để chỉ phức hợp của phân tử axit ribonucleic, có cấu trúc đôi chứa hai các sợi axit nucleic đối song song và về cơ bản bổ sung, được đề cập đến dưới dạng có hướng "có nghĩa" và "đối nghĩa" đối với ARN đích, *tức là*, gen HAO1. Theo một số phương án của sáng chế, ARN sợi kép (dsARN) gây ra sự thoái biến của ARN đích, *ví dụ*, mARN, thông qua cơ chế làm câm gen sau phiên mã được đề cập đến ở đây là ARN tương hỗ hoặc ARNi.

Nói chung, phần lớn nucleotit của mỗi sợi của phân tử dsARN là ribonucleotit, nhưng như được mô tả chi tiết ở đây, mỗi hoặc cả hai sợi còn có thể bao gồm một hoặc nhiều sợi không phải ribonucleotit, *ví dụ*, deoxyribonucleotit và/hoặc nucleotit cải biến. Ngoài ra, như được sử dụng trong bản mô tả này, "tác nhân ARNi" có thể bao gồm ribonucleotit với các cải biến hóa học; tác nhân ARNi có thể bao gồm các cải biến cơ bản ở nhiều nucleotit. Các cải biến này có thể bao gồm tất cả các loại cải biến được bộc lộ ở đây hoặc được biết đến trong lĩnh vực. Bất kỳ trong số các cải biến này, như được sử dụng trong phân tử loại siARN, được bao gồm trong "tác nhân ARNi" dùng cho phần mô tả và yêu cầu bảo hộ.

Hai sợi tạo thành cấu trúc kép có thể là các phần khác nhau của một phân tử ARN lớn hơn, hoặc chúng có thể là các phân tử ARN riêng biệt. Khi hai sợi là một phần của một phân tử lớn hơn, và do đó được kết nối bởi một chuỗi nucleotit không đứt quãng giữa đầu 3' của một sợi và đầu 5' của sợi còn lại tương ứng tạo thành cấu trúc kép, sợi ARN kết nối được gọi là "vòng inh kẹp tóc." Khi hai sợi được liên kết cộng hóa trị bằng phương pháp khác với chuỗi nucleotit không đứt quãng giữa đầu 3' của một sợi và đầu 5' của sợi tương ứng kia tạo thành cấu trúc kép, cấu trúc liên kết được gọi là "liên kết." Các sợi ARN có thể có số nucleotit giống hoặc khác nhau. Số lượng tối đa của cặp bazơ là số nucleotit trong sợi

- 9 -

ngắn nhất của dsARN trừ đi bất kỳ phần nhô nào có mặt trong cấu trúc kép. Ngoài cấu trúc kép, tác nhân ARNi có thể có một hoặc nhiều đầu nucleotit nhô ra.

Theo một phương án, tác nhân ARNi theo sáng chế là dsARN có 24-30 nucleotit mà tương tác với trình tự ARN đích, ví dụ, trình tự mARN đích HAO1, để định hướng sự phân cắt của ARN đích. Không muốn bị ràng buộc bởi lý thuyết, ARN sợi kép dài được đưa vào tế bào bị phá vỡ thành siARN bằng endonucleaza Typ III còn gọi là Dicer (Sharp và cộng sự, (2001) Genes Dev. 15:485). Dicer, enzym giống ribonucleaza-III, xử lý dsARN thành ARN cản trở ngắn có 19-23 cặp bazơ mang đặc điểm hai phần nhô 3' bazơ (Bernstein, và cộng sự, (2001) Nature 409:363). Sau đó siARN được kết hợp vào phức hợp làm câm cảm ứng ARN (RISC) trong đó một hoặc nhiều helicaza tháo xoắn cặp đôi siARN, làm cho sợi đối nghĩa bổ sung có thể hướng dẫn sự nhận diện đích (Nykanen, và cộng sự, (2001) Cell 107:309). Khi liên kết với mARN đích thích hợp, một hoặc nhiều endonucleaza trong RISC phân cắt đích để gây ra việc làm câm (Elbashir, và cộng sự, (2001) Genes Dev. 15:188).

Như được sử dụng ở đây, "đoạn nucleotit nhô" chỉ nucleotit hoặc các nucleotit không bắt cặp mà nhô ra từ cấu trúc sợi kép của tác nhân ARNi khi đầu 3' của một sợi tác nhân ARNi kéo dài ra xa khỏi đầu 5' của sợi còn lại, hoặc ngược lại. "Cụt" hoặc "đầu cụt" nghĩa là không có nucleotit không được bắt cặp ở đầu đó của tác nhân ARNi sợi kép, tức là, không có đoạn nucleotit nhô. Tác nhân ARNi "có đầu cụt" là dsARN mà là sợi kép trên toàn bộ chiều dài của nó, tức là, không có đoạn nucleotit nhô ở cả hai đầu của phân tử này. Tác nhân ARNi theo sáng chế bao gồm tác nhân ARNi có phần nhô nucleotit ở một đầu (*cụ thể là*, các tác nhân có phần nhô ở một đầu và một đầu cụt) hoặc có phần nhô nucleotit ở cả hai đầu.

Thuật ngữ "sợi đối nghĩa" dùng để chỉ sợi của tác nhân ARNi sợi kép mà bao gồm vùng mà về cơ bản bổ sung với trình tự đích (*ví dụ*, mARN HAO1 ở người). Như được dùng trong bản mô tả này, thuật ngữ "vùng bổ sung với một phần của mARN mã hóa cho HAO1" dùng để chỉ vùng trên sợi đối nghĩa mà về cơ bản bổ sung với một phần của trình tự mARN HAO1. Trong đó vùng bổ trợ này không bổ sung hoàn toàn với trình tự đích, các vị trí không bắt cặp chủ yếu là nằm ở các vùng tận cùng và, nếu có, thường ở vùng hoặc các vùng tận cùng, *ví dụ*, trong 6, 5, 4, 3, hoặc 2 nucleotit của các đầu tận cùng 5' và/hoặc 3'.

- 10 -

Thuật ngữ "sợi có nghĩa," như được sử dụng ở đây, chỉ sợi dsARN mà bao gồm vùng mà gần như bổ sung với vùng sợi đối nghĩa.

Như được sử dụng ở đây, thuật ngữ "vùng phân cắt" đề cập đến vùng mà nằm ngay cạnh vị trí phân cắt. Vị trí phân cắt là vị trí trên đích mà ở đó xảy ra sự phân cắt. Theo một số phương án, vùng phân cắt bao gồm ba bazơ trên một đầu, và ngay cạnh, vị trí phân cắt. Theo một số phương án, vùng phân cắt bao gồm hai bazơ trên một đầu, và ngay cạnh, vị trí phân cắt. Theo một số phương án, vị trí phân cắt thường xảy ra ở vị trí liên kết bởi các nucleotit 10 và 11 của sợi đối nghĩa, và vùng phân cắt bao gồm các nucleotit 11, 12 và 13.

Như được sử dụng ở đây, và trừ khi được định nghĩa khác đi, thuật ngữ "bổ sung," khi được sử dụng để mô tả trình tự nucleotit thứ nhất liên quan đến trình tự nucleotit thứ hai, đề cập đến khả năng của oligonucleotit hoặc polynucleotit chứa trình tự nucleotit thứ nhất để lai và tạo ra cấu trúc kép dưới các điều kiện nhất định với oligonucleotit hoặc polynucleotit chứa trình tự nucleotit thứ hai, sẽ được hiểu bởi chuyên gia trong lĩnh vực. Các điều kiện này có thể, ví dụ, là các điều kiện nghiêm ngặt, trong đó các điều kiện nghiêm ngặt có thể bao gồm: 400 mM NaCl, 40 mM PIPES độ pH 6,4, 1 mM EDTA, 50°C hoặc 70°C trong 12-16 giờ tiếp theo là rửa. Các điều kiện khác, như các điều kiện sinh lý phù hợp như có thể thấy bên trong cơ thể, có thể áp dụng. Ví dụ, trình tự bổ sung đủ để cho phép chức năng phù hợp của axit nucleic để thực hiện, *ví dụ*, ARNi. Chuyên gia trong lĩnh vực có thể xác định tập hợp các điều kiện thích hợp nhất để thử nghiệm tính bổ sung của hai trình tự tương ứng với áp dụng cơ sở của nucleotit được lai.

Các trình tự có thể là "bổ sung hoàn toàn" với nhau khi có việc bắt cặp bazơ của các nucleotit của trình tự nucleotit thứ nhất với các nucleotit của trình tự nucleotit thứ hai trên toàn bộ chiều dài của các trình tự nucleotit thứ nhất và thứ hai này. Tuy nhiên, nếu trình tự thứ nhất được nói đến là "gần như bổ sung" với trình tự thứ hai trong bản mô tả này, các trình tự thứ hai này có thể là bổ sung hoàn toàn, hoặc chúng có thể tạo ra một hoặc nhiều, nhưng không quá 4, 3 hoặc 2 cặp bazơ không bắt cặp khi lai, trong khi duy trì khả năng lai trong các điều kiện phù hợp nhất cho ứng dụng cuối cùng của chúng. Tuy nhiên, khi hai oligonucleotit được thiết kế để tạo thành, nhờ quá trình lai, một hoặc nhiều phần nhô sợi đơn, phần nhô này sẽ không bị coi là không hợp khi xác định tính bổ sung. Ví dụ, dsARN chứa một oligonucleotit dài 21 nucleotit và một oligonucleotit khác dài 23 nucleotit, trong

- 11 -

đó oligonucleotit dài hơn này bao gồm trình tự có 21 nucleotit mà bổ sung hoàn toàn với oligonucleotit ngắn hơn này, có thể còn được gọi là "bổ sung hoàn toàn" cho các mục đích được mô tả ở đây.

Các trình tự "bổ sung", như được sử dụng ở đây, có thể còn bao gồm, hoặc hoàn toàn được tạo ra từ, các cặp bazơ không phải Watson-Crick và/hoặc các cặp bazơ tạo ra từ các nucleotit không tự nhiên và cải biến, miễn là thỏa mãn các yêu cầu nêu trên đối với khả năng lai của chúng. Các cặp bazơ không-Watson-Crick này bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, cặp bazơ G:U Wobble hoặc Hoogsteen.

Các thuật ngữ "bổ sung," "bổ sung hoàn toàn" và "gần như bổ sung" ở đây có thể được sử dụng liên quan đến việc khớp bazơ giữa sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa dsARN, hoặc giữa sợi đối nghĩa dsARN và trình tự đích, như sẽ được hiểu từ ngữ cảnh sử dụng chúng.

Như được dùng trong bản mô tả này, polynucleotit mà "về cơ bản bổ sung với ít nhất một phần của" ARN thông tin (mARN) dùng để chỉ polynucleotit mà về cơ bản bổ sung với phần liên tục của mARN quan tâm (ví dụ, mARN mã hóa cho HAO1) bao gồm 5' UTR, khung đọc mở (ORF), hoặc 3' UTR. Ví dụ, polynucleotit bổ sung với ít nhất một phần của mARN HAO1 nếu trình tự này về cơ bản bổ sung với phần không bị ngắt quãng của mARN mã hóa cho HAO1.

Thuật ngữ "ức chế," như được sử dụng ở đây, được sử dụng luân phiên với "làm giảm," "làm chậm," "điều hòa giảm," "kìm hãm" và các thuật ngữ tương tự, và bao gồm mức ức chế bất kỳ.

Cụm từ "ức chế sự biểu hiện của HAO1," như được dùng trong bản mô tả này, bao gồm sự ức chế của sự biểu hiện của gen HAO1 bất kỳ (chẳng hạn như, ví dụ, gen HAO1 ở chuột, gen HAO1 ở chuột nhắt, gen HAO1 ở khỉ, hoặc gen HAO1 ở người) cũng như là các biến thể, (ví dụ, các biến thể có trong tự nhiên), hoặc các thể đột biến của gen HAO1. Do đó, gen HAO1 có thể là gen HAO1 kiểu dại, gen HAO1 đột biến, hoặc gen HAO1 chuyển gen trong trường hợp tế bào, nhóm tế bào, hoặc sinh vật được thao tác di truyền.

"Ức chế sự biểu hiện của gen HAO1" bao gồm mức độ bất kỳ của sự ức chế của gen HAO1, ví dụ, ít nhất sự triệt tiêu một phần của sự biểu hiện của gen HAO1, chẳng hạn như sự ức chế bằng ít nhất là khoảng 5%, ít nhất là khoảng 10%, ít nhất là khoảng 15%, ít nhất

- 12 -

là khoảng 20%, ít nhất là khoảng 25%, ít nhất là khoảng 30%, ít nhất là khoảng 35%, ít nhất là khoảng 40%, ít nhất là khoảng 45%, ít nhất là khoảng 50%, ít nhất là khoảng 55%, ít nhất là khoảng 60%, ít nhất là khoảng 65%, ít nhất là khoảng 70%, ít nhất là khoảng 75%, ít nhất là khoảng 80%, ít nhất là khoảng 85%, ít nhất là khoảng 90%, ít nhất là khoảng 91%, ít nhất là khoảng 92%, ít nhất là khoảng 93%, ít nhất là khoảng 94%, ít nhất là khoảng 95%, ít nhất là khoảng 96%, ít nhất là khoảng 97%, ít nhất là khoảng 98%, hoặc ít nhất là khoảng 99%.

Sự biểu hiện của gen HAO1 có thể được đánh giá dựa trên hàm lượng của biến số bất kỳ có liên quan tới sự biểu hiện gen HAO1, *ví dụ*, hàm lượng mRNA HAO1 hoặc hàm lượng protein HAO1, trong, *ví dụ*, mô và/hoặc hàm lượng oxalat trong nước tiểu. Sự ức chế có thể được đánh giá bằng sự giảm ở mức tuyệt đối hoặc tương đối của một hoặc nhiều trong số các biến đổi này so với mức đối chứng. Mức đối chứng có thể là loại mức đối chứng bất kỳ được sử dụng trong lĩnh vực này, *ví dụ*, đường cơ sở trước khi dùng liều, hoặc mức được xác định từ đối tượng, tế bào hoặc mẫu tương tự không được xử lý hoặc được xử lý bằng đối chứng (như, *ví dụ*, đối chứng chỉ là dung dịch đệm hoặc đối chứng là tác nhân không hoạt tính).

Cụm từ "cho tế bào tiếp xúc với tác nhân ARNi sợi kép," như được sử dụng ở đây, bao gồm việc cho tế bào tiếp xúc bằng phương tiện có thể có bất kỳ. Cho tế bào tiếp xúc với tác nhân ARNi sợi kép bao gồm cho tế bào tiếp xúc *in vitro* với tác nhân ARNi hoặc cho tế bào tiếp xúc *in vivo* với tác nhân ARNi. Việc tiếp xúc có thể được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp. Do đó, *ví dụ*, tác nhân ARNi có thể được cho tiếp xúc vật lý với tế bào bởi cá nhân thực hiện phương pháp này, hoặc ngoài ra, tác nhân ARNi có thể được đặt vào một tình huống mà sẽ cho phép hoặc gây ra điều đó để sau đó tiếp xúc với tế bào.

Việc cho tế bào tiếp xúc *in vitro* có thể được thực hiện, *ví dụ*, bằng cách ủ tế bào với tác nhân ARNi. Cho tế bào tiếp xúc *in vivo* có thể được thực hiện, *ví dụ*, bằng cách tiêm tác nhân ARNi vào trong hoặc gần mô trong đó chứa tế bào, hoặc tiêm tác nhân ARNi vào vùng khác, dòng máu hoặc khoang không dưới da, sao cho tác nhân này sau đó sẽ tới mô trong đó chứa tế bào cần được cho tiếp xúc. *Ví dụ*, tác nhân ARNi có thể chứa và/hoặc được nối với phối tử, *ví dụ*, phối tử GalNAc3, mà hướng tác nhân ARNi đến vị trí mong muốn, *ví dụ*, gan. Tổ hợp của các phương pháp tiếp xúc *in vitro* và *in vivo* cũng có thể thực hiện. Liên

- 13 -

quan đến các phương pháp theo sáng chế, tế bào cũng có thể được cho tiếp xúc *in vitro* với tác nhân ARNi và sau đó được cấy ghép vào đối tượng.

Như được sử dụng ở đây, "đối tượng" bao gồm người hoặc động vật không phải người, tốt hơn là động vật có xương sống, và tốt hơn nữa là động vật có vú. Đối tượng có thể bao gồm sinh vật chuyển gen. Tốt nhất là, đối tượng là người, chẳng hạn như người mắc hoặc có khả năng phát triển rối loạn có kết hợp với HAO1.

"Bệnh nhân" hoặc "đối tượng," như được sử dụng ở đây, được hiểu bao gồm cả người và động vật không phải người, tốt hơn là động vật có vú, *ví dụ*, người hoặc khỉ. Tốt nhất, đối tượng hoặc bệnh nhân là người.

"Rối loạn có kết hợp với HAO1", như được dùng trong bản mô tả này, được dự định là bao gồm rối loạn bất kỳ mà có thể được điều trị hoặc được ngăn ngừa, hoặc các triệu chứng mà có thể được làm nhẹ bớt, bằng cách ức chế sự biểu hiện của HAO1. Các ví dụ bao gồm nhưng không giới hạn ở Chứng tăng oxalat niệu Nguyên phát 1 (PH1).

"Lượng hữu hiệu để điều trị," như được dùng trong bản mô tả này, được dự định là bao gồm lượng của tác nhân ARNi mà, khi được dùng cho bệnh nhân để điều trị bệnh kết hợp HAO1, đủ để đem lại sự điều trị cho bệnh (*ví dụ*, bằng cách làm giảm bớt, làm cải thiện hoặc duy trì bệnh hiện tại hoặc một hoặc nhiều triệu chứng của bệnh). "Lượng hữu hiệu để điều trị" có thể thay đổi tùy thuộc vào tác nhân ARNi, tác nhân này được dùng như thế nào, bệnh và độ nghiêm trọng của nó và tiền sử, tuổi, khối lượng, tiền sử gia đình, cấu trúc di truyền, giai đoạn của quy trình bệnh lý qua trung gian sự biểu hiện HAO1, các loại điều trị từ trước hoặc đồng thời, nếu có, và các đặc điểm cá thể khác của bệnh nhân cần điều trị.

"Lượng hữu hiệu để phòng bệnh," như được dùng trong bản mô tả này, được dự định là bao gồm lượng của tác nhân ARNi mà, khi được dùng cho đối tượng chưa trải qua hoặc biểu hiện triệu chứng của bệnh kết hợp HAO1, nhưng là người có thể khả năng mắc bệnh, đủ để ngăn ngừa hoặc cải thiện bệnh hoặc một hoặc nhiều triệu chứng của bệnh. Cải thiện bệnh bao gồm làm chậm quá trình phát triển bệnh hoặc làm giảm mức nghiêm trọng của giai đoạn hậu phát triển bệnh. "Lượng có hiệu quả phòng bệnh" có thể thay đổi tùy thuộc vào tác nhân ARNi, cách sử dụng tác nhân này, mức độ nguy hiểm của bệnh, và tiền sử, độ tuổi, cân nặng và tiền sử gia đình, cấu trúc gen, các kiểu điều trị từ trước hoặc đồng thời, nếu có, và các đặc tính cá nhân khác của bệnh nhân cần điều trị.

- 14 -

"Lượng có hiệu quả chữa bệnh" hoặc "lượng có hiệu quả phòng bệnh" còn bao gồm lượng tác nhân ARNi mà tạo ra một số hiệu quả cục bộ hoặc toàn thân mong muốn ở tỉ lệ lợi ích/nguy cơ hợp lý áp dụng được cho phép điều trị bất kỳ. Các tác nhân ARNi được sử dụng trong phương pháp theo sáng chế có thể có thể được dùng với lượng đủ để tạo ra tỷ lệ lợi ích/rủi ro chấp nhận được có thể áp dụng cho phép điều trị này.

Thuật ngữ "mẫu," như được sử dụng ở đây, bao gồm tập hợp dịch, tế bào hoặc mô tương tự phân lập từ đối tượng, cũng như dịch, tế bào hoặc mô có trong đối tượng. Ví dụ về các dịch sinh học bao gồm máu, huyết thanh và dịch màng ối, huyết tương, dịch não tủy, dịch mắt, bạch huyết, nước tiểu, nước bọt, và các loại tương tự. Mẫu mô có thể bao gồm mẫu từ các mẫu mô, bộ phận hoặc các vùng được chọn. Ví dụ, các mẫu thử có thể được lấy từ các bộ phận đặc biệt, một phần của các bộ phận đó, hoặc chất lỏng hoặc các tế bào của các bộ phận đó. Theo một số phương án, mẫu có thể được lấy từ gan (*ví dụ*, toàn bộ gan hoặc một số phần của gan hoặc một số loại tế bào trong gan, như, *ví dụ*, tế bào gan). Theo một số phương án, "mẫu có nguồn gốc từ đối tượng" dùng để chỉ máu hoặc huyết tương được rút ra từ đối tượng. Theo các phương án khác, "mẫu có nguồn gốc từ đối tượng" chỉ mô gan (hoặc các thành phần phụ của nó) có nguồn gốc từ đối tượng.

II. Tác nhân iARN dsARN theo sáng chế

Được mô tả trong bản mô tả này là tác nhân ARNi mạch kép mà ức chế sự biểu hiện của gen HAO1 trong tế bào, chẳng hạn như tế bào ở đối tượng, *ví dụ*, động vật có vú, chẳng hạn như người mắc rối loạn có kết hợp với HAO1, và việc sử dụng tác nhân ARNi mạch kép này.

Theo đó, sáng chế đề xuất tác nhân ARNi mạch kép có các cải biến hóa học có khả năng ức chế sự biểu hiện của gen đích (*tức là*, gen HAO1) *in vivo*.

Như được mô tả chi tiết hơn dưới đây, theo các khía cạnh nhất định theo sáng chế, về cơ bản tất cả các nucleotit của iARN theo sáng chế được cải biến. Theo các phương án khác theo sáng chế, tất cả các nucleotit của ARNi theo sáng chế được cải biến. Các ARNi theo sáng chế trong đó "gần như tất cả các nucleotit được cải biến" lớn hơn nhưng không cải biến hoàn toàn và có thể bao gồm không nhiều hơn 5, 4, 3, 2, hoặc 1 nucleotit không được cải biến.

- 15 -

Tác nhân ARNi bao gồm sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa. Mỗi sợi của tác nhân ARNi có thể có chiều dài nằm trong khoảng 12-30 nucleotit. Ví dụ, mỗi sợi có thể có chiều dài từ 14-30 nucleotit, 17-30 nucleotit, 19-30 nucleotit, 25-30 nucleotit, 27-30 nucleotit, 17-23 nucleotit, 17-21 nucleotit, 17-19 nucleotit, 19-25 nucleotit, 19-23 nucleotit, 19-21 nucleotit, 21-25 nucleotit, hoặc 21-23 nucleotit.

Mỗi sợi có thể có chiều dài 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, hoặc 30 nucleotit. Mỗi sợi của tác nhân ARNi có thể có cùng chiều dài hoặc có thể có chiều dài khác nhau.

Sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa chủ yếu tạo thành ARN sợi kép ("dsARN"), còn được đề cập đến trong bản mô tả này là "tác nhân ARNi." Vùng kép của tác nhân ARNi có thể có chiều dài 12-30 cặp nucleotit. Ví dụ, vùng kép có thể có chiều dài nằm trong khoảng 14-30 cặp nucleotit, chiều dài nằm trong khoảng 17-30 cặp nucleotit, chiều dài nằm trong khoảng 27-30 cặp nucleotit, chiều dài nằm trong khoảng 17-23 cặp nucleotit, chiều dài nằm trong khoảng 17-21 cặp nucleotit, chiều dài nằm trong khoảng 17-19 cặp nucleotit, chiều dài nằm trong khoảng 19-25 cặp nucleotit, chiều dài nằm trong khoảng 19-23 cặp nucleotit, chiều dài nằm trong khoảng 19-21 cặp nucleotit, chiều dài nằm trong khoảng 21-25 cặp nucleotit, hoặc chiều dài nằm trong khoảng 21-23 cặp nucleotit. Trong ví dụ khác, vùng cặp đôi có chiều dài được chọn từ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, và 27 cặp nucleotit.

Theo một phương án, tác nhân ARNi có thể chứa một hoặc nhiều vùng nhô và/hoặc nhóm mũ ở đầu 3', đầu 5', hoặc cả hai đầu của một hoặc cả hai sợi. Phần nhô có thể có chiều dài 1-6 nucleotit, ví dụ có chiều dài 2-6 nucleotit, có chiều dài 1-5 nucleotit, có chiều dài 2-5 nucleotit, có chiều dài 1-4 nucleotit, có chiều dài 2-4 nucleotit, có chiều dài 1-3 nucleotit, có chiều dài 2-3 nucleotit, hoặc có chiều dài 1-2 nucleotit. Phần nhô có thể là do một sợi dài hơn sợi kia, hoặc do hai sợi dài như nhau bị chéo nhau. Phần nhô có thể tạo ra sự không cân xứng với mARN đích hoặc có thể bổ sung cho các trình tự gen được nhắm đến hoặc có thể là các trình tự khác. Các sợi thứ nhất và thứ hai còn có thể được nối, *ví dụ*, bởi bazơ bổ sung để tạo cấu trúc kẹp tóc, hoặc bởi liên kết không bazơ khác.

Theo một phương án, mỗi nucleotit trong vùng nhô của tác nhân ARNi có thể độc lập là nucleotit được cải biến hoặc không được cải biến bao gồm, nhưng không giới hạn ở 2'-

- 16 -

đường được cải biến, chẳng hạn như, 2-F, 2'-O-metyl, tymidin (T), 2'-O-metoxyletyl-5-methyluridin (Teo), 2'-O-metoxyletyladenôsin (Aeo), 2'-O-metoxyletyl-5-methylxytydin (m5Ceo), và dạng kết hợp bất kỳ của chúng. Ví dụ, TT có thể là trình tự nhô cho một trong các đầu trên một trong các sợi. Phần nhô có thể tạo ra sự không cân xứng với mARN đích hoặc có thể bổ sung cho các trình tự gen được nhắm đến hoặc có thể là các trình tự khác.

Phần nhô 5' hoặc 3' ở sợi có nghĩa, sợi đối nghĩa hoặc cả hai sợi của tác nhân ARNi có thể được phosphoryl hóa. Theo một số phương án, (các) vùng nhô chứa nucleotit có phosphorothioat giữa hai nucleotit, khi hai nucleotit có thể giống hoặc khác nhau. Theo một phương án, phần nhô có mặt ở đầu 3' của sợi có nghĩa, sợi đối nghĩa, hoặc cả hai sợi. Theo một phương án, đầu nhô 3' có mặt ở sợi đối nghĩa. Theo một phương án, đầu nhô 3' có mặt ở sợi có nghĩa.

Tác nhân ARNi có thể chứa chỉ một đầu nhô, mà có thể làm tăng hoạt tính tương hỗ của ARNi, mà không ảnh hưởng đến sự ổn định toàn bộ. Ví dụ, phần nhô sợi đơn có thể có thể nằm ở đầu 3' của sợi có nghĩa hoặc, tùy ý, ở đầu 3' của sợi đối nghĩa. ARNi có thể còn có đầu cụt, nằm ở đầu 5' của sợi đối nghĩa (hoặc đầu 3' của sợi có nghĩa) hoặc *ngược lại*. Thông thường, sợi đối nghĩa của ARNi có nucleotit nhô ở đầu 3', và đầu 5' là cụt. Ngoài phạm vi lý thuyết, đầu cụt không đối xứng ở đầu 5' của sợi đối nghĩa và phần nhô ở đầu 3' của sợi đối nghĩa giúp sợi dẫn hướng nạp vào trong quá trình RISC.

Tổng hợp và cải biến

Axit nucleic bất kỳ trong số các axit nucleic, ví dụ, ARNi, được mô tả trong sáng chế có thể được tổng hợp và/hoặc được cải biến bằng phương pháp đã được thiết lập rõ trong lĩnh vực, chẳng hạn như các phương pháp được mô tả trong tài liệu "Current protocols in nucleic acid chemistry," Beaucage, S.L. và cộng sự. (Edrs.), John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA, mà được kết hợp ở đây để tham khảo. Các cải biến bao gồm, ví dụ, các cải biến đầu, *ví dụ*, các cải biến ở đầu 5' (cầu nối phosphoryl hóa, liên hợp, đảo ngược) hoặc các cải biến ở đầu 3' (cầu nối liên hợp, nucleotit ADN, đảo ngược, v.v.); các cải biến bazơ, *ví dụ*, thay thế bằng các bazơ làm ổn định, bazơ gây bất ổn định, hoặc bazơ mà bắt cặp bazơ với mục mở rộng của đối tác, loại bỏ bazơ (nucleotit mất đi), hoặc bazơ liên hợp; các cải biến đường (*ví dụ*, ở vị trí 2' hoặc 4') hoặc thay thế đường; và/hoặc các cải biến mạch chính, bao gồm cải biến hoặc thay thế của cầu nối phosphodiester. Các ví dụ cụ thể của các hợp

- 17 -

chất ARNi hữu dụng theo các phương án được mô tả ở đây bao gồm, nhưng không giới hạn ở các ARN chứa mạch chính được cải biến hoặc cầu nối liên nucleosit không tự nhiên. Các ARN có mạch chính được cải biến bao gồm, trong số các cái khác, mà không có nguyên tử phospho trong mạch chính. Cho mục đích của sáng chế này, và đôi khi được đề cập trong lĩnh vực kỹ thuật, các ARN được cải biến mà không có nguyên tử phospho trong mạch chính liên nucleosit của chúng còn có thể được coi là oligonucleosit. Theo một số phương án, ARNi được cải biến sẽ có nguyên tử phospho trong mạch chính liên nucleosit của nó.

Mạch chính ARN được cải biến bao gồm, ví dụ, phosphorothioat, phosphorothioat không đối xứng, phosphorodithioat, phosphotrieste, aminoalkylphosphotrieste, metyl và alkyl phosphonat khác bao gồm 3'-alkylen phosphonat và phosphonat không đối xứng, phosphinat, phosphoramidat bao gồm 3'-amino phosphoramidat và aminoalkylphosphoramidat, thionophosphoramidat, thionoalkylphosphonat, thionoalkylphosphotrieste, và boranophosphat có cầu nối thường ở đầu 3'-5', chất tương tự được liên kết ở đầu 2'-5' của chúng, và chúng có cực đảo ngược trong đó các cặp đơn vị nucleosit liền nhau được liên kết 3'-5' với 5'-3' hoặc 2'-5' với 5'-2'. Nhiều muối, các muối được trộn và dạng không có axit là cũng được bao gồm.

Các bảng sáng chế Mỹ đại diện mà hướng dẫn việc điều chế các cầu nối chứa phospho nêu trên bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Sáng chế Mỹ số 3,687,808; 4,469,863; 4,476,301; 5,023,243; 5,177,195; 5,188,897; 5,264,423; 5,276,019; 5,278,302; 5,286,717; 5,321,131; 5,399,676; 5,405,939; 5,453,496; 5,455,233; 5,466,677; 5,476,925; 5,519,126; 5,536,821; 5,541,316; 5,550,111; 5,563,253; 5,571,799; 5,587,361; 5,625,050; 6,028,188; 6,124,445; 6,160,109; 6,169,170; 6,172,209; 6,239,265; 6,277,603; 6,326,199; 6,346,614; 6,444,423; 6,531,590; 6,534,639; 6,608,035; 6,683,167; 6,858,715; 6,867,294; 6,878,805; 7,015,315; 7,041,816; 7,273,933; 7,321,029; và bảng sáng chế Mỹ RE39464, toàn bộ nội dung của mỗi tài liệu này được kết hợp ở đây để tham khảo.

Mạch chính ARN được cải biến mà không bao gồm nguyên tử phospho ở đây có mạch chính mà được tạo ra bởi alkyl chuỗi ngắn hoặc cầu nối liên nucleosit xycloalkyl, dị nguyên tử được trộn và alkyl hoặc cầu nối liên nucleosit xycloalkyl, hoặc một hoặc nhiều cầu nối liên nucleosit dị nguyên tử hoặc dị vòng chuỗi ngắn. Chúng bao gồm các chất có cầu nối morpholino (được tạo một phần từ phần đường của nucleosit); khung chính siloxan;

- 18 -

khung chính sulfua, sulfoxit và sulfon; khung chính formaxetyl và thioformaxetyl; khung chính metylen formaxetyl và thioformaxetyl; khung chính chứa alken; chứa khung chính sulfamat; khung chính metylenimino và metylenhydrazino; khung chính sulfonat và sulfonamit; khung chính amit; và các khung chính khác có các thành phần N, O, S và CH₂.

Các bằng sáng chế Mỹ đại diện mà hướng dẫn việc điều chế các oligonucleosit nêu trên bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Sáng chế Mỹ số 5,034,506; 5,166,315; 5,185,444; 5,214,134; 5,216,141; 5,235,033; 5,64,562; 5,264,564; 5,405,938; 5,434,257; 5,466,677; 5,470,967; 5,489,677; 5,541,307; 5,561,225; 5,596,086; 5,602,240; 5,608,046; 5,610,289; 5,618,704; 5,623,070; 5,663,312; 5,633,360; 5,677,437; và, 5,677,439, toàn bộ nội dung của mỗi tài liệu này được kết hợp ở đây để tham khảo.

Theo các phương án khác, dạng bất chức ARN thích hợp được dự tính để dùng trong các ARNi, trong đó cả cầu nối đường và liên nucleosit, *cụ thể là*, khung chính, của các đơn vị nucleotit được thay thế bởi các nhóm mới. Các đơn vị bazơ được giữ để lại với hợp chất nhắm đến axit nucleic thích hợp. Một hợp chất oligomeric này, dạng bất chức ARN mà được thể hiện đặc tính lai xuất sắc, được đề cập đến là axit nucleic peptit (PNA). Trong hợp chất PNA, mạch chính đường của ARN được thay thế bởi mạch chính chứa amit, *cụ thể là* mạch chính aminoethylglyxin. Nucleobazơ được giữ lại và liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với nguyên tử aza nitơ của phần amit của mạch chính. Sáng chế Mỹ tiêu biểu bộc lộ quy trình điều chế hợp chất PNA bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Sáng chế Mỹ số 5,539,082; 5,714,331; và 5,719,262, toàn bộ nội dung của mỗi tài liệu này được kết hợp ở đây để tham khảo. Các hợp chất PNA khác thích hợp để sử dụng trong các iARN theo sáng chế được mô tả trong, ví dụ, trong Nielsen và cộng sự., *Science*, 1991, 254, 1497-1500.

Một số phương án được đặc trưng theo sáng chế bao gồm các ARN với khung chính phosphorothioat và oligonucleosit với khung chính dị nguyên tử, và *cụ thể là* --CH₂--NH--CH₂--, --CH₂--N(CH₃)--O--CH₂--[được biết đến là khung chính metylen (metylimino) hoặc MMI], --CH₂--O--N(CH₃)--CH₂--, --CH₂--N(CH₃)--N(CH₃)--CH₂-- và --N(CH₃)--CH₂--CH₂--[trong đó khung chính phosphodiester tự nhiên được thể hiện là --O--P--O--CH₂--] của bằng sáng chế Mỹ được đề cập ở trên số 5,489,677, và khung chính amit của bằng sáng chế Mỹ số 5,602,240 được đề cập ở trên. Theo một số phương án, các ARN được mô tả ở đây có các cấu trúc mạch chính morpholino theo Sáng chế Mỹ số 5,034,506 được đề cập ở trên.

- 19 -

Các ARN được cải biến còn có thể chứa một hoặc nhiều gốc đường được thế. Các ARNi, ví dụ, các dsARN, được mô tả ở đây có thể bao gồm một trong số các hợp chất sau đây ở vị trí 2': OH; F; O-, S-, hoặc N-alkyl; O-, S-, hoặc N-alkenyl; O-, S- hoặc N-alkynyl; hoặc O-alkyl-O-alkyl, trong đó alkyl, alkenyl và alkynyl có thể được thế hoặc không được thế C₁ đến C₁₀ alkyl hoặc C₂ đến C₁₀ alkenyl và alkynyl. Các cải biến ví dụ thích hợp bao gồm O[(CH₂)_nO]_mCH₃, O(CH₂)_nOCH₃, O(CH₂)_nNH₂, O(CH₂)_nCH₃, O(CH₂)_nONH₂, và O(CH₂)_nON[(CH₂)_nCH₃]₂, trong đó n và m là từ 1 đến 10. Theo các phương án khác, các dsARN bao gồm một trong số các hợp chất sau đây ở vị trí 2': C₁ đến C₁₀ alkyl được thế, alkyl bậc thấp được thế, alkaryl, aralkyl, O-alkaryl hoặc O-aralkyl, SH, SCH₃, OCN, Cl, Br, CN, CF₃, OCF₃, SOCH₃, SO₂CH₃, ONO₂, NO₂, N₃, NH₂, heteroxycloalkyl, heteroxycloalkaryl, aminoalkylamino, polyalkylamino, silyl được thế, nhóm phân cắt ARN, nhóm báo cáo, nhóm chèn, nhóm làm tăng đặc tính dược động học của ARNi, hoặc nhóm làm tăng đặc tính dược lực học của ARNi, và nhóm thế khác có đặc tính tương tự. Theo một số phương án, sự cải biến bao gồm 2'-metoxyetoxy (2'-O--CH₂CH₂OCH₃, còn được gọi là 2'-O-(2-metoxetyl) hoặc 2'-MOE) (Martin và cộng sự., *Helv. Chim. Acta*, 1995, 78:486-504) tức là, nhóm alkoxy-alkoxy. Cải biến ví dụ khác là 2'-dimetylaminooxyetoxy, cụ thể là, nhóm O(CH₂)₂ON(CH₃)₂, còn gọi là 2'-DMAOE, như được mô tả trong các ví dụ dưới đây, và 2'-dimetylaminooxyetoxy (còn được biết đến trong lĩnh vực là 2'-O-dimetylaminooxyetyl hoặc 2'-DMAEOE), cụ thể là, 2'-O--CH₂--O--CH₂--N(CH₂)₂.

Các cải biến khác bao gồm 2'-metoxy (2'-OCH₃), 2'-aminopropoxy (2'-OCH₂CH₂CH₂NH₂) và 2'-flo (2'-F). Các cải biến tương tự còn có thể được thực hiện ở các vị trí khác trên ARN của ARNi, đặc biệt là vị trí 3' của đường trên nucleotit đầu 3' hoặc ở các dsARN liên kết 2'-5' và vị trí 5' của nucleotit đầu 5'. Các ARNi còn có thể có nhóm bất chức đường như gốc xyclobutyl ở vị trí của đường pentofuranosyl. Các bằng sáng chế Mỹ đại diện mà hướng dẫn việc điều chế của cấu trúc đường được cải biến này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Sáng chế Mỹ số. 4,981,957; 5,118,800; 5,319,080; 5,359,044; 5,393,878; 5,446,137; 5,466,786; 5,514,785; 5,519,134; 5,567,811; 5,576,427; 5,591,722; 5,597,909; 5,610,300; 5,627,053; 5,639,873; 5,646,265; 5,658,873; 5,670,633; và 5,700,920, các bằng sáng chế nhất định trong số chúng được sở hữu chung với đơn sáng chế này. Toàn bộ nội dung của mỗi tài liệu nêu trên được kết hợp ở đây để tham khảo.

- 20 -

ARNi còn có thể bao gồm các cải biến hoặc thay thế nucleobazơ (thường được đề cập đến trong lĩnh vực đơn giản là "bazơ"). Như được sử dụng ở đây, nucleobazơ "không được cải biến" hoặc "tự nhiên" bao gồm bazơ purin adenin (A) và guanin (G), và bazơ pyrimidin tymin (T), xytosin (C) và uraxil (U). Các nucleobazơ được cải biến bao gồm các nucleobazơ tự nhiên và tổng hợp khác như deoxy-tymin (dT), 5-metylxytosin (5-me-C), 5-hydroxymetyl xytosin, xanthin, hypoxanthin, 2-aminoadenin, 6-metyl và các dẫn xuất alkyl khác của adenin và guanin, 2-propyl và các dẫn xuất alkyl khác của adenin và guanin, 2-thiouraxil, 2-thiotymin và 2-thioxytosin, 5-halouraxil và xytosin, 5-propynyl uraxil và xytosin, 6-azo uraxil, xytosin và tymin, 5-uraxil (pseudouraxil), 4-thiouraxil, 8-halo, 8-amino, 8-thiol, 8-thioalkyl, 8-hydroxyl anal other 8-được thế adenin và guanin, 5-halo, cụ thể là 5-bromo, 5-triflometyl và uraxil được thế ở vị trí 5 khác và xytosin, 7-metylguanin và 7-metyladenin, 8-azaguanin và 8-azaadenin, 7-deazaguanin và 7-đazaadenin và 3-deazaguanin và 3-deazaadenin. Các nucleobazơ khác bao gồm các nucleobazơ được bộc lộ trong Sáng chế Mỹ số 3,687,808, các hợp chất được bộc lộ trong Modified Nucleosides in Biochemistry, Biotechnology and Medicine, Herdewijn, P. ed. Wiley-VCH, 2008; các hợp chất được bộc lộ trong The Concise Encyclopedia Of Polymer Science And Engineering, trang 858-859, Kroschwitz, J. L., ed. John Wiley & Sons, 1990, các hợp chất được bộc lộ bởi Englisch và cộng sự., Angewandte Chemie, Bản quốc tế, 1991, 30, 613, và các hợp chất được bộc lộ bởi Sanghvi, Y S., Chương 15, dsRNA Research and Applications, trang 289-302, Crooke, S. T. và Lebleu, B., Ed., CRC Press, 1993. Một số trong các nucleobazơ này đặc biệt là hữu dụng để làm tăng ái lực liên kết của các hợp chất oligome được đặc trưng theo sáng chế. Các hợp chất này bao gồm 5-được thế pyrimidin, 6-azapyrimidin và N-2, N-6 và 0-6 được thế purin, bao gồm 2-aminopropyladenin, 5-propynyluraxil và 5-propynylxytosin. Các sự thế 5-metylxytosin đã được thể hiện để làm tăng độ ổn định cặp đôi axit nucleic lên 0,6-1,2°C (Sanghvi, Y. S., Crooke, S. T. và Lebleu, B., Eds., dsRNA Research and Applications, CRC Press, Boca Raton, 1993, trang 276-278) và là các sự thế bazơ ví dụ, cụ thể hơn nữa khi được kết hợp với sự cải biến đường 2'-O-metoxetyl.

Các bằng sáng chế Mỹ đại diện mà hướng dẫn việc điều chế của các nucleobazơ được cải biến nhất định đã nêu ở trên cũng như là các nucleobazơ được cải biến khác bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Sáng chế Mỹ số. 3,687,808, 4,845,205; 5,130,30; 5,134,066; 5,175,273; 5,367,066; 5,432,272; 5,457,187; 5,459,255; 5,484,908; 5,502,177; 5,525,711;

- 21 -

5,552,540; 5,587,469; 5,594,121, 5,596,091; 5,614,617; 5,681,941; 5,750,692; 6,015,886; 6,147,200; 6,166,197; 6,222,025; 6,235,887; 6,380,368; 6,528,640; 6,639,062; 6,617,438; 7,045,610; 7,427,672; và 7,495,088, đã nêu ở trên toàn bộ nội dung của mỗi tài liệu này được kết hợp ở đây để tham khảo.

ARN của ARNi còn có thể được cải biến để bao gồm một hoặc nhiều axit nucleic khóa (LNA). Axit nucleic khóa là nucleotit có gốc riboza được cải biến trong đó gốc riboza bao gồm kết nối thêm nối các cacbon 2' và 4'. Cấu trúc này "khóa" một cách hiệu quả riboza trong thể cấu tạo nội cấu trúc 3'. Việc bổ sung axit nucleic khóa vào siARN đã được chứng tỏ là làm tăng độ ổn định siARN trong huyết thanh, và làm giảm hiệu quả lệch đích (Elmen, J. và cộng sự., (2005) *Nucleic Acids Research* 33(1):439-447; Mook, OR. và cộng sự., (2007) *Mol Canc Ther* 6(3):833-843; Grunweller, A. và cộng sự., (2003) *Nucleic Acids Research* 31(12):3185-3193).

Sáng chế Mỹ tiêu biểu bộc lộ quy trình điều chế axit nucleic khóa nucleotit bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các bằng sáng chế sau đây: Sáng chế Mỹ số. 6,268,490; 6,670,461; 6,794,499; 6,998,484; 7,053,207; 7,084,125; và 7,399,845, toàn bộ nội dung của mỗi tài liệu này được kết hợp ở đây để tham khảo.

Các cải biến làm ổn định tiềm năng cho các đầu của phân tử ARN có thể bao gồm N-(axetylaminocaproyl)-4-hydroxyprolinol (Hyp-C6-NHAc), N-(caproyl-4-hydroxyprolinol (Hyp-C6), N-(axetyl-4-hydroxyprolinol (Hyp-NHAc), tymidin-2'-0-đeoxytymidin (ete), N-(aminocaproyl)-4-hydroxyprolinol (Hyp-C6-amino), 2-đocosanoyl-uridin-3"-phosphat, dT bazơ đảo ngược (idT) và các hợp chất khác. Bộc lộ của cải biến này có thể tìm thấy trong Công bố đơn PCT số WO 2011/005861.

Các iARN được cải biến chứa các môtip theo sáng chế

Theo các khía cạnh nhất định của sáng chế, tác nhân ARNi mạch kép theo sáng chế bao gồm các tác nhân có các cải biến hóa học như được bộc lộ, ví dụ, trong Đơn tạm thời Mỹ số 61/561,710, nộp ngày 18 tháng 11 năm 2011, hoặc trong PCT/US2012/065691, nộp ngày 16 tháng 11 năm 2012, và được công bố dưới dạng WO2013075035 A1, toàn bộ nội dung của mỗi tài liệu này được kết hợp ở đây để tham khảo.

- 22 -

Như được thể hiện ở đây và trong đơn tạm thời số 61/561,710, có thể thu được kết quả tốt hơn bằng cách đưa vào một hoặc nhiều môtip của ba dạng cải biến giống nhau trên ba nucleotit liên tiếp vào sợi có nghĩa và/hoặc sợi đối nghĩa của tác nhân ARNi, đặc biệt là ở hoặc gần vị trí phân cắt. Theo một số phương án, sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa của tác nhân ARNi có thể còn được cải biến hoàn toàn. Việc đưa các kiểu này vào làm gián đoạn bản mẫu cải biến, nếu có, của sợi có nghĩa và/hoặc sợi đối nghĩa. Tác nhân ARNi có thể tùy ý liên hợp với phối tử dẫn xuất GalNAc, ví dụ trên sợi có nghĩa. Tác nhân ARNi thu được thể hiện hoạt tính gen cam cao.

Cụ thể hơn, đã bắt ngờ phát hiện ra rằng khi sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa của tác nhân ARNi mạch kép được cải biến để có một hoặc nhiều môtip của ba cải biến giống nhau trên ba nucleotit liên tiếp ở hoặc ở gần vị trí phân cắt của ít nhất một sợi của tác nhân ARNi, hoạt tính làm câm gen của tác nhân ARNi được tăng cường nhiều hơn.

Theo một phương án, tác nhân ARNi là đoạn cụt đầu đôi có chiều dài 19 nucleotit, trong đó sợi có nghĩa chứa ít nhất một kiểu trong ba cải biến 2'-F trên ba nucleotit liên tiếp ở các vị trí 7, 8, 9 từ đầu 5'. Sợi đối nghĩa chứa ít nhất một kiểu trong ba cải biến ở 2'-O-methyl trên ba nucleotit liên tiếp ở các vị trí 11, 12, 13 từ đầu 5'.

Theo phương án khác, tác nhân ARNi là đoạn cụt đầu đôi có chiều dài 20 nucleotit, trong đó sợi có nghĩa chứa ít nhất một kiểu trong ba cải biến 2'-F trên ba nucleotit liên tiếp ở các vị trí 8, 9, 10 từ đầu 5'. Sợi đối nghĩa chứa ít nhất một kiểu trong ba cải biến ở 2'-O-methyl trên ba nucleotit liên tiếp ở các vị trí 11, 12, 13 từ đầu 5'.

Theo phương án khác nữa, tác nhân ARNi là đoạn cụt đầu đôi có chiều dài 21 nucleotit, trong đó sợi có nghĩa chứa ít nhất một kiểu trong ba cải biến 2'-F trên ba nucleotit liên tiếp ở các vị trí 9, 10, 11 từ đầu 5'. Sợi đối nghĩa chứa ít nhất một kiểu trong ba cải biến ở 2'-O-methyl trên ba nucleotit liên tiếp ở các vị trí 11, 12, 13 từ đầu 5'.

Theo một phương án, tác nhân ARNi bao gồm sợi có nghĩa có 21 nucleotit và sợi đối nghĩa có 23 nucleotit, trong đó sợi có nghĩa chứa ít nhất một kiểu trong ba cải biến 2'-F trên ba nucleotit liên tiếp ở các vị trí 9, 10, 11 từ đầu 5'; sợi đối nghĩa chứa ít nhất một kiểu trong ba cải biến ở 2'-O-methyl trên ba nucleotit liên tiếp ở các vị trí 11, 12, 13 từ đầu 5', trong đó một đầu của tác nhân ARNi là cụt, trong khi đầu còn lại có 2 nucleotit nhô. Tốt hơn là, 2 nucleotit nhô là ở đầu 3' của sợi đối nghĩa. Khi 2 nucleotit nhô là ở đầu 3' của sợi

- 23 -

đối nghĩa, có thể có hai kết nối phosphorothioat liên nucleotit giữa ba nucleotit đầu, trong đó hai trong ba nucleotit là nucleotit nhô, và nucleotit thứ ba là nucleotit bắt cặp tiếp theo nucleotit nhô. Theo một phương án, tác nhân ARNi còn có hai kết nối phosphorothioat liên nucleotit giữa ba nucleotit đầu ở đầu 5' của sợi có nghĩa và ở đầu 5' của sợi đối nghĩa. Theo một phương án, mỗi nucleotit trong sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa của tác nhân ARNi, bao gồm nucleotit là một phần của kiểu là nucleotit cải biến. Theo một phương án mỗi đuôi độc lập được cải biến bằng 2'-O-metyl hoặc 3'-flo, *ví dụ*, theo môtip xen kẽ. Tùy ý, tác nhân ARNi còn bao gồm phối tử (tốt hơn là GalNAc₃).

Theo một phương án, tác nhân ARNi có chứa sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa, trong đó tác nhân ARNi có chứa sợi thứ nhất có chiều dài bằng ít nhất là 25 và nhiều nhất là 29 nucleotit và sợi thứ hai có chiều dài nhiều nhất là 30 nucleotit có ít nhất một môtip của ba cải biến 2'-O-metyl trên ba nucleotit liên tiếp ở vị trí 11, 12, 13 từ đầu 5'; trong đó đầu 3' của sợi thứ nhất và đầu 5' của sợi thứ hai tạo thành đầu cụt và sợi thứ hai dài hơn 1-4 nucleotit ở đầu 3' của nó so với sợi thứ nhất, trong đó vùng cặp đôi mà có chiều dài ít nhất là 25 nucleotit, và sợi thứ hai bổ sung đủ với mARN đích dọc theo ít nhất là 19 nucleotit của chiều dài sợi thứ hai làm giảm sự biểu hiện gen đích khi tác nhân ARNi được đưa vào tế bào động vật có vú, và trong đó sự phân cắt dicer của tác nhân ARNi tốt hơn là tạo ra siARN chứa đầu 3' của sợi thứ hai, bằng cách đó làm giảm sự biểu hiện của gen đích ở động vật có vú. Tùy ý, tác nhân ARNi còn bao gồm phối tử.

Theo một phương án, sợi có nghĩa của tác nhân ARNi chứa ít nhất một kiểu trong số ba cải biến giống nhau trên ba nucleotit liên tiếp, khi một trong các kiểu xảy ra ở vị trí phân cắt trong sợi có nghĩa.

Theo một phương án, sợi đối nghĩa của tác nhân ARNi còn có thể chứa ít nhất một kiểu trong số ba cải biến giống nhau trên ba nucleotit liên tiếp, khi một trong số các kiểu xảy ra trên hoặc gần vị trí phân cắt trong sợi đối nghĩa.

Đối với tác nhân ARNi có vùng cặp đôi có chiều dài là 17-23 nucleotit, vị trí phân cắt của sợi đối nghĩa thường vào khoảng 10, 11 và 12 vị trí từ đầu 5'. Do đó một môtip trong ba cải biến giống nhau có thể xuất hiện ở các vị trí 9, 10, 11; các vị trí 10, 11, 12; các vị trí 11, 12, 13; các vị trí 12, 13, 14; hoặc các vị trí 13, 14, 15 của sợi đối nghĩa, tính từ nucleotit thứ nhất từ đầu 5' của sợi đối nghĩa, hoặc, tính từ nucleotit bắt cặp thứ nhất trong vùng sợi

- 24 -

kép từ đầu 5' của sợi đối nghĩa. Vị trí phân cắt trong sợi đối nghĩa có thể còn có thể thay đổi theo chiều dài của vùng kép của ARNi từ đầu 5'.

Sợi có nghĩa của tác nhân ARNi có thể chứa ít nhất một kiểu trong số ba cải biến giống nhau trên ba nucleotit liên tiếp ở vị trí phân cắt của sợi; và sợi đối nghĩa có thể có ít nhất một kiểu trong số ba cải biến giống nhau trên ba nucleotit liên tiếp ở hoặc gần vị trí phân cắt của sợi. Khi sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa tạo thành dsARN kép, sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa có thể sắp thẳng hàng sao cho một môtip trong số ba nucleotit trên sợi có nghĩa và một môtip trong số ba nucleotit trên sợi đối nghĩa có ít nhất một trùng lặp nucleotit, *cụ thể là*, ít nhất một trong số ba nucleotit của môtip trong sợi có nghĩa tạo thành cặp bazơ với ít nhất một trong số ba nucleotit của môtip trong sợi đối nghĩa. Tùy ý, ít nhất hai nucleotit có thể trùng lặp, hoặc cả ba nucleotit có thể trùng lặp.

Theo một phương án, sợi có nghĩa của tác nhân ARNi có thể chứa nhiều hơn một kiểu trong số ba cải biến giống nhau trên ba nucleotit liên tiếp. Kiểu thứ nhất có thể xảy ra ở hoặc gần vị trí phân cắt của sợi và kiểu còn lại có thể là cải biến cánh. Thuật ngữ "cải biến cánh" ở đây đề cập đến kiểu xảy ra ở phần khác của sợi mà tách biệt với kiểu ở hoặc gần vị trí phân cắt của cùng sợi. Sự cải biến cánh ở liền kề với môtip thứ nhất hoặc được tách biệt bởi ít nhất một hoặc nhiều nucleotit. Khi các môtip nằm ngay kề nhau thì hóa học của các môtip phân biệt với nhau và khi các môtip được phân tách bởi một hoặc nhiều nucleotit thì hóa học có thể giống nhau hoặc khác nhau. Hai hoặc nhiều cải biến cánh có thể có mặt. Ví dụ, khi hai cải biến cánh có mặt, mỗi cải biến cánh có thể xảy ra ở một đầu so với kiểu thứ nhất mà ở hoặc gần vị trí phân cắt hoặc trên một trong các bên của kiểu dẫn.

Giống như sợi có nghĩa, sợi đối nghĩa của tác nhân ARNi có thể chứa nhiều hơn một kiểu của ba cải biến giống nhau trên ba nucleotit liên tiếp, với ít nhất một trong số các kiểu xảy ra ở hoặc gần vị trí phân cắt của sợi. Sợi đối nghĩa này có thể còn chứa một hoặc nhiều cải biến cánh trong xếp hàng tương tự với cải biến cánh có thể có mặt trên sợi có nghĩa.

Theo một phương án, cải biến cánh trên sợi có nghĩa hoặc sợi đối nghĩa của tác nhân ARNi thường không bao gồm một hoặc hai nucleotit đầu thứ nhất ở đầu 3', đầu 5' hoặc cả hai đầu của sợi.

- 25 -

Theo phương án khác, cải biến cánh trên sợi có nghĩa hoặc sợi đối nghĩa của tác nhân ARNi thường không bao gồm một hoặc hai nucleotit bắt cặp thứ nhất trong vùng kép ở đầu 3', đầu 5' hoặc cả hai đầu của sợi.

Khi mỗi sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa của tác nhân ARNi chứa ít nhất một cải biến cánh, cải biến cánh có thể ở trên cùng đầu của vùng kép, và có trùng lặp của một, hai hoặc ba nucleotit.

Khi mỗi sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa của tác nhân ARNi chứa ít nhất hai cải biến cánh, sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa có thể sắp thẳng hàng sao cho một trong hai cải biến từ một sợi ở trên một đầu của vùng kép, có trùng lặp của một, hai hoặc ba nucleotit; một trong hai cải biến từ một sợi ở trên đầu còn lại của vùng kép, có trùng lặp của một, hai hoặc ba nucleotit; hai cải biến từ một sợi ở trên mỗi bên của kiểu dẫn, có trùng lặp của một, hai hoặc ba nucleotit trong vùng kép.

Theo một phương án, mỗi nucleotit trong sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa của tác nhân ARNi, bao gồm nucleotit mà một phần của kiểu, có thể được cải biến. Mỗi nucleotit có thể được cải biến bằng cải biến giống hoặc khác nhau mà có thể bao gồm một hoặc nhiều thay thế của một hoặc cả hai oxy phosphat không liên kết và/hoặc của một hoặc nhiều oxy phosphat liên kết; thay thế thành phần của đường riboza, ví dụ, của 2' hydroxyl trên đường riboza; toàn bộ thay thế của gốc phosphat với các liên kết "đephospho"; cải biến hoặc thay thế bazơ có trong tự nhiên; và thay thế hoặc cải biến khung chính riboza-phosphat.

Khi axit nucleic là polyme của các dưới đơn vị, nhiều cải biến xảy ra ở vị trí mà được lặp lại trong axit nucleic, ví dụ, sự cải biến của bazơ, hoặc gốc phosphat, hoặc O không liên kết của gốc phosphat. Trong một số trường hợp cải biến sẽ xảy ra ở tất cả các vị trí đối tượng trong axit nucleic nhưng trong nhiều trường hợp sẽ không như vậy. Ví dụ như, sự cải biến có thể chỉ xảy ra ở vị trí đầu tận cùng 3' hoặc 5', có thể chỉ xảy ra ở vùng đầu tận cùng, ví dụ, ở vị trí trên nucleotit đầu tận cùng hoặc ở 2, 3, 4, 5, hoặc 10 nucleotit cuối cùng của sợi. Cải biến có thể xảy ra trong vùng sợi kép, vùng sợi đơn, hoặc trong cả hai. Cải biến có thể xảy ra chỉ trong vùng sợi kép của ARN hoặc có thể chỉ xảy ra trong vùng sợi đơn của ARN. Ví dụ, sự cải biến phosphorothioat ở O không liên kết vị trí có thể chỉ xảy ra ở một hoặc cả hai đầu tận cùng, có thể chỉ xảy ra ở vùng đầu tận cùng, ví dụ, ở vị trí trên nucleotit đầu tận cùng hoặc trong 2, 3, 4, 5, hoặc 10 nucleotit cuối cùng của sợi, hoặc có thể xảy ra ở

- 26 -

vùng sợi kép và vùng sợi đơn, cụ thể là ở đầu tận cùng. Các đầu hoặc đầu 5' có thể được phosphoryl hóa.

Có thể là, ví dụ, làm tăng cường độ ổn định, bao gồm các bazơ cụ thể ở phần nhô, hoặc bao gồm các nucleotit được cải biến hoặc chất thay thế nucleotit, ở phần nhô sợi đơn, ví dụ, ở phần nhô 5' hoặc 3', hoặc ở cả hai. Ví dụ, có thể mong muốn chứa purin nucleotit trong các phần nhô. Theo một số phương án tất cả hoặc một số bazơ ở phần nhô 3' hoặc 5' có thể được cải biến, ví dụ, bằng sự cải biến được mô tả trong bản mô tả này. Cải biến có thể bao gồm, ví dụ, việc sử dụng cải biến ở vị trí 2' của đường ribosa với sự cải biến mà đã biết trong lĩnh vực, ví dụ, việc sử dụng deoxyribonucleotit, 2'-deoxy-2'-floro (2'-F) hoặc 2'-O-metyl được cải biến thay vì đường ribo của nucleobazơ, và sự cải biến ở nhóm phosphat, ví dụ, sự cải biến phosphorothioat. Các phần nhô cần phải tương đồng với trình tự đích.

Theo một phương án, mỗi phần dư của sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa độc lập được cải biến với LNA, HNA, CeNA, 2'-metoxyetyl, 2'-O-metyl, 2'-O-allyl, 2'-C-allyl, 2'-khử oxy, 2'-hydroxyl, hoặc 2'-flo. Các sợi có thể chứa nhiều hơn một cải biến. Theo một phương án, mỗi phần dư của sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa độc lập được cải biến với 2'-O-metyl hoặc 2'-flo.

Ít nhất hai cải biến khác nhau thường có mặt trên sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa. Hai cải biến này có thể là các cải biến 2'-O-metyl hoặc 2'-flo, hoặc cải biến khác.

Theo một phương án, N_a và/hoặc N_b bao gồm các cải biến của bản mẫu thay thế. Thuật ngữ "bản mẫu thay thế" như được sử dụng ở đây đề cập đến kiểu có một hoặc nhiều cải biến, mỗi cải biến xảy ra trên các nucleotit thay thế của một sợi. Nucleotit thay thế có thể đề cập đến một trên mỗi nucleotit khác hoặc một trên mỗi ba nucleotit, hoặc mẫu tương tự. Ví dụ, nếu A, B và C lần lượt thể hiện một loại cải biến nucleotit, mẫu thay thế có thể là "ABABABABABAB...", "AABBAABBAABB...", "AABAABAABAAB...", "AAABAAABAAAB...", "AAABBBAAABBB...", hoặc "ABCABCABCABC...", v.v.

Loại của các cải biến có chứa trong mẫu thay thế có thể giống hoặc khác nhau. Ví dụ, nếu A, B, C, D lần lượt thể hiện một loại cải biến trên nucleotit, kiểu xen kẽ, *cụ thể là*, các cải biến trên mỗi nucleotit khác, có thể là giống nhau, nhưng mỗi sợi có nghĩa hoặc sợi đối nghĩa có thể được chọn từ một vài khả năng của các cải biến trong môtip xen kẽ như "ABABAB...", "ACACAC..." "BDBDBD..." hoặc "CDCDCD...", v.v.

- 27 -

Theo một phương án, tác nhân ARNi theo sáng chế bao gồm cải biến bản mẫu cho mẫu xen kẽ trên sợi có nghĩa so với cải biến bản mẫu cho mẫu xen kẽ trên sợi đối nghĩa được thay đổi. Việc thay đổi có thể với nhóm được cải biến như vậy của nucleotit của sợi có nghĩa tương ứng với nhóm được cải biến khác của các nucleotit của sợi đối nghĩa và *ngược lại*. Ví dụ, sợi có nghĩa khi bắt cặp với sợi đối nghĩa trong dsARN kép, mẫu xen kẽ trong sợi có nghĩa có thể bắt đầu với "ABABAB" từ 5'-3' của sợi và mẫu xen kẽ trong sợi đối nghĩa có thể bắt đầu với "BABABA" từ 5'-3' của sợi trong vùng kép. Một ví dụ khác là, môtip luân phiên trong sợi có nghĩa có thể bắt đầu với "AABBAABB" từ 5'-3' của sợi và môtip luân phiên trong sợi đối nghĩa có thể bắt đầu với "BBAABBAA" từ 5'-3' của sợi trong vùng cặp đôi, sao cho có sự dịch chuyển hoàn toàn hoặc một phần của mô hình cải biến giữa sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa.

Theo một phương án, tác nhân ARNi bao gồm kiểu của môtip xen kẽ của cải biến 2'-O-metyl và cải biến 2'-F trên sợi có nghĩa ban đầu có thay đổi so với kiểu của môtip xen kẽ của cải biến 2'-O-metyl và cải biến 2'-F trên sợi đối nghĩa ban đầu, *cụ thể là*, 2'-O-metyl nucleotit cải biến trên sợi có nghĩa cặp bazơ với 2'-F nucleotit cải biến trên sợi đối nghĩa và ngược lại. Vị trí 1 của sợi có nghĩa có thể bắt đầu với cải biến ở 2'-F, và vị trí 1 của sợi đối nghĩa có thể bắt đầu với cải biến 2'-O-metyl.

Sự xuất hiện của một hoặc nhiều kiểu của ba cải biến giống nhau trên ba nucleotit liên tiếp với sợi có nghĩa và/hoặc sợi đối nghĩa làm gián đoạn bản mẫu cải biến ban đầu có mặt trong sợi có nghĩa và/hoặc sợi đối nghĩa. Sự ngắt quãng này của mô hình cải biến của sợi có nghĩa và/hoặc sợi đối nghĩa bằng cách đưa một hoặc nhiều môtip của ba cải biến giống nhau trên ba nucleotit liên tiếp vào sợi có nghĩa và/hoặc sợi đối nghĩa làm tăng cường một cách đáng ngạc nhiên hoạt tính làm câm gen cho gen đích.

Theo một phương án, khi môtip của ba cải biến giống nhau trên ba nucleotit liên tiếp được đưa vào sợi bất kỳ, sự cải biến của nucleotit ở gần môtip này là sự cải biến khác với sự cải biến của môtip này. Ví dụ, phần của trình tự chứa môtip là "...N_aYYYN_b..." khi "Y" thể hiện cải biến của môtip ba cải biến giống nhau trên ba nucleotit liên tiếp, và "N_a" và "N_b" thể hiện cải biến cho nucleotit tiếp theo môtip "YYY" khác với cải biến của Y, và khi N_a và N_b có thể là các cải biến giống hoặc khác nhau. Theo cách khác, N_a và/hoặc N_b có thể có mặt hoặc vắng mặt khi có sự cải biến cánh.

- 28 -

Tác nhân ARNi có thể còn bao gồm ít nhất một kết nối phosphorothioat hoặc methylphosphonat liên nucleotit. Cải biến cầu nối phosphorothioat hoặc methylphosphonat liên nucleotit có thể xảy ra trên nucleotit bất kỳ của sợi có nghĩa hoặc sợi đối nghĩa hoặc cả hai sợi ở vị trí bất kỳ của sợi. Ví dụ, cải biến kết nối liên nucleotit có thể xảy ra trên mỗi nucleotit trên sợi có nghĩa và/hoặc sợi đối nghĩa; mỗi cải biến kết nối liên nucleotit có thể xảy ra trong bản mẫu xen kẽ trên sợi có nghĩa và/hoặc sợi đối nghĩa; hoặc sợi có nghĩa hoặc sợi đối nghĩa có thể chứa cả cải biến kết nối liên nucleotit trong bản mẫu xen kẽ. Bản mẫu xen kẽ của cải biến kết nối liên nucleotit trên sợi có nghĩa có thể giống hoặc khác nhau so với sợi đối nghĩa, và bản mẫu xen kẽ của cải biến kết nối liên nucleotit trên sợi có nghĩa có thể có thay đổi so với bản mẫu xen kẽ của cải biến kết nối liên nucleotit trên sợi đối nghĩa.

Theo một phương án, ARNi bao gồm cải biến kết nối phosphorothioat hoặc methylphosphonat liên nucleotit trong vùng nhô. Ví dụ, vùng nhô có thể chứa hai nucleotit có kết nối phosphorothioat hoặc methylphosphonat liên nucleotit giữa hai nucleotit. Cải biến kết nối liên nucleotit còn có thể dùng để liên kết nucleotit nhô với nucleotit bắt cặp đầu trong vùng kếp. Ví dụ, ít nhất 2, 3, 4, hoặc tất cả nucleotit nhô có thể được liên kết thông qua kết nối phosphorothioat hoặc methylphosphonat liên nucleotit, và tùy ý, có thể là kết nối phosphorothioat hoặc methylphosphonat liên nucleotit bổ sung liên kết nucleotit nhô với nucleotit bắt cặp mà tiếp theo nucleotit nhô. Ví dụ, có thể là ít nhất hai kết nối phosphorothioat liên nucleotit giữa ba nucleotit đầu, trong đó hai trong số ba nucleotit là nucleotit nhô, và nucleotit thứ ba là nucleotit bắt cặp tiếp theo nucleotit nhô. Ba nucleotit đầu này có thể là ở đầu 3' của sợi đối nghĩa, đầu 3' của sợi có nghĩa, đầu 5' của sợi đối nghĩa, và/hoặc đầu 5' của sợi đối nghĩa.

Theo một phương án, 2 nucleotit nhô là ở đầu 3' của sợi đối nghĩa, và có hai kết nối phosphorothioat liên nucleotit giữa ba nucleotit đầu, trong đó hai trong số ba nucleotit là nucleotit nhô, và nucleotit thứ ba là nucleotit bắt cặp tiếp theo nucleotit nhô. Tùy ý, tác nhân ARNi có thể có thêm hai kết nối phosphorothioat liên nucleotit giữa ba nucleotit đầu ở cả đầu 5' của sợi có nghĩa và ở đầu 5' của sợi đối nghĩa.

Theo một phương án, tác nhân ARNi bao gồm (các) sự bắt cặp nhằm với đích, trong cấu trúc kếp, hoặc tổ hợp của chúng. Sự bắt cặp nhằm có thể xảy ra trong vùng nhô hoặc vùng cặp đôi. Cặp bazơ có thể được xếp loại dựa trên xu hướng thúc đẩy phân tách hoặc

- 29 -

nóng chảy của chúng (*ví dụ*, trên năng lượng tự do của liên kết hoặc phân tách của cụ thể bất cặp, tiếp cận đơn giản nhất là thẩm định các cặp trên cơ sở cặp đơn, qua phân tích cặp bên cạnh hoặc tương tự còn có thể được sử dụng). Liên quan đến thúc đẩy phân tách: A:U được ưu tiên so với G:C; G:U được ưu tiên so với G:C; và I:C được ưu tiên so với G:C (I=inosin). Sự bắt cặp nhầm, *ví dụ*, bắt cặp không chuẩn tắc hoặc khác chuẩn tắc (như được mô tả đầu đó trong bản mô tả này) được ưu tiên so với bắt cặp chuẩn tắc (A:T, A:U, G:C); và bắt cặp mà bao gồm bazơ chung được ưu tiên so với bắt cặp chuẩn tắc.

Theo một phương án, tác nhân ARNi bao gồm ít nhất một của 1, 2, 3, 4, hoặc 5 cặp bazơ thứ nhất trong vùng kẹp từ đầu 5' của sợi đối nghĩa độc lập được chọn từ: A:U, G:U, I:C, và các cặp bắt cặp nhầm, *ví dụ*, bắt cặp không chuẩn tắc hoặc không phải chuẩn tắc hoặc sự bắt cặp mà bao gồm bazơ chung, để thúc đẩy sự phân ly của sợi đối nghĩa ở đầu 5' của kẹp.

Theo một phương án, nucleotit ở 1 vị trí trong vùng kẹp từ đầu 5' trong sợi đối nghĩa được chọn từ nhóm gồm có A, dA, dU, U, và dT. Tùy ý, ít nhất một trong số 1, 2 hoặc 3 cặp bazơ thứ nhất trong vùng kẹp từ đầu 5' của sợi đối nghĩa là cặp bazơ AU. Ví dụ, cặp bazơ thứ nhất trong vùng kẹp từ đầu 5' của sợi đối nghĩa là cặp bazơ AU.

Theo một phương án, trình tự sợi có nghĩa có thể được thể hiện bởi công thức (I):

$$5' n_p-N_a-(X X X)_i-N_b-Y Y Y-N_b-(Z Z Z)_j-N_a-n_q 3' \quad (I)$$

trong đó:

mỗi i và j độc lập bằng 0 hoặc 1;

mỗi p và q độc lập bằng 0-6;

mỗi N_a độc lập tượng trưng cho trình tự oligonucleotit chứa 0-25 nucleotit cải biến, mỗi trình tự chứa ít nhất hai nucleotit được cải biến theo cách khác nhau;

mỗi N_b độc lập tượng trưng cho trình tự oligonucleotit bao gồm 0-10 nucleotit cải biến;

mỗi n_p và n_q độc lập có phần nucleotit nhô ra;

trong đó N_b và Y không có cùng cải biến; và

- 30 -

mỗi XXX, YYY và ZZZ mỗi độc lập thể hiện một kiểu trong số ba cải biến giống nhau trên ba nucleotit liên tiếp. Tốt hơn là tất cả YYY là 2'-F nucleotit cải biến.

Theo một phương án, N_a và/hoặc N_b bao gồm các cải biến theo kiểu xen kẽ.

Theo một phương án, kiểu YYY xảy ra trên hoặc gần vị trí phân cắt của sợi có nghĩa. Ví dụ, khi tác nhân ARNi có vùng kếp có chiều dài nằm trong khoảng 17-23 nucleotit, kiểu YYY có thể xảy ra ở hoặc vùng lân cận của vị trí phân cắt (ví dụ: có thể xảy ra ở các vị trí 6, 7, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 10, 11, 12 hoặc 11, 12, 13) của - sợi có nghĩa, bắt đầu tính từ nucleotit thứ nhất, từ đầu 5'; hoặc tùy ý, bắt đầu tính từ nucleotit bắt cặp thứ nhất trong vùng kếp, từ đầu 5'.

Theo một phương án, i bằng 1 và j bằng 0, hoặc i bằng 0 và j bằng 1, hoặc cả i và j đều bằng 1. Do đó sợi có nghĩa có thể được thể hiện bởi công thức sau:

5' n_p - N_a -YYY- N_b -ZZZ- N_a - n_q 3' (Ib);

5' n_p - N_a -XXX- N_b -YYY- N_a - n_q 3' (Ic); hoặc

5' n_p - N_a -XXX- N_b -YYY- N_b -ZZZ- N_a - n_q 3' (Id).

Khi sợi có nghĩa được thể hiện bởi công thức (Ib), N_b thể hiện trình tự oligonucleotit bao gồm 0-10, 0-7, 0-5, 0-4, 0-2 hoặc 0 nucleotit cải biến. Mỗi N_a độc lập có thể tương trưng cho trình tự oligonucleotit chứa 2-20, 2-15, hoặc 2-10 nucleotit cải biến.

Khi sợi có nghĩa được biểu diễn dưới dạng công thức (Ic), N_b thể hiện trình tự oligonucleotit bao gồm 0-10, 0-7, 0-10, 0-7, 0-5, 0-4, 0-2 hoặc 0 nucleotit cải biến. Mỗi N_a có thể độc lập tương trưng cho trình tự oligonucleotit bao gồm 2-20, 2-15, hoặc 2-10 nucleotit cải biến.

Khi sợi có nghĩa được biểu diễn dưới dạng công thức (Id), mỗi N_b độc lập tương trưng cho trình tự oligonucleotit bao gồm 0-10, 0-7, 0-5, 0-4, 0-2 hoặc 0 nucleotit cải biến. Tốt hơn là, N_b là 0, 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 6 mỗi N_a có thể độc lập thể hiện trình tự oligonucleotit bao gồm 2-20, 2-15, hoặc 2-10 nucleotit cải biến.

Mỗi trong số X, Y và Z có thể giống hoặc khác nhau.

Theo các phương án khác, i bằng 0 và j bằng 0, và sợi có nghĩa có thể được thể hiện bởi công thức:

- 31 -

$5' n_p-N_a-YYY-N_a-n_q 3'$ (Ia).

Nếu sợi có nghĩa được biểu diễn bởi công thức (Ia), mỗi N_a độc lập có thể tượng trưng cho trình tự oligonucleotit chứa 2-20, 2-15, hoặc 2-10 nucleotit cải biến.

Theo một phương án, trình tự sợi đối nghĩa của ARNi có thể được thể hiện bởi công thức (II):

$5' n_q-N_a'-(Z'Z'Z')_k-N_b'-Y'Y'Y'-N_b'-(X'X'X')_l-N_a'-n_p' 3'$ (II)

trong đó:

mỗi k và l độc lập bằng 0 hoặc 1;

mỗi p' và q' độc lập bằng 0-6;

mỗi N_a' độc lập tượng trưng cho trình tự oligonucleotit chứa 0-25 nucleotit cải biến, mỗi trình tự chứa ít nhất hai nucleotit được cải biến theo cách khác nhau;

mỗi N_b' độc lập tượng trưng cho trình tự oligonucleotit bao gồm 0-10 nucleotit cải biến;

mỗi n_p' và n_q' độc lập có phần nucleotit nhô ra;

trong đó N_b' và Y' không có cùng cải biến;

và

$X'X'X'$, $Y'Y'Y'$ và $Z'Z'Z'$ mỗi độc lập thể hiện một kiểu trong số ba cải biến giống nhau trên ba nucleotit liên tiếp.

Theo một phương án, N_a' và/hoặc N_b' bao gồm các cải biến theo kiểu xen kẽ.



Kiểu $Y'Y'Y'$ xảy ra trên hoặc gần vị trí phân cắt của sợi đối nghĩa. Ví dụ, khi tác nhân ARNi có vùng cặp đôi có chiều dài là 17-23 nucleotit, môtip $Y'Y'Y'$ có thể xảy ra ở vị trí 9, 10, 11; 10, 11, 12; 11, 12, 13; 12, 13, 14 ; hoặc 13, 14, 15 của sợi đối nghĩa, bắt đầu đếm từ nucleotit thứ nhất, từ đầu $5'$; hoặc một cách tùy ý, bắt đầu đếm từ nucleotit được bắt cặp thứ nhất trong vùng cặp đôi, từ đầu $5'$. Tốt hơn là, kiểu $Y'Y'Y'$ xảy ra ở các vị trí 11, 12, 13.

Theo một phương án, tất cả kiểu $Y'Y'Y'$ là nucleotit cải biến 2'-OMe.

- 32 -

Theo một phương án, k bằng 1 và l bằng 0, hoặc k bằng 0 và l bằng 1, hoặc cả k và l đều bằng 1.

Do đó sợi đối nghĩa có thể được thể hiện bởi công thức sau:




Khi sợi đối nghĩa được thể hiện bởi công thức (IIb), N_b' thể hiện trình tự oligonucleotit chứa 0-10, 0-7, 0-10, 0-7, 0-5, 0-4, 0-2 hoặc 0 nucleotit được cải biến. Mỗi N_a' độc lập thể hiện trình tự oligonucleotit bao gồm 2-20, 2-15, hoặc 2-10 nucleotit cải biến.

Khi sợi đối nghĩa được thể hiện là công thức (IIc), N_b' thể hiện trình tự oligonucleotit bao gồm 0-10, 0-7, 0-10, 0-7, 0-5, 0-4, 0-2 hoặc 0 nucleotit cải biến. Mỗi N_a' độc lập thể hiện trình tự oligonucleotit bao gồm 2-20, 2-15, hoặc 2-10 nucleotit cải biến.

Khi sợi đối nghĩa được thể hiện là công thức (IIId), mỗi N_b' độc lập thể hiện trình tự oligonucleotit bao gồm 0-10, 0-7, 0-10, 0-7, 0-5, 0-4, 0-2 hoặc 0 nucleotit cải biến. Mỗi N_a' độc lập thể hiện trình tự oligonucleotit bao gồm 2-20, 2-15, hoặc 2-10 nucleotit cải biến. Tốt hơn là, N_b là 0, 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 6.

Theo các phương án khác, k bằng 0 và l bằng 0 và sợi đối nghĩa có thể được thể hiện bởi công thức:



Khi sợi đối nghĩa được thể hiện là công thức (IIa), mỗi N_a' độc lập thể hiện trình tự oligonucleotit bao gồm 2-20, 2-15, hoặc 2-10 nucleotit cải biến.

Mỗi trong số X' , Y' và Z' có thể giống hoặc khác nhau lẫn nhau.

Mỗi nucleotit của sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa có thể độc lập được cải biến với LNA, HNA, CeNA, 2'-metoxyetyl, 2'-O-metyl, 2'-O-alyl, 2'-C- alyl, 2'-hydroxyl, hoặc 2'-flo. Ví dụ, mỗi nucleotit của sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa độc lập được cải biến với 2'-O-metyl hoặc 2'-flo. Mỗi X , Y , Z , X' , Y' và Z' , cụ thể là, có thể thể hiện cải biến ở 2'-O-metyl hoặc cải biến ở 2'-flo.

- 33 -

Theo một phương án, sợi có nghĩa của tác nhân ARNi có thể chứa YYY kiểu xảy ra ở 9, 10 và 11 các vị trí của sợi khi vùng kép là 21 nt, bắt đầu tính từ nucleotit thứ nhất từ đầu 5', hoặc tùy ý, bắt đầu tính từ nucleotit bắt cặp thứ nhất trong vùng kép, từ đầu 5'; và Y thể hiện cải biến ở 2'-F. Sợi có nghĩa có thể còn chứa kiểu XXX hoặc kiểu ZZZ làm cải biến cánh ở đầu đối diện của vùng kép; và mỗi XXX và ZZZ độc lập thể hiện cải biến ở 2'-OMe hoặc cải biến ở 2'-F.

Theo một phương án sợi đối nghĩa có thể chứa kiểu Y'Y'Y' xảy ra ở các vị trí 11, 12, 13 của sợi, bắt đầu tính từ nucleotit thứ nhất từ đầu 5', hoặc tùy ý, bắt đầu tính từ nucleotit bắt cặp thứ nhất trong vùng kép, từ đầu 5'; và Y' thể hiện cải biến ở 2'-O-metyl. Sợi đối nghĩa có thể còn chứa kiểu X'X'X' hoặc kiểu Z'Z'Z' làm cải biến cánh ở đầu đối diện của vùng kép; và mỗi X'X'X' và Z'Z'Z' độc lập thể hiện cải biến ở 2'-OMe hoặc cải biến ở 2'-F.

Sợi có nghĩa được thể hiện bởi công thức bất kỳ trong số các công thức nêu trên (Ia), (Ib), (Ic), và (Id) tạo thành cặp đôi với sợi đối nghĩa lần lượt được thể hiện bởi công thức bất kỳ trong số các công thức (IIa), (IIb), (IIc), và (IId).

Theo đó, các tác nhân ARNi dùng trong phương pháp theo sáng chế có thể bao gồm sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa, mỗi sợi có từ 14 đến 30 nucleotit, ARNi kép được thể hiện bởi công thức (III):

có nghĩa: $5' n_p - N_a - (X X X)_i - N_b - Y Y Y - N_b - (Z Z Z)_j - N_a - n_q 3'$

đối nghĩa: $3' n_p' - N_a' - (X'X'X')_k - N_b' - Y'Y'Y' - N_b' - (Z'Z'Z')_l - N_a' - n_q' 5'$

(III)

trong đó:

mỗi i, j, k, và l độc lập bằng 0 hoặc 1;

mỗi p, p', q, và q' độc lập bằng 0-6;

mỗi N_a và N_a' độc lập thể hiện trình tự oligonucleotit chứa 0-25 nucleotit được cải biến, mỗi trình tự chứa ít nhất hai nucleotit được cải biến khác nhau;

mỗi N_b và N_b' độc lập thể hiện trình tự oligonucleotit chứa 0-10 nucleotit được cải biến;

trong đó

- 34 -

mỗi n_p' , n_p , n_q' , và n_q , mỗi trong số đó có thể có mặt hoặc không, độc lập có phần nucleotit nhô ra; và



mỗi XXX, YYY, ZZZ, X'X'X', Y'Y'Y', và Z'Z'Z' mỗi độc lập thể hiện một kiểu trong số ba cải biến giống nhau trên ba nucleotit liên tiếp.

Theo một phương án, i bằng 0 và j bằng 0; hoặc i bằng 1 và j bằng 0; hoặc i bằng 0 và j bằng 1; hoặc cả i và j đều bằng 0; hoặc cả i và j đều bằng 1. Theo phương án khác, k bằng 0 và l bằng 0; hoặc k bằng 1 và l bằng 0; k bằng 0 và l bằng 1; hoặc cả k và l đều bằng 0; hoặc cả k và l đều bằng 1.



Tổ hợp ví dụ về sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa tạo thành ARNi kép có công thức dưới đây:



(IIIa)



(IIIb)



(IIIc)



(IIIId)

Khi tác nhân ARNi được thể hiện bởi công thức (IIIa), mỗi N_a độc lập thể hiện trình tự oligonucleotit bao gồm 2-20, 2-15, hoặc 2-10 nucleotit cải biến.

- 35 -

Khi tác nhân ARNi được thể hiện bởi công thức (IIIb), mỗi N_b độc lập thể hiện trình tự oligonucleotit bao gồm 1-10, 1-7, 1-5 hoặc 1-4 nucleotit cải biến. Mỗi N_a độc lập thể hiện trình tự oligonucleotit bao gồm 2-20, 2-15, hoặc 2-10 nucleotit cải biến.

Khi tác nhân ARNi được thể hiện là công thức (IIIc), mỗi N_b , N_b' độc lập thể hiện trình tự oligonucleotit bao gồm 0-10, 0-7, 0-10, 0-7, 0-5, 0-4, 0-2 hoặc 0 nucleotit cải biến. Mỗi N_a độc lập thể hiện trình tự oligonucleotit bao gồm 2-20, 2-15, hoặc 2-10 nucleotit cải biến.

Khi tác nhân ARNi được thể hiện là công thức (IIId), mỗi N_b , N_b' độc lập thể hiện trình tự oligonucleotit bao gồm 0-10, 0-7, 0-10, 0-7, 0-5, 0-4, 0-2 hoặc 0 nucleotit cải biến. Mỗi N_a , N_a' độc lập thể hiện trình tự oligonucleotit chứa 2-20, 2-15, hoặc 2-10 nucleotit được cải biến. Mỗi N_a , N_a' , N_b và N_b' độc lập có chứa sự cải biến của mô hình luân phiên.

Mỗi trong số X, Y và Z trong công thức (III), (IIIa), (IIIb), (IIIc), và (IIId) có thể giống hoặc khác nhau.

Khi tác nhân ARNi được thể hiện bởi công thức (III), (IIIa), (IIIb), (IIIc), và (IIId), ít nhất một trong số nucleotit Y có thể tạo thành cặp bazơ với một trong số nucleotit Y'. Tùy ý, ít nhất hai trong số nucleotit Y tạo thành cặp bazơ với nucleotit Y' tương ứng; hoặc cả ba nucleotit Y đều tạo thành cặp bazơ với nucleotit Y' tương ứng.

Khi tác nhân ARNi được thể hiện bởi công thức (IIIb) hoặc (IIId), ít nhất một trong số nucleotit Z có thể tạo thành cặp bazơ với một trong số nucleotit Z'. Tùy ý, ít nhất hai trong số nucleotit Z tạo thành cặp bazơ với tương ứng nucleotit Z'; hoặc cả ba nucleotit Z đều tạo thành cặp bazơ với tương ứng nucleotit Z'.

Khi tác nhân ARNi được thể hiện là công thức (IIIc) hoặc (IIId), ít nhất một của nucleotit X có thể tạo thành cặp bazơ với một trong số nucleotit X'. Tùy ý, ít nhất hai trong số nucleotit X tạo thành cặp bazơ với tương ứng nucleotit X'; hoặc cả ba nucleotit X đều tạo thành cặp bazơ với tương ứng nucleotit X'.

Theo một phương án, cải biến trên nucleotit Y khác với cải biến trên Y' nucleotit, cải biến trên nucleotit Z khác với cải biến trên Z', và/hoặc cải biến trên nucleotit X khác với cải biến trên X' nucleotit.

- 36 -

Theo một phương án, khi tác nhân ARNi được thể hiện bởi công thức (IIIId), các cải biến N_a là các cải biến ở 2'-O-metyl hoặc 2'-flo. Theo phương án khác, khi tác nhân ARNi được thể hiện bởi công thức (IIIId), các cải biến N_a là các cải biến ở 2'-O-metyl hoặc 2'-flo và $n_p' > 0$ và ít nhất một n_p' liên kết với nucleotit bên cạnh thông qua kết nối phosphorothioat. Theo phương án khác nữa, nếu tác nhân ARNi được biểu thị bằng công thức (IIIId), các cải biến N_a là các cải biến 2'-O-metyl hoặc 2'-flo, $n_p' > 0$ và ít nhất một n_p' được liên kết với nucleotit bên cạnh thông qua liên kết phosphorothioat, và sợi có nghĩa được liên hợp với một hoặc nhiều dẫn xuất GalNAc được gắn thông qua liên kết nhánh hóa trị hai hoặc hóa trị ba. Theo phương án khác, khi tác nhân ARNi được thể hiện bởi công thức (IIIId), các cải biến N_a là các cải biến ở 2'-O-metyl hoặc 2'-flo, $n_p' > 0$ và ít nhất một n_p' liên kết với nucleotit bên cạnh thông qua kết nối phosphorothioat, sợi có nghĩa bao gồm ít nhất một kết nối phosphorothioat, và sợi có nghĩa liên hợp với một hoặc nhiều dẫn xuất GalNAc được gắn qua liên kết nhánh hóa trị hai hoặc hóa trị ba.

Theo một phương án, khi tác nhân ARNi được thể hiện bởi công thức (IIIa), các cải biến N_a là các cải biến ở 2'-O-metyl hoặc 2'-flo, $n_p' > 0$ và ít nhất một n_p' liên kết với nucleotit bên cạnh thông qua kết nối phosphorothioat, sợi có nghĩa bao gồm ít nhất một kết nối phosphorothioat, và sợi có nghĩa liên hợp với một hoặc nhiều dẫn xuất GalNAc được gắn qua liên kết nhánh hóa trị hai hoặc hóa trị ba.

Theo một phương án, tác nhân ARNi là cấu trúc đa chứa ít nhất hai các cấu trúc kép được thể hiện bởi công thức (III), (IIIa), (IIIb), (IIIc), và (IIId), trong đó các cấu trúc kép được nối bởi một liên kết. Liên kết có thể là phân cắt được hoặc không phân cắt được. Tùy ý, cấu trúc đa còn bao gồm phối tử. Mỗi trong số các cấu trúc kép có thể nhắm đến gen giống nhau hoặc hai gen khác nhau; hoặc mỗi trong số các cấu trúc kép có thể nhắm đến gen giống nhau ở hai vị trí đích khác nhau.

Theo một phương án, tác nhân ARNi là cấu trúc đa chứa ba, bốn, năm, sáu hoặc nhiều cấu trúc kép được thể hiện bởi công thức (III), (IIIa), (IIIb), (IIIc), và (IIId), trong đó các cấu trúc kép được nối bởi một liên kết. Liên kết có thể là phân cắt được hoặc không phân cắt được. Tùy ý, cấu trúc đa còn bao gồm phối tử. Mỗi trong số các cấu trúc kép có thể nhắm đến gen giống nhau hoặc hai gen khác nhau; hoặc mỗi trong số các cấu trúc kép có thể nhắm đến gen giống nhau ở hai vị trí đích khác nhau.

- 37 -

Theo một phương án, hai tác nhân ARNi được thể hiện bởi công thức (III), (IIIa), (IIIb), (IIIc), và (IIId) được liên kết với nhau ở đầu 5', và một hoặc cả hai đầu 3' và được liên hợp một cách tùy ý với phối tử. Mỗi trong số các tác nhân có thể nhắm đến gen giống nhau hoặc hai gen khác nhau; hoặc mỗi trong số các tác nhân có thể nhắm đến gen giống nhau ở hai vị trí đích khác nhau.

Các công bố khác nhau mô tả tác nhân ARNi đa có thể được sử dụng trong phương pháp theo sáng chế. Các công bố này bao gồm WO2007/091269, Sáng chế Mỹ số 7858769, WO2010/141511, WO2007/117686, WO2009/014887 và WO2011/031520 toàn bộ nội dung của mỗi tài liệu này được kết hợp ở đây để tham khảo.

Tác nhân ARNi mà chứa các liên hợp của một hoặc nhiều gốc carbohydrat với tác nhân ARNi có thể tối ưu một hoặc nhiều đặc tính của tác nhân ARNi. Trong nhiều trường hợp, gốc carbohydrat sẽ được gắn ở nhóm phụ được cải biến của tác nhân ARNi. Ví dụ, đường riboza của một hoặc nhiều nhóm phụ ribonucleotit của tác nhân dsARN có thể được thay thế bằng nhóm khác, *ví dụ*, chất mang không-carbohydrat (tốt hơn là mạch vòng) mà gắn ở phối tử carbohydrat. Nhóm phụ ribonucleotit trong đó đường riboza của nhóm phụ thay thế được đề cập đến ở đây là nhóm phụ biến thay thế riboza (RRMS). Chất mang mạch vòng có thể là hệ vòng carboxyclic, *cụ thể là*, tất cả các nguyên tử trên vòng là nguyên tử cacbon, hoặc hệ vòng heteroxyclic, *cụ thể là*, một hoặc nhiều nguyên tử trên vòng có thể là dị nguyên tử, *ví dụ*, nitơ, oxy, lưu huỳnh. Chất mang mạch vòng có thể là hệ đơn vòng, hoặc có thể chứa hai hoặc nhiều vòng, *ví dụ* vòng nóng chảy. Chất mang mạch vòng có thể là hệ vòng bão hòa hoàn toàn, hoặc nó có thể chứa một hoặc nhiều liên kết đôi.

Phối tử có thể là gắn với polynucleotit qua chất mang. Chất mang bao gồm (i) ít nhất một "điểm gắn mạch chính," tốt hơn là hai "điểm gắn mạch chính" và (ii) ít nhất một "Điểm gắn thắt." A "điểm gắn mạch chính" như được sử dụng ở đây đề cập đến nhóm chức, *ví dụ* nhóm hydroxyl, hoặc thông thường, liên kết để, và thích hợp để đưa chất mang vào mạch chính, *ví dụ*, phosphat, hoặc phosphat được cải biến, *ví dụ*, lưu huỳnh chứa, mạch chính, của riboaxit nucleic. "Điểm gắn thắt" (TAP) theo một số phương án đề cập đến nguyên tử vòng cấu thành của chất mang mạch vòng, *ví dụ*, nguyên tử cacbon hoặc dị nguyên tử (phân biệt với nguyên tử mà tạo ra điểm gắn mạch chính), mà nối với gốc được chọn. Gốc có thể là, *ví dụ*, carbohydrat, *ví dụ* monosacarit, disacarit, trisacarit, tetrasacarit, oligosacarit và

- 38 -

polysacarit. Tùy ý, gốc được chọn được nối bởi mỗi thất xen kẽ vào chất mang mạch vòng. Do đó, chất mang mạch vòng sẽ thường bao gồm nhóm chức, ví dụ, nhóm amino, hoặc thông thường, tạo ra liên kết, thích hợp để hợp nhất hoặc thất thể hóa học khác, ví dụ, phối tử vào vòng cấu tạo.

Tác nhân ARNi có thể được liên hợp với phối tử *thông qua* chất mang, trong đó chất mang có thể là nhóm mạch vòng hoặc nhóm mạch không vòng; tốt hơn là, nhóm mạch vòng được chọn từ pyrrolidinyl, pyrazolinyl, pyrazolidinyl, imidazolinyl, imidazolidinyl, piperidinyl, piperazinyl, [1,3]dioxolan, oxazolidinyl, isoxazolidinyl, morpholinyl, thiazolidinyl, isothiazolidinyl, quinoxalinyl, pyridazinonyl, tetrahydrofuryl và decalin; tốt hơn là, nhóm mạch không vòng được chọn từ khung serinol hoặc khung dietanolamin.

Theo các phương án cụ thể nhất định, tác nhân ARNi để sử dụng trong phương pháp theo sáng chế là tác nhân được chọn từ nhóm gồm các tác nhân được liệt kê trong bảng bất kỳ trong số các Bảng 1 và 2. Theo một phương án, nếu tác nhân là tác nhân được liệt kê trong Bảng 1, tác nhân có thể thiếu dT ở đầu tận cùng.

Sáng chế còn bao gồm tác nhân ARNi mạch kép chứa trình tự bất kỳ trong số các trình tự được liệt kê trong bảng bất kỳ trong số các Bảng 1 hoặc 2 mà có chứa 5' phosphat hoặc giả phosphat trên sợi đối nghĩa (xem, ví dụ, Công bố PCT số WO 2011005860). Ngoài ra, sáng chế bao gồm tác nhân ARNi mạch kép chứa trình tự bất kỳ trong số các trình tự được liệt kê trong bảng bất kỳ trong số các Bảng 1 hoặc 2 mà bao gồm nhóm 2'floro thay cho nhóm 2'-OMe ở đầu 5' của sợi có nghĩa.

Môtip bổ sung

Theo các khía cạnh nhất định, tác nhân ARNi mạch kép được mô tả trong bản mô tả này có chứa sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa trong đó sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa này có chứa ít hơn mười một, mười, chín, tám, bảy, sáu, hoặc năm 2'-deoxyfloro.

Theo các khía cạnh nhất định, tác nhân ARNi mạch kép được mô tả trong bản mô tả này có chứa sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa, trong đó sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa này có chứa ít hơn mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn cầu nối giữa các nucleotit phosphorothioat.

- 39 -

Theo các khía cạnh nhất định, tác nhân ARNi mạch kép được mô tả trong bản mô tả này có chứa sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa, trong đó sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa này có chứa ít hơn mười 2'-đeoxyfloro và ít hơn sáu cầu nối giữa các nucleotit phosphorothioat.

Theo các khía cạnh nhất định, tác nhân ARNi mạch kép được mô tả trong bản mô tả này có chứa sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa, trong đó sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa này có chứa ít hơn tám 2'-đeoxyfloro và ít hơn sáu cầu nối giữa các nucleotit phosphorothioat.

Theo các khía cạnh nhất định, tác nhân ARNi mạch kép được mô tả trong bản mô tả này có chứa sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa, trong đó sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa này có chứa ít hơn chín 2'-đeoxyfloro và ít hơn sáu cầu nối giữa các nucleotit phosphorothioat.

Phối tử

Tác nhân ARNi mạch kép theo sáng chế có thể tùy ý được liên hợp với một hoặc nhiều phối tử. Phối tử này có thể được gắn với sợi có nghĩa, sợi đối nghĩa hoặc cả hai sợi, ở đầu 3', đầu 5' hoặc cả hai đầu. Trong trường hợp này, phối tử có thể được liên hợp vào sợi có nghĩa. Theo một số phương án, phối tử được liên hợp với đầu 3' của sợi có nghĩa. Theo một phương án, phối tử là phối tử GalNAc. Cụ thể là theo một số phương án, phối tử là GalNAc₃. Phối tử được ghép đôi, tốt hơn là theo cách cộng hóa trị, trực tiếp hoặc gián tiếp *thông qua* dây xen giữa.

Theo một số phương án, phối tử làm thay đổi sự phân bố, sự hướng đích hoặc tuổi thọ của phân tử mà nó được kết hợp vào. Theo một số phương án phối tử tạo ra ái lực được tăng cường đối với đích được chọn, *ví dụ*, phân tử, tế bào hoặc loại tế bào, khoang, thụ thể *ví dụ*, khoang tế bào hoặc cơ quan, mô, cơ quan hoặc vùng của cơ thể, khi, *ví dụ*, so với các loại không có phối tử này. Phối tử tạo ra ái lực tăng cường đối với đích chọn lọc còn được gọi là phối tử hướng đích.

Một số phối tử có thể có các đặc tính nội thẩm thấu. Các phối tử nội thẩm thấu thúc đẩy quá trình làm tan thể nhân và/hoặc vận chuyển chế phẩm theo sáng chế, hoặc các thành phần của nó từ thể nhân đến tế bào chất của tế bào. Phối tử nội thẩm thấu có thể là peptit polyanion hoặc giả peptit thể hiện hoạt tính màng phụ thuộc pH và tính gây dung hợp. Theo một phương án, phối tử nội thẩm thấu giả định cấu hình hoạt động của nó ở pH của thể nhân. Cấu hình "hoạt động" là cấu hình mà đó phối tử nội thẩm thấu thúc đẩy quá trình phân

- 40 -

giải hạt cơ quan nội bào và/hoặc vận chuyển chế phẩm theo sáng chế, hoặc thành phần của nó, từ hạt nội bào đến tế bào chất của tế bào. Phôi tử nội thẩm thấu ví dụ bao gồm peptit GALA (Subbarao và cộng sự., *Biochemistry*, 1987, 26: 2964-2972), peptit EALA (Vogel và cộng sự., *J. Am. Chem. Soc.*, 1996, 118: 1581-1586), và dẫn xuất của chúng (Turk và cộng sự., *Biochem. Biophys. Acta*, 2002, 1559: 56-68). Theo một phương án, thành phần nội thẩm thấu có thể chứa nhóm hóa học (ví dụ, axit amin) sẽ trải qua sự thay đổi về điện tích hoặc phản ứng proton hóa để phản ứng lại với sự thay đổi pH. Thành phần nội thẩm thấu có thể là mạch thẳng hoặc mạch nhánh.

Các phôi tử có thể cải thiện sự vận chuyển, lai, và các đặc tính đặc biệt và cũng có thể cải thiện tính kháng nucleaza của oligoribonucleotit tự nhiên hoặc được cải biến thu được, hoặc phân tử polyme chứa tổ hợp bất kỳ của các monome được mô tả ở đây và/hoặc ribonucleotit tự nhiên hoặc được cải biến.

Nhìn chung, các phôi tử có thể bao gồm các chất cải biến điều trị bệnh, ví dụ, để tăng cường hấp thu; các hợp chất chẩn đoán hoặc các nhóm báo cáo ví dụ, để kiểm soát sự phân bố; tác nhân liên kết ngang; và các gốc gây ra tính kháng nucleaza. Các ví dụ chung bao gồm lipid, steroid, vitamin, đường, protein, peptit, polyamin, và các chất giả peptit.

Phôi tử có thể bao gồm chất có trong tự nhiên, như protein (ví dụ, albumin huyết thanh người (HSA), lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL), lipoprotein tỷ trọng cao (HDL), hoặc globulin); carbohydrat (ví dụ, dextran, pululan, chitin, chitosan, inulin, cyclodextrin hoặc axit hyaluronic); hoặc lipid. Phôi tử có thể còn là phân tử tái tổ hợp hoặc tổng hợp, như polyme tổng hợp, ví dụ, axit polyamino tổng hợp, oligonucleotit (ví dụ, aptame). Các ví dụ về các axit polyamino bao gồm axit polyamino là polylysine (PLL), axit poly L-aspartic, axit poly L-glutamic, copolyme của axit styren-maleic anhydrit, copolyme của poly(L-lactit-co-glycolit), copolyme của divinyl ete-maleic anhydrit, copolyme của N-(2-hydroxypropyl) methacrylamit (HMPA), polyetylen glycol (PEG), rượu polyvinyl (PVA), polyuretan, poly(axit 2-ethylacrylic), N-isopropylacrylamit polyme, hoặc polyphosphazin. Ví dụ về polyamin bao gồm: polyetylenimin, polylysine (PLL), xpecmin, xpecmidin, polyamin, giả peptit-polyamin, polyamin bắt chước peptit, polyamin dendrime, arginin, amidin, protamin, cation lipid, cation porphyrin, muối bậc bốn của polyamin, hoặc peptit xoắn alpha.

- 41 -

Phối tử còn có thể bao gồm các nhóm tìm mục tiêu, *ví dụ*, tế bào hoặc mô tác nhân tìm mục tiêu, *ví dụ*, lectin, glycoprotein, lipid hoặc protein, *ví dụ*, kháng thể, mà liên kết với loại tế bào cụ thể như tế bào thận. Nhóm hướng đích có thể là thyrotropin, melanotropin, lectin, glycoprotein, protein A có hoạt tính bề mặt, carbohydrat dịch nhày, lactoza đa trị, galactoza đa trị, N-axetyl-galactosamin, manosa đa trị N-axetyl-gulucosamin, fucoza đa trị, polyaminoaxit glycosylat, galactoza đa trị, transferin, bisphosphonat, polyglutamat, polyaspartat, lipid, cholesterol, steroid, axit mật, folat, vitamin B12, biotin, peptit RGD, chất giả peptit RGD hoặc aptame.

Các ví dụ khác về phối tử bao gồm chất nhuộm, tác nhân xen kẽ (*ví dụ*, acridin), chất liên kết chéo (*ví dụ*, psoralen, mitomycin C), porphyrin (TPPC4, texaphyrin, Sapphyrin), hydrocacbon thơm đa vòng (*ví dụ*, phenazin, dihydrophenazin), endonucleaza nhân tạo hoặc chất càn hóa (*ví dụ*, EDTA), phân tử ưa lipid, *ví dụ*, cholesterol, axit cholic, axit axetic adamantan, 1-pyren axit butyric, dihydrotestosteron, 1,3-Bis-O(hexadexyl)glyxerol, nhóm geranyloxyhexyl, hexadexylglyxerol, borneol, tinh dầu bạc hà, 1,3-propandirol, nhóm heptadexyl, axit palmitic, axit myristic, axit O3-(oleoyl)lithocholic, axit O3-(oleoyl)cholenic, dimetoxytrityl, hoặc phenoxazin) và thể liên hợp peptit (*ví dụ*, peptit antennapedia, peptit Tat), tác nhân alkyl hóa, phosphat, amino, mercapto, PEG (*ví dụ*, PEG-40K), MPEG, [MPEG]₂, polyamino, alkyl, alkyl được thế, chất chỉ thị được đánh dấu phóng xạ, enzym, hapten (*ví dụ*, biotin), chất làm thuận tiện cho sự vận chuyển/hấp thụ (*ví dụ*, aspirin, vitamin E, axit folic), ribonucleaza tổng hợp (*ví dụ*, imidazol, bisimidazol, histamin, cụm imidazol, thể liên hợp acridin-imidazol, phức hợp Eu³⁺ của vòng lớn tetraaza), dinitrophenyl, HRP, hoặc AP.

Các phối tử có thể là protein, *ví dụ*, glycoprotein, hoặc peptit, *ví dụ*, các phân tử có ái lực đặc hiệu với đồng phối tử, hoặc các kháng thể *ví dụ*, kháng thể mà liên kết với loại tế bào cụ thể như tế bào ung thư, tế bào màng trong, hoặc tế bào xương. Phối tử có thể còn bao gồm các hormon và thụ thể của hormon. Chúng có thể còn bao gồm các loại không phải peptit, như lipid, lectin, carbohydrat, vitamin, thừa số hỗ trợ, lactoza đa trị, galactoza đa trị, N-axetyl-galactosamin, N-axetyl-gulucosamin manosa đa trị, fucoza đa trị, hoặc aptame. Phối tử có thể là, *ví dụ*, lipopolysacarit, chất kích hoạt của p38 MAP kinaza, hoặc chất kích hoạt của NF-κB.

- 42 -

Phối tử có thể là một chất, *ví dụ*, thuốc, mà có thể làm gia tăng sự hấp thu của tác nhân ARNi vào trong tế bào, *ví dụ*, bằng cách phá vỡ bộ khung tế bào của tế bào, *ví dụ*, bằng cách phá vỡ các vi cấu trúc hình ống của tế bào, các vi sợi, và/hoặc các sợi trung. Thuốc có thể là, *ví dụ*, taxon, vincristin, vinblastin, xytochalsin, nocodazol, japlakinolit, latrunculin A, phalloidin, swinholit A, indanoxin, hoặc myoservin.

Phối tử có thể làm tăng sự hấp thu oligonucleotit trong tế bào bằng cách, *ví dụ*, hoạt hóa phản ứng viêm. *Ví dụ* về các phối tử có các tác dụng này bao gồm yếu tố hoại tử mô alpha (TNFalpha), interleukin-1 beta, hoặc gamma interferon.

Theo một khía cạnh, phối tử là lipit hoặc phân tử trên cơ sở lipit. Lipit hoặc phân tử trên cơ sở lipit như vậy tốt hơn là gắn huyết thanh protein, *ví dụ*, albumin huyết thanh của người (HSA). Phối tử liên kết HSA cho phép phân phối chất liên hợp đến mô mục tiêu, *ví dụ*, mô đích không phải là thận của cơ thể. *Ví dụ*, mô mục tiêu có thể là gan, bao gồm tế bào nhu mô của gan. Các phân tử khác mà có thể liên kết HSA còn có thể được sử dụng như các phối tử. *Ví dụ*, naproxen hoặc aspirin có thể được sử dụng. Phối tử lipit hoặc cơ sở lipit có thể (a) gia tăng sự kháng việc suy thoái của liên hợp, (b) gia tăng việc nhắm hoặc vận chuyển vào trong tế bào đích hoặc màng tế bào, và/hoặc (c) có thể được sử dụng để điều chỉnh liên kết với huyết thanh protein, *ví dụ*, HSA.

Phối tử trên cơ sở lipit có thể được sử dụng để điều biến, *ví dụ*, kiểm soát liên kết của phức với mô đích. *Ví dụ*, lipit hoặc phối tử cơ sở lipit mà liên kết với HSA mạnh mẽ hơn sẽ ít có khả năng bị nhắm đến thận và do đó ít có khả năng bị xóa khỏi cơ thể. Lipit hoặc phối tử cơ sở lipit mà liên kết với HSA yếu hơn có thể được sử dụng nhắm đến liên hợp thận.

Theo một phương án, phối tử gốc lipit liên kết HSA. Tốt hơn là, nó liên kết với HSA với ái lực đủ mà liên hợp sẽ được phân phối tốt hơn là đến một mô không phải thận. Theo một phương án, ái lực phù hợp để cho sự liên kết phối tử HSA có thể được đảo ngược. Theo phương án khác, phối tử gốc lipit liên kết HSA yếu hoặc không liên kết, sao cho thể liên hợp tốt hơn là sẽ được phân phối cho thận. Các gốc khác mà nhắm đến tế bào thận còn có thể được sử dụng ở vị trí hoặc ngoài ra với phối tử cơ sở lipit.

Theo khía cạnh khác, phối tử là gốc, *ví dụ*, vitamin, mà được hấp thụ bởi tế bào đích, *ví dụ*, tế bào phát triển hạt nhân. Các phối tử này đặc biệt hữu dụng để điều trị các rối loạn

- 43 -

được đặc trưng bởi quá trình tăng sinh tế bào không mong muốn, *ví dụ*, loại ác tính hoặc không ác tính, *ví dụ*, tế bào ung thư. Ví dụ về vitamin bao gồm vitamin A, E, và K. Ví dụ khác về vitamin bao gồm vitamin B, *ví dụ*, axit folic, B12, riboflavin, biotin, pyridoxal hoặc vitamin khác hoặc các chất dinh dưỡng được tế bào ung thư hấp thụ. Các chất này còn bao gồm HAS, lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL) và lipoprotein tỷ trọng cao (HDL).

Theo khía cạnh khác, phối tử là tác nhân thẩm thấu tế bào, tốt hơn là tác nhân thẩm thấu tế bào xoắn. Tốt hơn là, tác nhân là lưỡng tính. Tác nhân mẫu mực là peptit như tat hoặc antennopeđia. Nếu tác nhân là peptit, nó có thể được cải biến, bao gồm peptidylmimetic, invertome, kết nối không-peptit hoặc giả-peptit, và việc sử dụng của D-axit amin. Tác nhân xoắn ốc thì tốt hơn là tác nhân xoắn ốc alpha, mà tốt hơn là có pha ưa lipid và kỵ lipid.

Phối tử có thể là peptit hoặc chất bắt chước peptit. Chất bắt chước peptit (cũng được đề cập đến ở đây như chất bắt chước oligopeptit) là phân tử có khả năng gấp thành cấu trúc ba chiều tương tự như peptit tự nhiên. Peptit hoặc chất bắt chước peptit gốc có thể là dài khoảng 5-50 axit amin, *ví dụ*, dài khoảng 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, hoặc 50 axit amin. Peptit hoặc giả peptit có thể là, *ví dụ*, peptit thấm qua tế bào, peptit tích điện dương, peptit lưỡng cực, hoặc peptit kỵ nước (*ví dụ*, chủ yếu chứa Tyr, Trp hoặc Phe). Gốc peptit có thể là peptit dendrime, peptit giới hạn hoặc peptit liên kết chéo. Theo cách khác, gốc peptit có thể bao gồm trình tự chuyển vị màng (MTS) kỵ nước. Peptit chứa MTS kỵ nước *ví dụ* là RFGF có trình tự axit amin AAVALLPAVLLALLAP (SEQ ID NO: 9). Chất tương tự RFGF (*ví dụ*, trình tự axit amin AALLPVLLAAP (SEQ ID NO: 10)) chứa MTS kỵ nước cũng có thể là gốc hướng đích. Gốc peptit có thể là peptit "vận chuyển", mà có thể mang các phân tử có cực lớn bao gồm peptit, oligonucleotit, và protein qua tế bào các màng tế bào. Ví dụ, các trình tự từ protein Tat của HIV (GRKKRRQRRRPPQ) (SEQ ID NO: 11) và protein Antennapedia của *Drosophila* (RQIKIWFQNRRMKWKK) (SEQ ID NO: 12) được thấy rằng có khả năng hoạt tính như peptit vận chuyển. Peptit hoặc chất bắt chước peptit có thể được mã hóa bởi trình tự ngẫu nhiên của ADN, chẳng hạn như peptit được nhận dạng từ thư viện biểu hiện pha gơ, hoặc thư viện tổ hợp một-hạt-một-hợp chất (OBOC) (Lam và cộng sự., *Nature*, 354:82-84, 1991). Tốt hơn là peptit hoặc chất bắt chước peptit được nối với tác nhân iARN qua đơn vị monome đưa vào là peptit hướng đích tế bào như peptit axit arginin-

- 44 -

glyxin-aspartic (RGD)-peptit, hoặc chất bắt chước RGD. Gốc peptit có thể có chiều dài khoảng từ 5 axit amin đến 40 axit amin. Các gốc peptit có thể có cấu trúc cải biến, như làm tăng tính ổn định hoặc đặc tính hình thái trực tiếp. Bất kỳ cấu trúc các cải biến được mô tả dưới đây có thể được sử dụng. Gốc peptit RGD có thể được dùng để hướng đích tế bào khối u, chẳng hạn như tế bào khối u nội mạc hoặc tế bào khối u ung thư vú (Zitzmann và cộng sự., *Cancer Res.*, 62:5139-43, 2002). Peptit RGD có thể làm thuận tiện cho việc hướng đích của tác nhân iARN vào khối u của nhiều loại mô khác, bao gồm phổi, thận, lách, hoặc gan (Aoki và cộng sự., *Cancer Gene Therapy* 8:783-787, 2001). Tốt hơn là, peptit RGD sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hướng đích của tác nhân iARN đến thận. Peptit RGD có thể mạch thẳng hoặc mạch vòng, và có thể được cải biến, ví dụ, được glycosyl hóa hoặc metylat hóa để tạo thuận lợi cho sự hướng đích đến các mô cụ thể. Ví dụ, peptit RGD được glycosyl hóa có thể phân phối tác nhân iARN đến tế bào khối u biểu hiện $\alpha_v\beta_3$ (Haubner và cộng sự., *Jour. Nucl. Med.*, 42:326-336, 2001). Peptit mà các dấu chuẩn đích được làm giàu trong tế bào đang tăng sinh có thể được sử dụng. Ví dụ, RGD chứa peptit và giả peptit có thể hướng đích đến tế bào ung thư, cụ thể là tế bào biểu hiện integrin. Do đó, chuyên gia trong lĩnh vực có thể sử dụng peptit RGD, peptit vòng chứa RGD, peptit RGD mà bao gồm D-axit amin, cũng như giả RGD tổng hợp. Ngoài RGD, chuyên gia trong lĩnh vực có thể sử dụng các gốc khác hướng đích đến phối tử của integrin. Nhìn chung, phối tử này có thể được dùng để kiểm soát tế bào tăng sinh và sự hình thành mạch. Một số thể liên hợp thuộc loại này của phối tử hướng đích PECAM-1, VEGF, hoặc gen ung thư khác, ví dụ, gen ung thư khác được mô tả trong bản mô tả này.

"Peptit thẩm thấu tế bào" có thể thẩm thấu qua tế bào, ví dụ, tế bào vi sinh vật, như vi khuẩn hoặc tế bào nấm, hoặc tế bào động vật có vú, như tế bào của người. Peptit thẩm thấu tế bào vi khuẩn có thể là, ví dụ, peptit mạch thẳng xoắn α (ví dụ, LL-37 hoặc Ceropin P1), peptit chứa liên kết disulfua (ví dụ, α -defensin, β -defensin hoặc bactenexin), hoặc peptit chỉ chứa một hoặc hai axit amin trội (ví dụ, PR-39 hoặc indolixidin). Peptit thẩm thấu tế bào còn có thể bao gồm tín hiệu định vị nhân (NLS). Ví dụ, peptit thẩm thấu tế bào có thể là peptit lưỡng tính hai nhánh, chẳng hạn như MPG, mà có nguồn gốc từ miền peptit dung hợp của gp41 HIV-1 và NLS của kháng nguyên T lớn SV40 (Simeoni và cộng sự., *Nucl. Acids Res.* 31:2717-2724, 2003).

- 45 -

Theo một phương án, peptit hướng đích có thể là peptit lưỡng cực xoắn ốc α . Ví dụ về peptit lưỡng cực xoắn ốc α bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, xecropin, lycotoxin, parađaxin, buforin, CPF, peptit tương tự bombinin (BLP), cathelixerin, xeratoxin, peptit S. clava, peptit kháng vi khuẩn ở ruột cá mút đá myxin (HFIAPs), magainin, brevinin-2, dermaseptin, melittin, pleuroxin, peptit H₂A, peptit Xenopus, esculentin-1, và caerin. Tốt hơn, một số yếu tố sẽ được xem xét để duy trì tính toàn vẹn của độ ổn định chuỗi xoắn. Ví dụ, số lượng tối đa gốc làm ổn định chuỗi xoắn sẽ được sử dụng (*ví dụ*, leu, ala, hoặc lys), và số lượng tối thiểu gốc khử ổn định chuỗi xoắn được sử dụng (*ví dụ*, prolin, hoặc đơn phân monome mạch vòng). Gốc gắn mũ sẽ được xem xét (*ví dụ* Gly là *ví dụ* về gốc gắn mũ N và/hoặc amit hòa đầu tận cùng C có thể được sử dụng để tạo ra liên kết H biên ngoài để làm ổn định chuỗi xoắn. Sự tạo thành cầu nối muối giữa gốc có điện tích trái dấu, được phân tách bởi các vị trí $i \pm 3$, hoặc $i \pm 4$ có thể tạo ra tính ổn định. Ví dụ, gốc tích điện dương như lysin, arginin, homo-arginin, ornithin hoặc histidin có thể tạo cầu nối muối với gốc anion glutamat hoặc aspartat.

Phối tử peptit và giả peptit bao gồm các peptit có trong tự nhiên hoặc peptit được cải biến, *ví dụ*, peptit D hoặc L; peptit α , β , hoặc γ ; peptit N-metyl; azapeptit; peptit có một hoặc nhiều amit, *tức là*, peptit, các liên kết được thay thế bằng một hoặc nhiều liên kết urê, thiourê, carbamat, hoặc sulfonyl urê; hoặc peptit mạch vòng.

Phối tử hướng đích có thể là phối tử bất kỳ mà có khả năng hướng đích đến thụ thể cụ thể. Các ví dụ là: folat, GalNAc, galactosa, manosa, manosa-6P, cụm đường chẳng hạn như cụm GalNAc, cụm manosa, cụm galactosa, hoặc aptame. Nhóm là tổ hợp gồm hai hoặc nhiều tiểu phần đường. Các phối tử hướng đích cũng bao gồm các phối tử thụ thể integrin, các phối tử thụ thể chemokin, transferin, biotin, các phối tử thụ thể serotonin, PSMA, endothelin, GCPII, somatostatin, các phối tử LDL và HDL. Phối tử cũng có thể được trên axit nucleic, *ví dụ*, aptame. Aptame có thể không được cải biến hoặc có tổ hợp bất kỳ của các cải biến được bộc lộ ở đây.

Các tác nhân giải phóng thể hạt bao gồm imidazol, poly hoặc oligoimidazol, PEI, peptit, peptit tạo dung hợp, polycarboxylat, polyatich điện dương, oligo che giấu hoặc poly tích điện dương hoặc anion, axetal, polyaxetal, ketal/polyketyal, orthoester, polyme có thay

- 46 -

đổi tích điện dương hoặc anion được che giấu hoặc không được che giấu, dendrime có thay đổi tích điện dương hoặc anion được che giấu hoặc không được che giấu.

Các chất điều biến PK là tên viết tắt của chất điều biến được động học. Các chất điều biến PK bao gồm chất ưa lipid, axit mật, steroid, chất tương tự phospholipid, peptit, chất liên kết protein, PEG, vitamin v.v. Các chất điều biến PK ví dụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, cholesterol, axit béo, axit cholic, axit lithocholic, dialkylglyxerit, diaxylglyxerit, phospholipid, sphingolipid, naproxen, ibuprofen, vitamin E, biotin v.v. Oligonucleotit mà có chứa một số lượng các liên kết phosphorothioat còn được biết là liên kết với protein huyết thanh, do đó oligonucleotit ngắn, *ví dụ*, oligonucleotit có khoảng 5 bazơ, 10 bazơ, 15 bazơ hoặc 20 bazơ, chứa nhiều liên kết phosphorothioat trong khung cũng có thể tuân theo sáng chế làm phối tử (*ví dụ*, làm phối tử điều biến PK).

Ngoài ra, aptame mà liên kết với các thành phần trong huyết thanh (*ví dụ*, protein trong huyết thanh) cũng có thể làm phối tử điều biến PK theo sáng chế.

Các liên hợp phối tử khác theo sáng chế được mô tả các đơn sáng chế Mỹ USSN: 10/916,185, nộp ngày 10 tháng 8 năm 2004; USSN: 10/946,873, nộp ngày 21 tháng 9 năm 2004; USSN: 10/833,934, nộp ngày 3 tháng 8 năm 2007; USSN: 11/115,989 nộp ngày 27 tháng 4 năm 2005 và USSN: 11/944,227 nộp ngày 21 tháng 11 năm 2007, được kết hợp ở đây chỉ nhằm mục đích tham khảo.

Khi có một hai hoặc nhiều phối tử, các phối tử này có thể có tất cả các đặc tính giống nhau, tất cả các đặc tính khác nhau hoặc một số phối tử có các đặc tính giống nhau trong khi một số khác lại có đặc tính khác nhau. Ví dụ, phối tử có thể có các đặc tính hướng đích, có hoạt tính nội thẩm thấu hoặc có đặc tính điều biến PK. Theo một phương án, tất cả các phối tử có các tính chất khác nhau.

Các phối tử có thể được nối với oligonucleotit ở các vị trí khác nhau, ví dụ, đầu 3', đầu 5', và/hoặc ở vị trí giữa. Theo một số phương án, phối tử được gắn vào oligonucleotit *thông qua* dây xen giữa, *ví dụ*, chất mang được mô tả trong bản mô tả này. Phối tử hoặc phối tử được nối có thể có mặt trên monome nếu monome này được kết hợp vào sợi đang được tổng hợp. Theo một số phương án, phối tử có thể được kết hợp nhờ nối với "tiền tố" monome sau khi "tiền tố" monome này đã được đưa vào sợi đang phát triển. Ví dụ, monome có, *ví dụ*, dây được kết thúc bởi amin (*tức là*, không có phối tử kết hợp), *ví dụ*, TAP-

- 47 -

$(CH_2)_nNH_2$ có thể được kết hợp vào sợi oligonucleotit phát triển. Trong công đoạn tiếp theo, *tức là*, sau khi kết hợp tiền tố monome vào sợi, phối tử có nhóm ái điện tử, *ví dụ*, nhóm pentaflorophenyl este hoặc aldehyt, sau đó có thể gắn vào tiền tố monome bằng cách nối nhóm ái điện tử này của phối tử với nhóm ái nhân ở đầu tận cùng của mỗi nối của tiền tố monome.

Trong một ví dụ khác, monome có nhóm hóa học thích hợp để tham gia phản ứng hóa học Click có thể được kết hợp, *ví dụ*, đoạn nối/liên kết tận cùng là azit hoặc alkyne. Trong hoạt động tiếp theo, *tức là*, sau khi kết hợp monome tiền chất vào sợi, phối tử có nhóm hóa học bổ sung, *ví dụ* alkyne hoặc azit có thể được gắn vào monome tiền chất bằng cách cặp đôi alkyne và azit với nhau.

Theo một số phương án, phối tử có thể được liên hợp với nucleobazơ, gốc đường, hoặc liên kết internucleosidic của các phân tử axit nucleic. Sự liên hợp với nucleobazơ purin hoặc dẫn xuất của nó có thể xảy ra ở vị trí bất kỳ bao gồm, các nguyên tử trong vòng hoặc ngoài vòng. Theo một số phương án, các vị trí 2, 6, 7, hoặc 8 của nucleobazơ purin được gắn với gốc liên hợp. Sự liên hợp với nucleobazơ pyrimidin hoặc dẫn xuất của nó cũng có thể xảy ra ở vị trí bất kỳ. Theo một số phương án, các vị trí 2, 5, và 6 của nucleobazơ pyrimidin có thể được thế bằng gốc liên hợp. Sự liên hợp với các gốc đường của nucleosit có thể xảy ra nguyên tử cacbon bất kỳ. Ví dụ về nguyên tử cacbon của gốc đường có thể được gắn vào gốc liên hợp bao gồm nguyên tử cacbon ở vị trí 2', 3', và 5'. Vị trí 1' cũng có thể được gắn với gốc liên hợp, như trong gốc không bazơ. Liên kết giữa các nucleosit cũng có thể mang gốc liên hợp. Đối với liên kết chứa phospho (*ví dụ*, phosphodiester, phosphothioat, phosphorodithiotat, phosphoroamidat, và liên kết tương tự), gốc liên hợp có thể được gắn trực tiếp vào nguyên tử phospho hoặc vào nguyên tử O, N, hoặc S được liên kết với nguyên tử phospho. Đối với liên kết giữa nucleosit chứa amin hoặc amit (*ví dụ*, PNA), gốc liên hợp có thể được gắn vào nguyên tử nitơ của amin hoặc amit hoặc vào nguyên tử cacbon bên cạnh.

Phối tử GalNAc và cầu nối


Theo một số phương án, siARN hướng đích vào gen HAO1 được liên hợp với carbohydrat *ví dụ* monosacarit (chẳng hạn như GalNAc), disacarit, trisacarit, tetrasacarit, polysacarit. Theo một số phương án, siARN được liên hợp với phối tử N-

- 48 -


axetylgalactosamin (GalNAc). Tăng cường sự phân phối hiệu quả đến tế bào gan sau khi dùng dưới da. Phương pháp kết hợp carbohydrat, ví dụ, N-axetylgalactosamin, với, ví dụ, siARN đã được biết rõ đối với người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực. Các ví dụ có thể được tìm thấy trong US8,106,022 và WO2014/025805.

Theo một số phương án, siARN hướng đích gen HAO1 được liên hợp với phối tử, ví dụ, với GalNAc, thông qua cầu nối. Ví dụ, phối tử có thể là một hoặc nhiều dẫn xuất GalNAc (*N*-axetylglucosamin) được gắn thông qua cầu nối nhánh hóa trị hai hoặc hóa trị ba.


Theo một phương án, dsARN theo sáng chế được liên hợp với cầu nối nhánh hóa trị hai hoặc hóa trị ba bao gồm các cấu trúc được thể hiện trong công thức bất kỳ trong số các công thức (IV) – (VII):



Công thức (IV)




Công thức (V)



Công thức (VI)

hoặc

- 49 -



Công thức (VII)

;


trong đó:

q^{2A} , q^{2B} , q^{3A} , q^{3B} , q^{4A} , q^{4B} , q^{5A} , q^{5B} và q^{5C} độc lập biểu thị cho mỗi lần xuất hiện của 0-20 và trong đó đơn vị lặp có thể giống hoặc khác nhau;

mỗi P^{2A} , P^{2B} , P^{3A} , P^{3B} , P^{4A} , P^{4B} , P^{5A} , P^{5B} , P^{5C} , T^{2A} , T^{2B} , T^{3A} , T^{3B} , T^{4A} , T^{4B} , T^{4A} , T^{5B} , T^{5C} độc lập là đối với mỗi lần lặp lại vắng mặt, CO, NH, O, S, OC(O), NHC(O), CH₂, CH₂NH hoặc CH₂O;

Q^{2A} , Q^{2B} , Q^{3A} , Q^{3B} , Q^{4A} , Q^{4B} , Q^{5A} , Q^{5B} , Q^{5C} độc lập là đối với mỗi sự không có mặt, alkylen, alkylen được thế trong đó một hoặc nhiều metylen có thể bị ngắt quãng hoặc bị kết thúc bởi một hoặc nhiều O, S, S(O), SO₂, N(R^N), C(R')=C(R''), C≡C hoặc C(O);

mỗi R^{2A} , R^{2B} , R^{3A} , R^{3B} , R^{4A} , R^{4B} , R^{5A} , R^{5B} , R^{5C} độc lập là đối với mỗi lần lặp lại vắng mặt, NH, O, S, CH₂, C(O)O, C(O)NH, NHCH(R^a)C(O), -C(O)-CH(R^a)-NH-, CO, CH=N-O,




heteroxyclyl;

L^{2A} , L^{2B} , L^{3A} , L^{3B} , L^{4A} , L^{4B} , L^{5A} , L^{5B} và L^{5C} biểu thị phối tử; tức là mỗi nhóm độc lập cho mỗi lần xuất hiện monosacarit (như GalNAc), đisacarit, trisacarit, tetrasacarit, oligosacarit, hoặc polysacarit; và

R^a là H hoặc chuỗi axit amin bên.

Dẫn xuất GalNAc liên hợp hóa trị ba là đặc biệt hữu dụng để sử dụng với tác nhân ARNi để ức chế sự biểu hiện của gen đích, như các dẫn xuất có công thức (VII):


- 50 -







Công thức (VII)

trong đó L^{5A} , L^{5B} và L^{5C} thể hiện monosacarit, như dẫn xuất GalNAc.




Ví dụ về các nhóm liên kết nhánh hóa trị hai và hóa trị ba phù hợp liên hợp với dẫn xuất GalNAc bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, các hợp chất sau:




- 51 -



- 52 -




, hoặc







- 53 -

Các phối tử khác

Theo một số phương án phối tử được chọn từ một trong số các phối tử sau:



- 54 -



III. Phân phối ARNi theo sáng chế

Sự phân phối tác nhân iARN theo sáng chế cho tế bào ví dụ, tế bào ở đối tượng, chẳng hạn như người (ví dụ, đối tượng cần chúng, chẳng hạn như đối tượng mắc rối loạn có

- 55 -

kết hợp với HAO1) có thể đạt được theo một số cách khác nhau. Ví dụ, việc phân phối có thể được thực hiện bằng cách cho tế bào tiếp xúc với ARNi theo sáng chế hoặc *trong ống nghiệm* hoặc *trong cơ thể*. Việc phân phối *trong cơ thể* có thể cũng được thực hiện một cách trực tiếp bằng cách sử dụng chế phẩm bao gồm ARNi, ví dụ, dsARN, cho đối tượng. Tùy ý, việc phân phối *trong cơ thể* có thể được thực hiện một cách gián tiếp bằng cách sử dụng một hoặc nhiều vật truyền mà mã hóa và định hướng sự biểu hiện của ARNi. Các thay thế này được trình bày dưới đây.

Nhìn chung, phương pháp bất kỳ để phân phối phân tử axit nucleic (*in vitro* hoặc *in vivo*) có thể được làm thích ứng để sử dụng với iARN theo sáng chế (xem ví dụ, Akhtar S. và Julian RL. (1992) *Trends Cell. Biol.* 2(5):139-144 và WO94/02595, được kết hợp ở đây bằng cách viện dẫn toàn bộ). Để phân phối *trong cơ thể*, các yếu tố cần phải xem xét để phân phối một phân tử ARNi bao gồm, ví dụ, tính ổn định sinh học của phân tử được phân phối, sự ngăn chặn của các hiệu ứng không cụ thể, và sự tích tụ của phân tử được phân phối trong mô mục tiêu. Các hiệu ứng không cụ thể của ARNi có thể được tối thiểu hóa bởi việc sử dụng cục bộ, ví dụ, bởi việc tiêm hoặc cấy ghép trực tiếp vào trong mô hoặc sử dụng chế phẩm một cách cục bộ. Việc sử dụng cục bộ lên vị trí điều trị tối đa hóa nồng độ khu vực của tác nhân, hạn chế tiếp xúc của tác nhân đến các mô toàn thân mà có thể bị hại bởi tác nhân hoặc tác nhân có thể làm suy thoái, và cho phép tổng số liều của phân tử ARNi thấp hơn để sử dụng. Một vài nghiên cứu đã thể hiện sự được thể hiện giá thấp thành công sản phẩm gen khi của gen các sản phẩm khi ARNi được sử dụng một cách cục bộ. Ví dụ, việc phân phối trong mắt của VEGF dsARN bằng cách tiêm trong thủy tinh thể ở khỉ cynomolgus (Tolentino, MJ., và cộng sự (2004) *Retina* 24:132-138) và tiêm dưới võng mạc ở chuột (Reich, SJ., và cộng sự (2003) *Mol. Vis.* 9:210-216) đều được thể hiện là làm ngăn ngừa sự tạo mạch mới ở mẫu thí nghiệm bị thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Ngoài ra, sự tiêm trong khối u trực tiếp của dsARN ở chuột làm giảm thể tích khối u (Pille, J., và cộng sự (2005) *Mol. Ther.* 11:267-274) và có thể kéo dài sự sống của con chuột mang khối u (Kim, WJ., và cộng sự (2006) *Mol. Ther.* 14:343-350; Li, S., và cộng sự (2007) *Mol. Ther.* 15:515-523). Sự cản trở ARN cũng được thể hiện là thành công với sự phân phối cục bộ vào CNS bằng cách tiêm trực tiếp (Dorn, G., và cộng sự. (2004) *Nucleic Acids* 32:e49; Tan, PH., và cộng sự (2005) *Gene Ther.* 12:59-66; Makimura, H., và cộng sự (2002) *BMC Neurosci.* 3:18; Shishkina, GT., và cộng sự (2004) *Neuroscience* 129:521-528; Thakker,

- 56 -

ER., và cộng sự (2004) *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 101:17270-17275; Akaneya, Y., và cộng sự (2005) *J. Neurophysiol.* 93:594-602) và vào phổi bằng cách dùng trong mũi (Howard, K.A., và cộng sự (2006) *Mol. Ther.* 14:476-484; Zhang, X., và cộng sự (2004) *J. Biol. Chem.* 279:10677-10684; Bitko, V., và cộng sự (2005) *Nat. Med.* 11:50-55). Để sử dụng ARNi toàn thân để điều trị bệnh, ARN có thể được cải biến hoặc ngoài ra được phân phối sử dụng hệ thống phân phối thuốc; cả hai phương pháp hoạt tính nhằm ngăn chặn sự thoái biến nhanh chóng của dsARN bởi endo- và exo-nucleaza *trong cơ thể*. Cải biến của ARN hoặc chất mang được còn có thể cho phép nhắm đến chế phẩm ARNi mô mục tiêu và tránh các hiệu ứng ngoài mục tiêu không mong muốn. Các phân tử ARNi có thể được cải biến bằng cách liên hợp hóa chất với các nhóm ưa lipid như cholesteol để làm tăng sự hấp thu và ngăn chặn sự thoái biến tế bào. Ví dụ, iARN được định hướng chống lại ApoB được liên hợp với gốc cholesterol ưa lipid được tiêm toàn thân vào con chuột và dẫn đến sự bất hoạt của mARN apoB ở cả gan và hồng tràng (Soutschek, J., và cộng sự (2004) *Nature* 432:173-178). Sự liên hợp của iARN với aptame đã được thể hiện là làm ức chế sự phát triển khối u và làm trung gian cho sự thoái biến khối u ở mẫu chuột bị ung thư tuyến tiền liệt (McNamara, J.O., và cộng sự (2006) *Nat. Biotechnol.* 24:1005-1015). Trong phương án thay thế, ARNi có thể được phân phối sử dụng các hệ thống phân phối thuốc như hệ thống phân phối hạt nano, dendrime, polyme, liposom, hoặc cation. Các hệ thống phân phối cation tích điện dương tạo điều kiện liên kết của một phân tử ARNi (điện tích âm) và cũng tăng sự tương tác tại màng tế bào điện tích âm để cho phép sự hấp thu hiệu quả của ARNi bởi tế bào. Lipid cation, dendrime, hoặc polyme có thể được liên kết với iARN, hoặc làm tạo thành túi hoặc vi hạt (xem ví dụ, Kim S.H., và cộng sự (2008) *Journal of Controlled Release* 129(2):107-116) mà bọc lấy iARN. Việc tạo thành của bọc hoặc mixen còn ngăn chặn sự thoái biến của ARNi khi được sử dụng toàn thân. Phương pháp sản xuất và dùng phức hợp cation- iARN thuộc khả năng của người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực (xem ví dụ, Sorensen, D.R., và cộng sự (2003) *J. Mol. Biol.* 327:761-766; Verma, U.N., và cộng sự (2003) *Clin. Cancer Res.* 9:1291-1300; Arnold, A.S. và cộng sự (2007) *J. Hypertens.* 25:197-205, được kết hợp ở đây bằng cách viện dẫn một cách toàn bộ). Một số ví dụ không làm giới hạn sáng chế về hệ phân phối thuốc hữu dụng để phân phối toàn thân của iARN bao gồm DOTAP (Sorensen, D.R., và cộng sự (2003), *supra*; Verma, U.N., và cộng sự (2003), *supra*), Oligofectamine, "hạt axit nucleic lipid rắn" (Zimmermann, T.S., và cộng sự (2006) *Nature*

- 57 -

441:111-114), cardiolipin (Chien, PY., và cộng sự (2005) *Cancer Gene Ther.* 12:321-328; Pal, A., và cộng sự (2005) *Int J. Oncol.* 26:1087-1091), polyetylenimin (Bonnet ME., và cộng sự (2008) *Pharm. Res.* công bố điện tử ngày 16 tháng 8 trước khi in; Aigner, A. (2006) *J. Biomed. Biotechnol.* 71659), peptit Arg-Gly-Asp (RGD) (Liu, S. (2006) *Mol. Pharm.* 3:472-487), và polyamidoamin (Tomalia, DA., và cộng sự (2007) *Biochem. Soc. Trans.* 35:61-67; Yoo, H., và cộng sự (1999) *Pharm. Res.* 16:1799-1804). Theo một số phương án, ARNi tạo thành cấu trúc kép với xyclodextrin để sử dụng toàn thân. Phương pháp để sử dụng và được phẩm của các ARNi và xyclodextrin có thể tìm thấy trong Sáng chế Mỹ Số. 7,427,605, mà được kết hợp ở đây chỉ để tham khảo.

Vật truyền mã hóa cho iARN theo sáng chế

iARN hướng đích gen HAO1 có thể được biểu hiện từ đơn vị phiên mã được cài xen vào vật truyền ADN hoặc ARN (xem ví dụ, Couture, A, và cộng sự., *TIG.* (1996), 12:5-10; Skillern, A., và cộng sự., Công bố đơn quốc tế PCT số WO 00/22113, Conrad Công bố đơn quốc tế PCT số WO 00/22114, và Conrad, Sáng chế Mỹ số. 6,054,299). Sự biểu hiện có thể là nhanh chóng (trong vòng hàng giờ đến tuần) hoặc kéo dài (hàng tuần đến hàng tháng hoặc lâu hơn), phụ thuộc vào cấu trúc cụ thể được sử dụng và mô hoặc loại tế bào mục tiêu. Các thông tin di truyền có thể được đưa vào như cấu trúc mạch thẳng, plasmit mạch vòng, hoặc vật truyền virus, mà có thể là vật truyền tích hợp hoặc không tích hợp. Gen chuyển có thể còn được tạo cấu trúc để cho phép nó được di truyền dưới dạng plasmit ngoài nhiễm sắc thể (Gassmann, và cộng sự., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* (1995) 92:1292).

Sợi đơn hoặc các sợi của ARNi có thể được sao mã từ chất tăng xúc tác trên vật truyền biểu hiện. Khi hai riêng biệt sợi được thể hiện để tạo ra, ví dụ, dsARN, hai vật truyền biểu hiện riêng biệt có thể cùng được đưa vào (ví dụ, bằng cách biến nạp hoặc chuyển nạp) vào trong tế bào đích. Ngoài ra mỗi sợi đơn của dsARN có thể được sao mã bởi các chất tăng xúc tác cả hai đều nằm trên cùng plasmit biểu hiện. Theo một phương án, dsARN được thể hiện như polynucleotit lặp lại được đảo ngược được nối bởi liên kết trình tự polynucleotit mà dsARN có cấu trúc cạnh và vòng.

Vật truyền biểu hiện ARNi thường là plasmit ADN hoặc vật truyền virus. vật truyền biểu hiện thích hợp với các tế bào nhân chuẩn, tốt hơn là các chất thích hợp với các tế bào thuộc xương sống, có thể được sử dụng để tạo ra các cấu trúc tái tổ hợp cho sự biểu hiện của

- 58 -

ARNi như được mô tả ở đây. Vật truyền biểu hiện tế bào nhân chuẩn được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực và sẵn có từ nhiều nguồn trên thị trường. Thông thường, vật truyền này được cung cấp chứa các vị trí giới hạn thuận tiện để bổ sung phân khúc axit nucleic mong muốn. Việc phân phối vật truyền biểu hiện ARNi có thể là toàn thân, như bởi việc sử dụng qua tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp, bằng việc sử dụng đối với các tế bào mục tiêu từng lấy từ bệnh nhân sau đó lại đưa vào trong bệnh nhân, hoặc bởi bất kỳ phương pháp khác mà cho phép đưa vào trong tế bào đích mong muốn.

Plasmit biểu hiện ARNi có thể đưa tế bào vào trong tế bào đích như cấu trúc kép với chất mang cation lipid (ví dụ, Oligofectamin) hoặc các chất mang không-cation gốc lipid (ví dụ, Transit-TKO™). Việc biến nạp đa lipid cho đột biến do ARNi nhắm đến các vùng khác nhau của ARN đích trong khoảng thời gian một tuần hoặc nhiều hơn cũng thuộc phạm vi sáng chế. Sự đưa thành công vật truyền vào trong tế bào chủ có thể được theo dõi bằng cách sử dụng nhiều phương pháp đã biết. Ví dụ, nhanh chóng được biến nạp có thể là truyền tín hiệu với chất thông báo, như chất đánh dấu huỳnh quang, như Green Fluorescent Protein (GFP). Sự ổn định khi được biến nạp của tế bào *ngoài cơ thể sống* có thể được đảm bảo bằng cách sử dụng chất đánh dấu mà cung cấp tế bào được biến nạp với sự kháng các yếu tố từ môi trường cụ thể (ví dụ, kháng sinh và thuốc), như kháng hygromycin B.

Các hệ thống vật truyền giống virus mà có thể được sử dụng với các phương pháp và chế phẩm được mô tả ở đây bao gồm, nhưng không giới hạn ở, (a) vật truyền adenovirus; (b) vật truyền retrovirus, bao gồm nhưng không giới hạn ở vật truyền lentivirus, virus bệnh bạch cầu ở chuột moloney, v.v.; (c) vật truyền được kết hợp adeno virus; (d) vật truyền virus bệnh gộp da; (e) vật truyền SV 40; (f) vật truyền virus polyoma; (g) vật truyền virus papilloma; (h) vật truyền virus u nhú; (i) vật truyền virus bệnh đậu mùa như orthopox, ví dụ, vật truyền virus bệnh đậu mùa hoặc avipox, ví dụ virus bệnh gia cầm hoặc virus bệnh từ gà; và (j) adenovirus yếu hoặc phụ thuộc virus trợ giúp. Các virus sao chép bị lỗi còn có thể là lợi thế. Các vật truyền khác nhau sẽ hoặc sẽ không trở thành hợp nhất vào trong các tế bào gen. Các cấu trúc có thể bao gồm các trình tự virus để được biến nạp, nêu được mong muốn. Ngoài ra, cấu trúc có thể được hợp nhất vào trong vật truyền có khả năng của episome sao chép, ví dụ vật truyền EPV và EBV. Các cấu trúc để tái tổ hợp sự biểu hiện của ARNi sẽ thông thường yêu cầu các yếu tố điều chỉnh, ví dụ, các chất tăng xúc tác, các chất tăng cường, v.v.,

- 59 -

để đảm bảo sự biểu hiện của ARNi trong các tế bào mục tiêu. Các khía cạnh khác để xem xét cho vật truyền và các cấu trúc được mô tả thêm dưới đây.

Vật truyền hữu dụng để phân phối ARNi sẽ bao gồm các yếu tố điều chỉnh (chất tăng xúc tác, các chất tăng cường, v.v.) đủ cho sự biểu hiện của ARNi trong tế bào hoặc mô đích mong muốn. Các yếu tố điều chỉnh có thể được chọn để cung cấp hoặc là sự biểu hiện cấu trúc hoặc được điều chỉnh/quy nạp.

Sự biểu hiện của iARN có thể được điều hòa chính xác, ví dụ, bằng cách sử dụng trình tự điều hòa cảm ứng mà dễ bị ảnh hưởng đối với các chất điều hòa sinh lý nhất định, ví dụ, hàm lượng glucoza tuần hoàn, hoặc hormon (Docherty và cộng sự., 1994, *FASEB J.* 8:20-24). Các hệ thống biểu hiện cảm ứng như vậy, thích hợp để điều khiển sự biểu hiện dsARN trong tế bào hoặc ở động vật có vú bao gồm, ví dụ, quy định bởi ecdyson, bởi estrogen, progesteron, tetracyclin, thuốc gây cảm ứng hóa học của sự nhị trùng hóa, và isopropyl-beta-D1 -thiogalactopyranosid (IPTG). Người có trình độ trong lĩnh vực sẽ có thể chọn trình tự điều chỉnh/chất tăng xúc tác thích hợp dựa trên ý định sử dụng của ARNi trao đổi thông tin di truyền.

Vật truyền thuộc virus mà chứa các trình tự axit nucleic mã hóa ARNi có thể được sử dụng. Ví dụ, vật truyền retrovirus có thể được dùng (xem Miller và cộng sự., *Meth. Enzymol.* 217:581-599 (1993)). Các vật truyền retrovirus chứa các thành phần cần thiết để đóng gói chính xác gen virus và tích hợp vào trong ADN tế bào chủ. Các trình tự axit nucleic mã hóa ARNi được nhân bản trong một hoặc nhiều vật truyền, mà tạo điều kiện phân phối axit nucleic vào trong bệnh nhân. Chi tiết hơn về vật truyền retrovirus có thể được tìm thấy, ví dụ, trong tài liệu Boesen và cộng sự., *Biotherapy* 6:291-302 (1994), mà mô tả việc sử dụng vật truyền retrovirus để phân phối gen *mdr1* cho tế bào gốc tạo máu để làm cho tế bào gốc này kháng hơn đối với hóa trị liệu. Các tài liệu tham khảo khác mô tả việc sử dụng vật truyền retrovirus trong liệu pháp gen là: Clowes và cộng sự., *J. Clin. Invest.* 93:644-651 (1994); Kiem và cộng sự., *Blood* 83:1467-1473 (1994); Salmons và Gunzberg, *Human Gene Therapy* 4:129-141 (1993); và Grossman và Wilson, *Curr. Opin. in Genetics and Devel.* 3:110-114 (1993). Vật truyền lentivirus được dự tính để sử dụng bao gồm, ví dụ, vật truyền gốc HIV được mô tả trong Sáng chế Mỹ số 6,143,520; 5,665,557; và 5,981,276, mà được kết hợp ở đây để tham khảo.

- 60 -

Các adenovirut cũng được dự tính để dùng trong việc phân phối các ARNi theo sáng chế. Các adenovirut là các chất truyền đặc biệt thu hút, ví dụ, để phân phối các gen đến biểu mô đường hô hấp. Các adenovirut xâm nhập vào biểu mô đường hô hấp một cách tự nhiên khi chúng gây ra bệnh nhẹ. Các mục tiêu khác cho các hệ thống phân phối gốc adenovirut là gan, hệ thống thần kinh trung ương, các tế bào thuộc màng trong, và cơ bắp. Các adenovirut có lợi thế là có khả năng lây nhiễm các tế bào không chia. Kozarsky và Wilson, *Current Opinion in Genetics and Development* 3:499-503 (1993) thể hiện tóm tắt về liệu pháp gen trên cơ sở adenovirut. Bout và cộng sự., *Human Gene Therapy* 5:3-10 (1994) chứng minh việc sử dụng vật truyền adenovirut để chuyển gen vào biểu mô hô hấp của khỉ rhesus. Các trường hợp khác của việc sử dụng adenovirut trong liệu pháp gen có thể được tìm thấy trong Rosenfeld và cộng sự., *Science* 252:431-434 (1991); Rosenfeld và cộng sự., *Cell* 68:143-155 (1992); Mastrangeli và cộng sự., *J. Clin. Invest.* 91:225-234 (1993); Công bố PCT WO94/12649; và Wang, và cộng sự., *Gene Therapy* 2:775-783 (1995). Vật truyền AV thích hợp để biểu hiện iARN được đưa ra trong sáng chế, phương pháp tạo cấu trúc vật truyền AV tái tổ hợp, và phương pháp phân phối vật truyền vào tế bào đích, được mô tả trong Xia H và cộng sự. (2002), *Nat. Biotech.* 20: 1006-1010.

Vật truyền virus kết hợp adeno (AAV) cũng có thể được dùng để phân phối iARN theo sáng chế (Walsh và cộng sự., *Proc. Soc. Exp. Biol. Med.* 204:289-300 (1993); Sáng chế Mỹ số. 5,436,146). Theo một phương án, ARNi có thể được biểu hiện như hai phần riêng biệt, bổ sung các phân tử ARN sợi đơn từ vật truyền AAV tái tổ hợp có, ví dụ, hoặc các chất tăng xúc tác ARN U6 hoặc H1, hoặc chất tăng xúc tác cytomegalovirut (CMV). Vật truyền AAV thích hợp để biểu hiện dsARN được nêu trong sáng chế, phương pháp tạo cấu trúc vật truyền AV tái tổ hợp, và phương pháp phân phối vật truyền vào tế bào đích được mô tả trong Samulski R và cộng sự. (1987), *J. Virol.* 61: 3096-3101; Fisher K J và cộng sự. (1996), *J. Virol.* 70: 520-532; Samulski R và cộng sự. (1989), *J. Virol.* 63: 3822-3826; Sáng chế Mỹ số. 5,252,479; Sáng chế Mỹ số. 5,139,941; Đơn Sáng Chế Quốc Tế Số WO 94/13788; và Đơn Sáng Chế Quốc Tế Số WO 93/24641, toàn bộ phần bộc lộ của chúng được kết hợp ở đây để tham khảo.

Vật truyền virus khác thích hợp để phân phối iARN theo sáng chế là virus mụn đậu mùa chẳng hạn như virus bệnh đậu mùa, ví dụ bệnh đậu mùa giảm độc lực chẳng hạn như

- 61 -

Virut Ankara được cải biến (MVA) hoặc NYVAC, avipox chẳng hạn như đậu mùa gà hoặc đậu mùa chim hoàng yến.

Ái tính của vật truyền thuộc virut có thể được cải biến bởi làm giả vật truyền với protein bao bọc hoặc đổi giống bề mặt khác từ các virut khác, hoặc bởi việc thay thế protein capsit virut khác, thích hợp. Ví dụ, vật truyền lentivirut có thể là làm giả với các protein bề mặt từ virut mụn nước ở miệng (VSV), bệnh dại, Ebola, Mokola, và tương tự. Vật truyền AAV có thể được làm cho hướng đích vào các tế bào khác nhau bằng cách thiết kế vật truyền để biểu hiện các typ huyết thanh protein capsit khác nhau; xem ví dụ, Rabinowitz J E và cộng sự. (2002), *J Virol* 76:791-801, toàn bộ phần bộc lộ của chúng được kết hợp ở đây để tham khảo.

Dược phẩm của vật truyền có thể bao gồm vật truyền trong chất pha loãng chấp nhận được, hoặc có thể bao gồm chất nền phát tán chậm trong đó tá dược phân phối gen được nhúng. Ngoài ra, khi vật truyền phân phối gen hoàn toàn có thể được tạo ra nguyên vẹn từ các tế bào tái tổ hợp, ví dụ, vật truyền retrovirut, dược phẩm có thể bao gồm một hoặc nhiều tế bào mà tạo ra hệ thống phân phối gen.

IV. Dược phẩm theo sáng chế

Sáng chế còn bao gồm dược phẩm và chế phẩm chứa các ARNi theo sáng chế. Theo một phương án, sáng chế đề xuất dược phẩm chứa ARNi, như được mô tả ở đây, và chất mang dược dụng. Dược phẩm chứa iARN hữu dụng để điều trị bệnh kết hợp HAO1 hoặc rối loạn. Các dược phẩm nói trên được điều chế dựa trên chế độ phân phối.

Dược phẩm chứa tác nhân ARNi theo sáng chế có thể là, ví dụ, dung dịch có hoặc không có dung dịch đệm, hoặc chế phẩm chứa chất mang dược dụng. Dược phẩm này bao gồm, ví dụ, dược phẩm nước hoặc kết tinh, chế phẩm liposom, chế phẩm mixen, nhũ tương, và vật truyền liệu pháp gen.

Trong các phương pháp theo sáng chế, tác nhân ARNi có thể được dùng trong dung dịch. Tác nhân ARNi tự do có thể được dùng trong dung dịch không được đệm, ví dụ, trong nước muối hoặc trong nước. Theo cách khác, siARN tự do cũng có thể được dùng trong dung dịch đệm thích hợp. Dung dịch đệm có thể bao gồm axetat, xitrat, prolamin, cacbonat, hoặc phosphat, hoặc dạng kết hợp bất kỳ của chúng. Theo một phương án, dung dịch đệm là

- 62 -

nước muối đệm phosphat (PBS). Độ pH và nồng độ mol của dung dịch đệm chứa tác nhân ARNi có thể được điều chỉnh sao cho nó thích hợp để dùng cho đối tượng.

Theo một số phương án, dung dịch đệm còn chứa tác nhân để kiểm soát nồng độ mol của dung dịch, sao cho nồng độ mol được giữ ở trị số mong muốn, *ví dụ*, ở trị số sinh lý của huyết tương người. Các chất hòa tan có thể được bổ sung vào dung dịch đệm để kiểm soát nồng độ mol bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, protein, peptit, axit amin, các polyme không chuyển hóa, vitamin, ion, đường, các chất chuyển hóa, axit hữu cơ, lipid, hoặc muối. Theo một số phương án, tác nhân để kiểm soát nồng độ mol của dung dịch là muối. Theo một số phương án, tác nhân để kiểm soát nồng độ mol của dung dịch là natri clorua hoặc kali clorua.

Dược phẩm theo sáng chế có thể được dùng ở liều lượng đủ để ức chế sự biểu hiện của gen HAO1.

Liều lượng

Nhìn chung, liều lượng thích hợp của iARN theo sáng chế sẽ nằm trong khoảng từ khoảng 0,001 đến khoảng 200,0 miligam trong mỗi kilogam khối lượng cơ thể của thể nhận trong mỗi ngày, nhìn chung là nằm trong khoảng từ khoảng 0,1 đến 10 hoặc từ 1 đến 50 mg trong mỗi kilogam khối lượng cơ thể trong mỗi ngày. Ví dụ, dsARN có thể được dùng ở liều lượng khoảng 0,01 mg/kg, khoảng 0,05 mg/kg, khoảng 0,5 mg/kg, khoảng 1 mg/kg, khoảng 1,5 mg/kg, khoảng 2 mg/kg, khoảng 3 mg/kg, khoảng 4 mg/kg, khoảng 5 mg/kg, khoảng 6 mg/kg, khoảng 7 mg/kg, khoảng 8 mg/kg, khoảng 9 mg/kg khoảng 10 mg/kg, khoảng 20 mg/kg, khoảng 30 mg/kg, khoảng 40 mg/kg, hoặc khoảng 50 mg/kg trong mỗi liều đơn.

Theo phương án khác, tác nhân ARNi, *ví dụ*, dsARN, được dùng ở liều lượng bằng từ khoảng 0,1 đến khoảng 50 mg/kg, từ khoảng 0,25 đến khoảng 50 mg/kg, từ khoảng 0,5 đến khoảng 50 mg/kg, từ khoảng 0,75 đến khoảng 50 mg/kg, từ khoảng 1 đến khoảng 50 mg/kg, từ khoảng 1,5 đến khoảng 50 mg/kg, từ khoảng 2 đến khoảng 50 mg/kg, từ khoảng 2,5 đến khoảng 50 mg/kg, từ khoảng 3 đến khoảng 50 mg/kg, từ khoảng 3,5 đến khoảng 50 mg/kg, từ khoảng 4 đến khoảng 50 mg/kg, từ khoảng 4,5 đến khoảng 50 mg/kg, từ khoảng 5 đến khoảng 50 mg/kg, từ khoảng 7,5 đến khoảng 50 mg/kg, từ khoảng 10 đến khoảng 50 mg/kg, từ khoảng 15 đến khoảng 50 mg/kg, từ khoảng 20 đến khoảng 50 mg/kg, từ khoảng

- 64 -

mg/kg, từ khoảng 2 đến khoảng 20 mg/kg, từ khoảng 2,5 đến khoảng 20 mg/kg, từ khoảng 3 đến khoảng 20 mg/kg, từ khoảng 3,5 đến khoảng 20 mg/kg, từ khoảng 4 đến khoảng 20 mg/kg, từ khoảng 4,5 đến khoảng 20 mg/kg, từ khoảng 5 đến khoảng 20 mg/kg, từ khoảng 7,5 đến khoảng 20 mg/kg, từ khoảng 10 đến khoảng 20 mg/kg, hoặc từ khoảng 15 đến khoảng 20 mg/kg. Các giá trị và khoảng làm trung gian cho các giá trị được nêu ra cũng là một phần của sáng chế.

Ví dụ, tác nhân ARNi, *ví dụ*, dsARN, có thể được dùng ở liều lượng bằng khoảng 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9, 4,0, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 5,0, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9, 6,0, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, 6,7, 6,8, 6,9, 7,0, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9, 8,0, 8,1, 8,2, 8,3, 8,4, 8,5, 8,6, 8,7, 8,8, 8,9, 9,0, 9,1, 9,2, 9,3, 9,4, 9,5, 9,6, 9,7, 9,8, 9,9, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15, 15,5, 16, 16,5, 17, 17,5, 18, 18,5, 19, 19,5, 20, 20,5, 21, 21,5, 22, 22,5, 23, 23,5, 24, 24,5, 25, 25,5, 26, 26,5, 27, 27,5, 28, 28,5, 29, 29,5, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, hoặc khoảng 50 mg/kg. Các giá trị và khoảng làm trung gian cho các giá trị được nêu ra cũng là một phần của sáng chế.

Theo các phương án nhất định của sáng chế, ví dụ, khi tác nhân ARNi mạch kép bao gồm cải biến (*ví dụ*, một hoặc nhiều môtip của ba cải biến giống nhau trên ba nucleotit liên tiếp, bao gồm một môtip ở hoặc ở gần vị trí phân cắt của tác nhân này), sáu phosphorothioat liên kết, và phối tử, tác nhân này được dùng ở liều lượng nằm trong khoảng từ khoảng 0,01 đến khoảng 0,5 mg/kg, từ khoảng 0,01 đến khoảng 0,4 mg/kg, từ khoảng 0,01 đến khoảng 0,3 mg/kg, từ khoảng 0,01 đến khoảng 0,2 mg/kg, từ khoảng 0,01 đến khoảng 0,1 mg/kg, từ khoảng 0,01 mg/kg đến khoảng 0,09 mg/kg, từ khoảng 0,01 mg/kg đến khoảng 0,08 mg/kg, từ khoảng 0,01 mg/kg đến khoảng 0,07 mg/kg, từ khoảng 0,01 mg/kg đến khoảng 0,06 mg/kg, từ khoảng 0,01 mg/kg đến khoảng 0,05 mg/kg, từ khoảng 0,02 đến khoảng 0,5 mg/kg, từ khoảng 0,02 đến khoảng 0,4 mg/kg, từ khoảng 0,02 đến khoảng 0,3 mg/kg, từ khoảng 0,02 đến khoảng 0,2 mg/kg, từ khoảng 0,02 đến khoảng 0,1 mg/kg, từ khoảng 0,02 mg/kg đến khoảng 0,09 mg/kg, từ khoảng 0,02 mg/kg đến khoảng 0,08 mg/kg, từ khoảng 0,02 mg/kg đến khoảng 0,07 mg/kg, từ khoảng 0,02 mg/kg đến khoảng 0,06 mg/kg, từ

- 65 -

khoảng 0,02 mg/kg đến khoảng 0,05 mg/kg, từ khoảng 0,03 đến khoảng 0,5 mg/kg, từ khoảng 0,03 đến khoảng 0,4 mg/kg, từ khoảng 0,03 đến khoảng 0,3 mg/kg, từ khoảng 0,03 đến khoảng 0,2 mg/kg, từ khoảng 0,03 đến khoảng 0,1 mg/kg, từ khoảng 0,03 mg/kg đến khoảng 0,09 mg/kg, từ khoảng 0,03 mg/kg đến khoảng 0,08 mg/kg, từ khoảng 0,03 mg/kg đến khoảng 0,07 mg/kg, từ khoảng 0,03 mg/kg đến khoảng 0,06 mg/kg, từ khoảng 0,03 mg/kg đến khoảng 0,05 mg/kg, từ khoảng 0,04 đến khoảng 0,5 mg/kg, từ khoảng 0,04 đến khoảng 0,4 mg/kg, từ khoảng 0,04 đến khoảng 0,3 mg/kg, từ khoảng 0,04 đến khoảng 0,2 mg/kg, từ khoảng 0,04 đến khoảng 0,1 mg/kg, từ khoảng 0,04 mg/kg đến khoảng 0,09 mg/kg, từ khoảng 0,04 mg/kg đến khoảng 0,08 mg/kg, từ khoảng 0,04 mg/kg đến khoảng 0,07 mg/kg, từ khoảng 0,04 mg/kg đến khoảng 0,06 mg/kg, từ khoảng 0,05 đến khoảng 0,5 mg/kg, từ khoảng 0,05 đến khoảng 0,4 mg/kg, từ khoảng 0,05 đến khoảng 0,3 mg/kg, từ khoảng 0,05 đến khoảng 0,2 mg/kg, từ khoảng 0,05 đến khoảng 0,1 mg/kg, từ khoảng 0,05 mg/kg đến khoảng 0,09 mg/kg, từ khoảng 0,05 mg/kg đến khoảng 0,08 mg/kg, hoặc từ khoảng 0,05 mg/kg đến khoảng 0,07 mg/kg. Các giá trị và khoảng trị số giữa các giá trị được nói đến trên đây cũng được hiểu là một phần của sáng chế, *ví dụ*, tác nhân ARNi có thể được dùng cho đối tượng ở liều lượng nằm trong khoảng từ khoảng 0,015 mg/kg đến khoảng 0,45 mg/mg.

Ví dụ, tác nhân ARNi, *ví dụ*, tác nhân ARNi trong dược phẩm, có thể được dùng ở liều lượng bằng khoảng 0,01 mg/kg, 0,0125 mg/kg, 0,015 mg/kg, 0,0175 mg/kg, 0,02 mg/kg, 0,0225 mg/kg, 0,025 mg/kg, 0,0275 mg/kg, 0,03 mg/kg, 0,0325 mg/kg, 0,035 mg/kg, 0,0375 mg/kg, 0,04 mg/kg, 0,0425 mg/kg, 0,045 mg/kg, 0,0475 mg/kg, 0,05 mg/kg, 0,0525 mg/kg, 0,055 mg/kg, 0,0575 mg/kg, 0,06 mg/kg, 0,0625 mg/kg, 0,065 mg/kg, 0,0675 mg/kg, 0,07 mg/kg, 0,0725 mg/kg, 0,075 mg/kg, 0,0775 mg/kg, 0,08 mg/kg, 0,0825 mg/kg, 0,085 mg/kg, 0,0875 mg/kg, 0,09 mg/kg, 0,0925 mg/kg, 0,095 mg/kg, 0,0975 mg/kg, 0,1 mg/kg, 0,125 mg/kg, 0,15 mg/kg, 0,175 mg/kg, 0,2 mg/kg, 0,225 mg/kg, 0,25 mg/kg, 0,275 mg/kg, 0,3 mg/kg, 0,325 mg/kg, 0,35 mg/kg, 0,375 mg/kg, 0,4 mg/kg, 0,425 mg/kg, 0,45 mg/kg, 0,475 mg/kg, hoặc khoảng 0,5 mg/kg. Khoảng ở giữa các trị số được đề cập trên đây cũng được dự tính là một phần của sáng chế.

Chế độ điều trị

Dược phẩm có thể được dùng một lần hàng ngày, hoặc ARNi có thể được dùng như là hai, ba, hoặc nhiều liều phụ trong khoảng thời gian thích hợp trong suốt cả ngày hoặc thậm chí sử dụng truyền liên tục hoặc truyền thông qua một chế phẩm giải phóng có kiểm soát. Trong trường hợp đó, ARNi có chứa trong mỗi liều phụ phải nhỏ hơn tương đối để có thể đạt được liều lượng hàng ngày. Đơn vị liều dùng còn có thể được hợp nhất để phân phối qua một vài ngày, *ví dụ*, sử dụng chế phẩm giải phóng ổn định thông thường mà cung cấp sự giải phóng ổn định của ARNi trong khoảng thời gian vài ngày. Chế phẩm phát tán ổn định được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực và đặc biệt hữu dụng để phân phối các tác nhân tại khu vực cụ thể, như có thể sử dụng với các tác nhân theo sáng chế. Trong phương án này, đơn vị liều dùng chứa nhiều liều hàng ngày tương ứng.

Theo các phương án khác, liều đơn của các dược phẩm có thể là tồn tại lâu, như vậy các liều sau đó được sử dụng không nhiều hơn ở khoảng cách 3, 4, hoặc 5 ngày, hoặc không nhiều hơn ở khoảng cách 1, 2, 3, hoặc 4 tuần. Theo một số phương án của sáng chế, liều đơn của các dược phẩm theo sáng chế được dùng một lần một tuần. Theo các phương án khác theo sáng chế, liều đơn của các dược phẩm theo sáng chế được cho dùng mỗi hai tháng.

Người có trình độ cao sẽ đánh giá các yếu tố nhất định có thể ảnh hưởng đến liều dùng và thời gian yêu cầu để điều trị cho đối tượng một cách hiệu quả, bao gồm nhưng không giới hạn ở một vài bệnh hoặc rối loạn, các điều trị trước, sức khỏe chung và/hoặc tuổi của đối tượng, và các bệnh khác có mặt. Hơn nữa, việc điều trị của đối tượng với lượng điều trị hiệu quả của chế phẩm có thể bao gồm việc điều trị đơn hoặc một loạt các chuỗi điều trị. Ước tính liều lượng hữu hiệu và thời gian bán hủy *in vivo* đối với iARN cụ thể được bao hàm bởi sáng chế có thể được tạo ra bằng cách sử dụng các phương pháp luận thông thường.

Ước tính liều lượng hữu hiệu và thời gian bán hủy *in vivo* đối với iARN cụ thể được bao hàm bởi sáng chế cũng có thể được tạo ra trên cơ sở thử nghiệm *in vivo* bằng cách sử dụng mẫu động vật thích hợp. Ví dụ, các thành tựu trong di truyền chuột đã được tạo ra ở một số lượng các mẫu chuột để nghiên cứu các bệnh ở người khác nhau, chẳng hạn như rối loạn có kết hợp với sự biểu hiện của HAO1. Các mẫu như vậy có thể được sử dụng để thử nghiệm *trong cơ thể* của ARNi, cũng như để xác định liều điều trị hiệu quả. Các mẫu chuột

- 67 -

thích hợp đã biết trong lĩnh vực và bao gồm, ví dụ, các mẫu động vật được mô tả trong bản mô tả này.

Phương pháp sử dụng

Các dược phẩm theo sáng chế có thể được dùng theo nhiều cách tùy thuộc vào việc điều trị cục bộ hay toàn thân được mong muốn và tùy theo khu vực được điều trị. Việc sử dụng có thể là tại chỗ (*ví dụ*, bôi miếng dán), qua phổi, *ví dụ*, bằng cách hít vào hoặc bơm vào của bột hoặc bình xịt, bao gồm phun sương; trong khí quản, mũi, biểu bì và thẩm thấu qua da, qua đường uống hoặc tiêm. Việc dùng ngoài đường tiêu hóa bao gồm tiêm hoặc truyền trong tĩnh mạch, trong động mạch, dưới da, trong màng bụng hoặc trong cơ; dưới bì, *ví dụ*, qua dụng cụ cấy; hoặc trong hộp sọ, *ví dụ*, bằng cách dùng trong mô tuyến tụy, nội tủy mạc hoặc trong tâm thất.

iARN có thể được phân phối theo cách hướng đích vào mô cụ thể, chẳng hạn như gan.

Chế phẩm

Các dược phẩm theo sáng chế bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các dung dịch, các nhũ tương, và liposom chứa chế phẩm. Các chế phẩm có thể được tạo ra từ nhiều thành phần mà bao gồm, nhưng không giới hạn ở, chất lỏng hoạt tính, các chất rắn tự nhũ tương hóa và các chất bán rắn tự nhũ tương hóa.

Dược phẩm theo sáng chế, mà có thể thuận lợi là được cho vào trong dạng đơn vị liều dùng, có thể được điều chế bằng kỹ thuật thông thường được biết đến rộng rãi trong ngành công nghiệp dược. Các kỹ thuật như vậy bao gồm bước đưa vào trong hoạt tính kết hợp các nguyên liệu với chất mang dược hoặc tá dược. Nói chung, các chế phẩm được điều chế bởi một cách đồng nhất và sâu sắc vào trong hoạt tính kết hợp các nguyên liệu với lỏng chất mang hoặc chất mang rắn được chia mịn hoặc cả hai, và sau đó, nếu cần thiết, tạo hình cho sản phẩm.

Chế phẩm theo sáng chế có thể được hình thành trong bất kỳ của nhiều khả năng liều dùng có thể tạo thành, nhưng không giới hạn ở, viên nén, viên nang, gel viên nang, si rô lỏng, gel mềm, viên đạn, và viên thụt. Chế phẩm theo sáng chế còn có thể được hình thành như các huyền phù môi trường có nước, không-có nước hoặc hỗn hợp. Các huyền phù có

nước có thể còn chứa các chất mà làm gia tăng độ nhớt của huyền phù bao gồm, ví dụ, natri carboxymetylxenluloza, sorbitol và/hoặc dextran. Huyền phù còn có thể chứa chất ổn định.

Hợp phần theo sáng chế có thể được tạo chế phẩm để dùng qua đường miệng; dùng ngoài đường tiêu hóa, trong nhu mô (vào não), nội tủy mạc, nội tâm thất hoặc trong gan, và/hoặc dùng tại chỗ.

Chế phẩm và công thức để sử dụng bằng đường miệng bao gồm các bột hoặc các hạt, vi hạt, các hạt nano, các huyền phù hoặc các dung dịch trong môi trường có nước hoặc không-có nước, viên nang, gel viên nang, bọc, viên nén hoặc viên nén nhỏ. Các chất làm đặc, các tác nhân tạo vị, các chất pha loãng, chất nhũ hóa, chất hỗ trợ phân phối hoặc các chất liên kết có thể được mong muốn. Theo một số phương án, công thức uống mà trong đó các dsARN được đặc trưng theo sáng chế được sử dụng liên kết với một hoặc nhiều chất tăng sự thẩm thấu các chất hoạt tính bề mặt và các chất chelat. Các chất hoạt tính bề mặt thích hợp bao gồm axit béo và/hoặc este hoặc các muối của chúng, axit mật và/hoặc các muối của chúng. Axit/muối mật thích hợp bao gồm axit chenodeoxycholic (CDCA) và axit ursodeoxychenodeoxycholic (UDCA), axit cholic, axit dehydrocholic, axit deoxycholic, axit glucolic, axit glycholic, axit glycodeoxycholic, axit taurocholic, axit taurodeoxycholic, natri tauro-24,25-di-hydro-fusidat và natri glycodihydrofusidat. Axit béo thích hợp bao gồm axit arachidonic, axit undecanoic, axit oleic, axit lauric, axit caprylic, axit capric, axit myristic, axit palmitic, axit stearic, axit linoleic, axit linolenic, dicaprat, tricaprat, monoolein, dilaurin, glyxeryl 1-monocaprat, 1-dodecylazaxycloheptan-2-on, axylcarnitin, axylcholin, hoặc monoglyxerit, diglyxerit hoặc muối được dùng của chúng (ví dụ, natri). Theo một số phương án, các sự kết hợp của chất tăng cường sự thẩm thấu được sử dụng, ví dụ, axit béo/các muối kết hợp với các axit/muối mật. Một kết hợp mẫu mực là muối natri của axit lauric, axit capric và UDCA. Ngoài ra chất tăng cường sự thẩm thấu bao gồm polyoxyetylen-9-lauryl ete, polyoxyetylen-20-xetyl ete. Các dsARN được đặc trưng theo sáng chế có thể được phân phối qua miệng, trong hạt hình thành bao gồm các hạt khô được phun, hoặc được ghép phân tử để hình thành các hạt micro hoặc nano. Các tác nhân ghép phân tử DsARN bao gồm poly-axit amin; polyimin; polyacrylat; polyalkylacrylat, polyoxetan, polyalkylxyanoacrylat; gelatin hóa tích điện dương, anbumin, tinh bột, acrylat, polyetylen glycol (PEG) và tinh bột; polyalkylxyanoacrylat; polyimin chiết xuất DEAE,

- 69 -

pollulan, xenluloza và tinh bột. Các tác nhân ghép phân tử thích hợp bao gồm chitosan, N-trimethylchitosan, poly-L-lysin, polyhistidin, polyornithin, polyxpecmin, protamin, polyvinylpyridin, polythiodiethylaminometyetylen P(TDAE), polyaminostyren (ví dụ, p-amino), poly(metylxyanoacrylat), poly(etylxyanoacrylat), poly(butylxyanoacrylat), poly(isobutylxyanoacrylat), poly(isohexylxyanoacrylat), DEAE-metacrylat, DEAE-hexylacrylat, DEAE-acrylamit, DEAE-anbumin và DEAE-đextran, polymetylacrylat, polyhexylacrylat, poly(D,L-axit lactic), poly(DL-axit lactic-co-glycolic (PLGA), alginat, và polyetylglycol (PEG). Công thức dùng qua đường miệng cho các dsARN và chế phẩm của chúng như được mô tả chi tiết trong Sáng chế Mỹ 6,887,906, Công bố đơn Mỹ. Số. 20030027780, và Sáng chế Mỹ số. 6,747,014, lần lượt được kết hợp ở đây để tham khảo.

Chế phẩm và công thức tiêm, sử dụng trong sọ (vào trong não), nội tủy mạc, trong não thất hoặc trong gan có thể bao gồm dung dịch trong nước vô trùng mà còn có thể chứa các chất đệm, các chất pha loãng và các phụ gia thích hợp khác như, nhưng không giới hạn ở, chất tăng cường sự thẩm thấu, chất mang hợp chất và chất mang hoặc tá dược được dùng khác.

Chế phẩm và công thức được để sử dụng tại chỗ có thể bao gồm các miếng dán, thuốc mỡ, thuốc nước, kem, gel, thuốc nhỏ, thuốc đạn, thuốc xịt, chất lỏng và bột. Thông thường chất mang được, có gốc nước, bột hoặc dầu, các chất làm đặc và tương tự có thể là cần thiết hoặc được mong muốn. Bao cao su được phủ, găng tay và vật tương tự cũng có thể hữu ích. Công thức dùng tại chỗ thích hợp bao gồm các chất trong đó các ARNi được đặc trưng theo sáng chế được trộn với các tác nhân phân phối tại chỗ như các lipid, liposom, axit béo, este của axit béo, steroid, các chất chelat hóa và các chất hoạt tính bề mặt. Các lipid và liposom thích hợp bao gồm chất trung tính (ví dụ, dioleoylphosphatidyl DOPE etanolamin, dimyristoylphosphatidyl cholin DMPC, distearoylphosphatidyl cholin) âm tính (ví dụ, dimyristoylphosphatidyl glyxerol DMPG) và cation (ví dụ, dioleoyltetrametylaminopropyl DOTAP và dioleoylphosphatidyl etanolamin DOTMA). Các ARNi được đưa ra theo sáng chế có thể được bọc trong liposom hoặc có thể hình thành các cấu trúc kép, cụ thể là liposom cation. Tùy ý, các ARNi có thể là cấu trúc kép đôi với các lipid, cụ thể là các cation lipid. Axit béo và este thích hợp bao gồm nhưng không giới hạn ở axit arachidonic, axit oleic, axit eicosanoic, axit lauric, axit caprylic, axit capric, axit myristic, axit palmitic, axit

- 70 -

stearic, axit linoleic, axit linolenic, đicaprat, tricapat, monoolein, đilaurin, glyxeryl 1-monocapat, 1-đodexylazaxycloheptan-2-on, axylcarnitin, axylcholin, hoặc C₁₋₂₀ alkyl este (ví dụ, isopropylmyristat IPM), monoglyxerit, diglyxerit hoặc muối được dụng của chúng). Các chế phẩm để dùng tại chỗ như được mô tả chi tiết trong Sáng chế Mỹ số. 6,747,014, được kết hợp ở đây để tham khảo.

Chế phẩm iARN chứa Tổ hợp Phân tử Màng

ARNi để sử dụng trong các hợp chất và các phương pháp theo sáng chế có thể được cấu tạo để phân phối trong một nhóm phân tử màng, ví dụ, một liposom hoặc một mixen. Như được sử dụng ở đây, thuật ngữ "liposom" đề cập đến một túi bao gồm các lipid lưỡng tính được sắp xếp trong ít nhất một lớp kép, ví dụ, một lớp kép hoặc nhiều lớp kép. Liposom bao gồm các túi đơn lớp và đa lớp mà có lớp màng hình thành từ nguyên liệu ưa lipid và nước bên trong. Phần nước có chứa hợp chất ARNi. Nguyên liệu ưa lipid phân tách dung dịch nước bên trong khỏi dung dịch nước bên ngoài, mà không bao gồm hợp chất ARNi, mặc dù trong một số ví dụ, nó có thể có. Liposom hữu dụng cho việc chuyển giao và phân phối các thành phần hoạt tính đến khu vực hoạt tính. Vì màng liposom có cấu trúc tương tự như màng sinh học, khi liposom được đưa vào một mô, lớp kép liposom hòa lẫn với lớp kép của màng tế bào. Là sự kết hợp của liposom và sự tiến triển của tế bào, dung dịch nước bên trong bao gồm ARNi được phân phối đến tế bào nơi mà ARNi có thể che ARN mục tiêu và hòa giải ARNi. Trong một số trường hợp, liposom cũng được nhắm mục tiêu cụ thể, ví dụ, để hướng ARNi đến các loại tế bào đặc biệt.

Một liposom chứa một tác nhân ARNi có thể được chuẩn bị bằng nhiều phương pháp khác nhau. Ví dụ, thành phần lipid của liposom được hòa tan trong một chất tẩy rửa để mixen được hình thành với thành phần lipid. Ví dụ, thành phần lipid có thể là một lipid lưỡng tính cation hoặc lipid liên hợp. Chất tẩy rửa có thể chứa hàm lượng mixen cao và có thể là không ion hóa. Các mẫu chất tẩy rửa bao gồm cholat, CHAPS, octylglucosit, deoxycholat, và lauroyl sarcosin. Chất điều chế ARNi sau đó được thêm vào mixen mà chúng bao gồm cả thành phần lipid. Các nhóm cation về lipid ảnh hưởng tương tác với tác nhân ARNi và cô đọng xung quanh ARNi để tạo ra liposom. Sau khi xem xét sự cô đặc, chất tẩy rửa được loại bỏ, ví dụ, bằng cách thẩm tách, để thu được chế phẩm liposom của tác nhân ARNi.

- 71 -

Nếu cần thiết một hợp chất mang hỗ trợ trong việc làm ngưng tụ có thể được bổ sung trong thời gian phản ứng ngưng tụ, ví dụ, bằng cách kiểm soát bổ sung. Ví dụ, các hợp chất mang có thể là một polyme khác axit nucleic (ví dụ, xpecmin hoặc xpecmidin). Độ pH còn có thể được điều chỉnh để thích hợp nhất cho sự ngưng tụ.

Các phương pháp để sản xuất chất chuyển phân phối polynucleotit ổn định, mà kết hợp với một lipid kép polynucleotit/cation như thành phần cấu tạo của chất chuyển phân phối, được mô tả kỹ hơn trong, ví dụ, WO 96/37194, toàn bộ nội dung của ví dụ được kết hợp ở đây để tham khảo. Sự tạo thành liposom cũng có thể bao gồm một hoặc nhiều khía cạnh của phương pháp ví dụ được mô tả trong Felgner, P. L. và cộng sự., *Proc. Natl. Acad. Sci., USA* 8:7413-7417, 1987; Sáng chế Mỹ số. 4,897,355; Sáng chế Mỹ số. 5,171,678; Bangham, và cộng sự. *M. Mol. Biol.* 23:238, 1965; Olson, và cộng sự. *Biochim. Biophys. Acta* 557:9, 1979; Szoka, và cộng sự. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 75: 4194, 1978; Mayhew, và cộng sự. *Biochim. Biophys. Acta* 775:169, 1984; Kim, và cộng sự. *Biochim. Biophys. Acta* 728:339, 1983; và Fukunaga, và cộng sự. *Endocrinol.* 115:757, 1984. Các kỹ thuật thường được sử dụng để điều chế khối kết tụ lipid có kích thước phù hợp để sử dụng làm tá dược phân phối bao gồm nghiền bằng siêu âm và kết đông-rã đông cộng với ép đùn (xem ví dụ, Mayer, và cộng sự. *Biochim. Biophys. Acta* 858:161, 1986). Vi hóa lỏng có thể được dùng khi mong muốn khối kết tụ nhỏ một cách thích hợp (từ 50 đến 200 nm) và tương đối đồng nhất (Mayhew, và cộng sự. *Biochim. Biophys. Acta* 775:169, 1984). Các phương pháp này đều sẵn sàng thích ứng để tập hợp và đưa các tác nhân ARNi được tạo ra đến liposom.

Liposom rơi vào 2 nhóm rộng. Liposom cation được tích điện dương và tương tác với các phân tử axit nucleic tích điện âm để tạo ra một cấu trúc kép hợp ổn định. Phức hợp axit nucleic/liposom được tích điện dương chắn mặt phẳng tế bào tích điện âm và được tiếp thu trong một hạt cơ quan nội bào. Do độ pH axit trong hạt cơ quan nội bào, liposom bị phá vỡ, giải phóng các chất bên trong nó vào tế bào chất (Wang và cộng sự., *Biochem. Biophys. Res. Commun.*, 1987, 147, 980-985).

Liposom mà độ nhạy pH hoặc được tích điện âm, chặn lại axit nucleic hơn là cấu trúc kép với nó. Do cả axit nucleic và lipid đều có điện tích giống nhau, giữa chúng xuất hiện lực đẩy chứ không xảy ra phức hợp. Tuy nhiên, một số axit nucleic bị kẹt bên trong dung dịch nước bên trong của các liposom này. Liposom nhạy cảm pH được sử dụng để phân phối axit

- 72 -

nucleic mã hóa cho các gen tymidin kinaza đến tế bào đơn lớp trong nuôi cấy. Sự biểu hiện của gen ngoại sinh được phát hiện trong tế bào đích (Zhou và cộng sự., *Journal of Controlled Release*, 1992, 19, 269-274).

Một loại quan trọng trong thành phần liposom bao gồm phospholipit chứ không phải là phosphatidylcholin được phân phối tự nhiên. Các chế phẩm liposom trung tính, ví dụ, có thể được tạo ra từ dimyristoyl phosphatidylcholin (DMPC) hoặc dipalmitoyl phosphatidylcholin (DPPC). Các hợp chất liposom thông thường đều được hình thành từ dimyristoyl phosphatidylglycerol, trong khi liposom anion gây dung hợp cơ bản được tạo ra từ dioleoyl phosphatidyletanolamin (DOPE). Một loại hợp chất liposom khác được cấu tạo từ phosphatidylcholin (PC) như, ví dụ, PC hạt đậu nành, và PC trứng. Một loại khác được tạo ra từ hỗn hợp giữa phospholipit và/hoặc phosphatidylcholin và/hoặc cholesterol.

Các ví dụ về các phương pháp phác đồ đưa liposom vào tế bào *in vitro* và *in vivo* bao gồm Sáng chế Mỹ số. 5,283,185; Sáng chế Mỹ số. 5,171,678; WO 94/00569; WO 93/24640; WO 91/16024; Felgner, *J. Biol. Chem.* 269:2550, 1994; Nabel, *Proc. Natl. Acad. Sci.* 90:11307, 1993; Nabel, *Human Gene Ther.* 3:649, 1992; Gershon, *Biochem.* 32:7143, 1993; và Strauss *EMBO J.* 11:417, 1992.

Các hệ thống liposom không ion hóa cũng đã được kiểm tra để xác định tính hữu dụng trong việc phân phối của thuốc đến da, trong các hệ thống đặc biệt bao gồm chất có hoạt tính bề mặt không ion và cholesterol. Các chế phẩm liposom không ion bao gồm Novasome™ I (glyxeryl dilaurat/cholesterol/polyoxyetylen-10-stearyl ete) và Novasome™ II (glyxeryl distearat/cholesterol/polyoxyetylen-10-stearyl ete) được sử dụng để phân phối xyclosporin-A đến chân bì của da chuột nhắt. Kết quả chỉ ra rằng hệ liposom không ion này hữu hiệu trong việc làm thuận tiện cho sự lắng đọng của xyclosporin A vào các lớp khác nhau của da (Hu và cộng sự. *S.T.P. Pharma. Sci.*, 1994, 4(6) 466).

Liposom cũng bao gồm liposom “ổn định hóa không gian”, một thuật ngữ mà, như được sử dụng ở đây, đề cập đến liposom bao gồm một hoặc nhiều lipid chuyên biệt mà khi kết hợp vào liposom sẽ giúp tăng cường thời gian tuần hoàn so với liposom thiếu lipid chuyên biệt. Các ví dụ về liposom ổn định hóa không gian là các chất trong đó phần của phần lipid tạo thành bọc của liposom (A) bao gồm một hoặc nhiều các glycolipit, như monosialogangliosit GM1, hoặc (B) là phải sinh hóa với một hoặc nhiều polyme ưa nước,

- 73 -

như gốc polyetylen glycol (PEG). Mặc dù không mong muốn bị ràng buộc bởi lý thuyết cụ thể bất kỳ, trong lĩnh vực này người ta cho rằng, ít nhất là đối với các liposom được làm ổn định về mặt không gian chứa gangliosit, sphingomyelin, hoặc lipid được tạo dẫn xuất bằng PEG, thời gian bán hủy tuần hoàn đã được tăng cường của các liposom này được làm ổn định về mặt không gian bắt nguồn từ sự hấp thụ vào tế bào giảm của hệ lưới nội mô (RES) (Allen và cộng sự., *FEBS Letters*, 1987, 223, 42; Wu và cộng sự., *Cancer Research*, 1993, 53, 3765).

Các liposom khác nhau bao gồm một hoặc nhiều glycolipit được biết đến trong lĩnh vực. Papahadjopoulos và cộng sự. (*Ann. N.Y. Acad. Sci.*, 1987, 507, 64) báo cáo khả năng của monosialogangliosit GM_1 , galactoxerebrosit sulfat và phosphatidylinositol để cải thiện thời gian bán hủy trong máu của liposom. Các phát hiện này được giải thích chi tiết bởi Gabizon và cộng sự. (*Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, 1988, 85, 6949). Sáng chế Mỹ số. 4,837,028 và WO 88/04924, cả hai của Allen và cộng sự, bộc lộ liposom chứa (1) sphingomyelin và (2) gangliosit GM_1 hoặc este của galactoxerebrosit sulfat. Sáng chế Mỹ Số. 5,543,152 (Webb và cộng sự.) bộc lộ liposom bao gồm sphingomyelin. Liposom bao gồm 1,2-sn-dimyristoylphosphatidylcholin được bộc lộ trong WO 97/13499 (Lim và cộng sự).

Theo một phương án, liposom cation được sử dụng. Liposom cation có lợi thế là có thể kết hợp với màng tế bào. Liposom không cation, mặc dù không thể kết hợp hiệu quả với các màng huyết tương, được đưa lên bởi các đại thực bào trong cơ thể và có thể được dùng để phân phối các tác nhân ARNi đến các đại thực bào.

Các lợi thế khác của liposom bao gồm: Các liposom thu được từ các phospholipit tự nhiên tương thích sinh học và có thể thoái biến sinh học; các liposom có thể kết hợp nhiều loại thuốc hòa tan trong nước và lipid; các liposom có thể bảo vệ tác nhân ARNi đã được kết nang trong các ngăn bên trong của chúng khỏi bị chuyển hóa và thoái hóa (Rosoff, trong "Pharmaceutical Dosage Forms," Lieberman, Rieger và Banker (Eds.), 1988, Tập 1, trang 245). Điều quan trọng trong việc tạo chế phẩm liposom là mặt phẳng tích điện lipid, kích thước túi và thể tích nước của liposom.

Lipid cation tổng hợp tích điện dương, N-[1-(2,3-dioleyloxy)propyl]-N,N,N-trimetylamoni clorua (DOTMA) có thể được dùng để tạo thành các liposom nhỏ mà tương

- 74 -

tác tự phát với axit nucleic để tạo thành phức hợp lipid-axit nucleic mà có khả năng dung hợp với lipid tích điện dương của màng tế bào của tế bào nuôi cấy mô, dẫn đến việc phân phối tác nhân ARNi (xem ví dụ, Felgner, P. L. và cộng sự., Proc. Natl. Acad. Sci., USA 8:7413-7417, 1987 và Sáng chế Mỹ số. 4,897,355 mô tả về DOTMA và sử dụng nó với ADN).

Chất tương tự DOTMA, 1,2-bis(oleoyloxy)-3-(trimethylammonia)propan (DOTAP) có thể được sử dụng kết hợp với phospholipid để tạo ra túi phức ADN. Lipofectin™ (Bethesda Research Laboratories, Gaithersburg, Md.) là một tác nhân hiệu quả để phân phối lượng lớn anion axit nucleic đến tế bào mô sống được nuôi cấy bao gồm liposom DOTMA tích điện dương mà tương tác tự phát với polynucleotit tích điện âm để hình thành các cấu trúc kép. Khi sử dụng đủ các liposom tích điện dương, điện tích lưới cũng sẽ tích điện dương. Các cấu trúc kép tích điện dương được điều chế bằng cách này một cách ngẫu nhiên được gắn với các bề mặt tế bào điện tích âm, trộn với huyết tương màng, và phân phối một cách hiệu quả axit nucleic chức năng vào, ví dụ, mô cấy các tế bào. Một cation lipid khác có trên thị trường, 1,2-bis(oleoyloxy)-3,3-(trimethylammonia)propan ("DOTAP") (Boehringer Mannheim, Indianapolis, Indiana) khác với DOTMA mà các gốc oleoyl được liên kết bởi este, chứ không phải là các liên kết ete.

Các hợp chất lipid cation được báo cáo khác bao gồm các hợp chất mà đã được liên hợp với nhiều loại gốc bao gồm, ví dụ, carboxyspermin mà đã được liên hợp với một trong hai loại lipid và bao gồm các hợp chất chẳng hạn như 5-carboxyspermylglyxin dioctaoeoylamit ("DOGS") (Transfectam™, Promega, Madison, Wisconsin) và dipalmitoylphosphatidyletanolamin 5-carboxyspermyl-amit ("DPPEs") (xem ví dụ, Sáng chế Mỹ số. 5,171,678).

Thế liên hợp lipid cation khác bao gồm sự tạo dẫn xuất của lipid với cholesterol ("DC-Chol") mà đã được tạo chế phẩm thành các liposom kết hợp với DOPE (xem, Gao, X. và Huang, L., *Biochim. Biophys. Res. Commun.* 179:280, 1991). Lipopolylysin, được tạo ra bằng cách liên hợp polylysin với DOPE, đã được báo cáo là hữu hiệu để chuyển nạp trong sự có mặt của huyết thanh (Zhou, X. và cộng sự., *Biochim. Biophys. Acta* 1065:8, 1991). Đối với một số dòng tế bào, các liposom cation lipid liên hợp, đã được cho biết là biểu hiện tính độc thấp hơn và cung cấp thêm sự được biến nạp hiệu quả hơn DOTMA chứa chế

- 75 -

phẩm. Các sản phẩm lipit cation có sẵn trên thị trường khác bao gồm DMRIE và DMRIE-HP (Vical, La Jolla, California) và Lipofectamin (DOSPA) (Life Technology, Inc., Gaithersburg, Maryland). Các cation lipit khác thích hợp cho việc phân phối các aligonucleotit được mô tả trong WO 98/39359 và WO 96/37194.

Các chế phẩm liposom đặc biệt thích hợp với việc sử dụng cục bộ, liposom cho thấy một số ưu điểm hơn so với các chế phẩm khác. Các ưu điểm đó bao gồm việc làm giảm tác dụng phụ liên quan đến sự hấp thụ cao có hệ thống của việc sử dụng thuốc, tăng sự tích tụ của các thuốc sử dụng đến mục tiêu mong muốn, và khả năng sử dụng tác nhân ARNi cho da. Theo một số phương án thực hiện, liposom hữu dụng để phân phối tác nhân ARNi đến các tế bào biểu mô và còn tăng cường sự thâm nhập của tác nhân ARNi vào mô bì, ví dụ, vào da. Ví dụ, liposom có thể được sử dụng cục bộ. Việc phân phối tại chỗ của thuốc được tạo chế phẩm dưới dạng các liposom cho da đã được ghi trong tài liệu (xem ví dụ, Weiner và cộng sự., *Journal of Drug Targeting*, 1992, vol. 2, 405-410 và du Plessis và cộng sự., *Antiviral Research*, 18, 1992, 259-265; Mannino, R. J. và Fould-Fogerite, S., *Biotechniques* 6:682-690, 1988; Itani, T. và cộng sự. *Gene* 56:267-276. 1987; Nicolau, C. và cộng sự. *Meth. Enz.* 149:157-176, 1987; Straubinger, R. M. và Papahadjopoulos, D. *Meth. Enz.* 101:512-527, 1983; Wang, C. Y. và Huang, L., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 84:7851-7855, 1987).

Các hệ thống liposom không ion hóa cũng đã được kiểm tra để xác định tính hữu dụng trong việc phân phối của thuốc đến da, trong các hệ thống đặc biệt bao gồm chất có hoạt tính bề mặt không ion và cholesterol. Các chế phẩm liposom không ion bao gồm Novasome I (glyxeryl đilaurat/cholesteol/polyoxyetylen-10-stearyl ete) và Novasome II (glyxeryl đistearat/cholesteol/polyoxyetylen-10-stearyl ete) được sử dụng để phân phối thuốc vào trong hạ bì của da chuột nhắt. Chế phẩm như vậy với tác nhân ARNi là hữu dụng cho điều trị rối loạn ngoài da.

Liposom mà bao gồm ARNi có thể được tạo ra có khả năng biến dạng cao. Tính biến dạng như vậy có thể giúp liposom thẩm thấu qua lỗ chân lông mà nhỏ hơn bán kính trung bình của của liposom. Ví dụ, transferosom là một loại liposom có thể biến dạng. Các transferosom có thể được tạo ra bằng cách cho vào các chất kích hoạt cạnh bề mặt, thường là các chất hoạt tính bề mặt, vào chế phẩm liposomal tiêu chuẩn. Transferosom mà bao gồm

- 76 -

tác nhân ARNi có thể được phân phối, ví dụ, dưới da bằng cách tiêm để phân phối tác nhân ARNi vào tế bào keratin trong da. Để vượt qua da động vật có vú còn nguyên vẹn, các túi lipit phải đi qua một loạt các lỗ chân lông mịn, mỗi túi với đường kính ít hơn 50 nm, dưới sự ảnh hưởng của một độ gradient thẩm thấu qua da thích hợp. Ngoài ra, do các tính chất của lipit, các transferosom có thể là tự tối ưu hóa (thích ứng với hình dạng của lỗ chân lông, ví dụ, trên da), tự sửa chữa, thường đạt đến mục tiêu của chúng mà không chia mảnh, và thường là tự tải.

Các chế phẩm khác theo như được mô tả trong các Đơn tạm thời Mỹ Số. 61/018,616, nộp ngày 2 tháng 1 năm 2008; 61/018,611, nộp ngày 2 tháng 1 năm 2008; 61/039,748, nộp ngày 26 tháng 3 năm 2008; 61/047,087, nộp ngày 22 tháng 4 năm 2008 và 61/051,528, nộp ngày 8 tháng 5 năm 2008. Đơn PCT số PCT/US2007/080331, nộp ngày 3 tháng 10 năm 2007 cũng mô tả chế phẩm mà tuân theo sáng chế.

Transferosom là loại liposom khác nữa, và là khối kết tụ lipit có thể biến dạng cao mà là ứng viên hấp dẫn đối với tá dược phân phối thuốc. Transferosom có thể được mô tả dưới dạng giọt lipit mà có thể biến dạng cao mà chúng có thể dễ dàng thâm nhập qua các lỗ nhỏ hơn giọt này. Transferosom có thể thích ứng với môi trường mà chúng được sử dụng, ví dụ, chúng tự tối ưu hóa (thích ứng với hình dạng của các lỗ trong da), tự sửa chữa, thường xuyên đến được đích của chúng mà không bị phân mảnh, và thường tự tải. Để tạo ra transferosom có thể bổ sung chất hoạt hóa edge bề mặt, thường là chất hoạt động bề mặt, vào hợp phần liposom tiêu chuẩn. Transferosom đã được sử dụng để phân phối albumin huyết thanh cho da. Sự phân phối qua trung gian transferosom của albumin huyết thanh đã được thể hiện là hữu hiệu như sự tiêm dưới da của dung dịch chứa albumin huyết thanh.

Các chất hoạt tính bề mặt tìm thấy ứng dụng rộng rãi trong các chế phẩm như các nhũ tương (bao gồm các vi nhũ tương) và liposom. Cách phổ biến nhất của việc phân loại và xếp hạng tính chất của nhiều loại chất hoạt tính bề mặt khác nhau, cả tự nhiên và tổng hợp, là bằng cách sử dụng tỉ lệ cân bằng chất ưa nước/chất ưa lipit (HLB). Bản chất của nhóm ưa nước (còn được gọi là "đầu") tạo ra phương tiện hữu hiệu nhất để phân loại các chất hoạt động bề mặt khác nhau dùng trong chế phẩm (Rieger, trong *Pharmaceutical Dosage Forms*, Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y., 1988, trang 285).

- 77 -

Nếu chất hoạt tính bề mặt phân tử là không ion hóa, nó được phân loại là chất hoạt tính bề mặt không ion. Các chất hoạt tính bề mặt không ion có khả năng áp dụng rộng rãi trong các sản phẩm dược và mỹ phẩm và sử dụng được với giá trị độ pH trải dài. Nói chung giá trị HLB của chúng từ 2 đến 18 tùy thuộc vào cấu trúc. Các chất hoạt tính bề mặt không ion bao gồm este không ion như este của etylen glycol, este của propylen glycol, este của glyxeryl, este của polyglyxeryl, este của sorbitan, este của sucroza, và este được etoxyl hóa. Alkanolamit không ion và ete như các etoxylat rượu béo, rượu propoxylat, và polyme khối được etoxyl hóa/propoxyl hóa cũng được bao gồm trong lớp này. Các chất hoạt tính bề mặt polyoxyetylen là các chất quan trọng nhất của lớp chất hoạt tính bề mặt không ion.

Nếu chất hoạt tính bề mặt phân tử mang điện tích âm khi nó được tan hoặc phân tán trong nước, thì chất hoạt tính bề mặt được phân loại là anion. Các chất hoạt tính bề mặt anion bao gồm carboxylat như xà phòng, axyl lactylat, axyl amit của axit amin, este của sulfuric axit như alkyl sulfat và alkyl sulfat được etoxyl hóa, sulfonat như alkyl benzen sulfonat, axyl isethionat, axyl taurat và sulfosuccinat, và phosphat. Các chất quan trọng nhất của lớp chất hoạt tính bề mặt anion là alkyl sulfat và xà phòng.

Nếu chất hoạt tính bề mặt phân tử mang tích điện dương khi nó được hòa tan hoặc phân tán trong nước, thì chất hoạt tính bề mặt được phân loại là cation. Các chất hoạt tính bề mặt cation bao gồm các muối amoni bậc bốn và các amin được etoxyl hóa. Các muối amoni bậc bốn là các chất được sử dụng nhiều nhất của lớp này.

Nếu chất hoạt tính bề mặt phân tử có khả năng mang hoặc tích điện dương hoặc âm, chất hoạt tính bề mặt được phân loại là chất lưỡng tính. Các chất hoạt tính bề mặt lưỡng tính bao gồm axit acrylic phái sinh, alkylamit được thế, N-alkylbetain và phosphatit.

Việc sử dụng chất hoạt động bề mặt trong sản phẩm thuốc, chế phẩm và trong nhũ tương đã được xem xét (Rieger, trong *Pharmaceutical Dosage Forms*, Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y., 1988, trang 285).

ARNi dùng trong phương pháp theo sáng chế còn có thể được cung cấp dưới dạng các chế phẩm mixen. "Các mixen" được định nghĩa ở đây là loại cụ thể của việc lắp ráp phân tử trong đó lưỡng tính các phân tử được sắp xếp trong cấu trúc hình cầu như vậy tất cả các phần kỵ nước của các phân tử là trực tiếp hướng vào, để lại phần ưa nước tiếp xúc với pha nước xung quanh. Việc sắp xếp ngược là tồn tại nếu môi trường là kỵ nước.

- 78 -

Chế phẩm mixen được trộn thích hợp để phân phối thông qua việc đi qua các màng có thể được điều chế bởi trộn dung dịch trong nước của các chế phẩm sARNi, kim loại kiềm C₈ đến C₂₂ alkyl sulfat, và các hợp chất tạo thành mixen. Mixen mẫu mực tạo thành hợp chất bao gồm lexithin, axit hyaluronic, các muối được dụng của axit hyaluronic, axit glycolic, axit lactic, chất chiết cúc La Mã, chất chiết dưa chuột, axit oleic, axit linoleic, axit linolenic, monoolein, monooleat, monolaurat, dầu lưu ly, dầu cây anh thảo, tinh dầu bạc hà, trihydroxy oxo cholanyl glyxin và các muối được dụng của chúng, glyxerin, polyglyxerin, lysin, polylysin, triolein, polyoxyetylen ete và dạng tương tự của chúng, polidocanol alkyl ete và dạng tương tự của chúng, chenodeoxycholat, deoxycholat, và các hỗn hợp của chúng. Mixen tạo thành hợp chất có thể được thêm vào ở cùng thời điểm hoặc sau khi bổ sung kim loại kiềm alkyl sulfat. Các mixen được trộn sẽ hình thành với cơ bản là bất kỳ loại của các nguyên liệu trộn nhưng việc trộn mạnh mẽ nhằm để cung cấp các mixen kích cỡ nhỏ hơn.

Trong một phương pháp chế phẩm mixen thứ nhất được điều chế mà chứa chế phẩm siARN và ít nhất kim loại kiềm alkyl sulfat. Chế phẩm mixen thứ nhất là sau đó được trộn với ít nhất ba hợp chất tạo thành mixen để hình thành chế phẩm được trộn mixen. Trong phương pháp khác, chế phẩm mixen được điều chế bằng cách trộn chế phẩm siARN, kim loại kiềm alkyl sulfat và ít nhất một trong số các mixen tạo thành hợp chất, sau đó bằng cách bổ sung mixen còn lại tạo thành hợp chất, với việc trộn mạnh mẽ.

Phenol và/hoặc m-cresol có thể được thêm vào chế phẩm mixen được trộn để ổn định hóa chế phẩm và bảo vệ chống lại sự phát triển của vi khuẩn. Tùy ý, phenol và/hoặc m-cresol có thể được thêm vào với mixen tạo thành các nguyên liệu. Tác nhân đẳng trương như glyxerin có thể cũng có thể được thêm vào công thức của hỗn hợp chế phẩm được trộn.

Để phân phối của chế phẩm mixen bằng cách phun, công thức có thể được đặt vào trong bình phân phối khí nén và bình phân phối được nạp với chất đẩy. Chất đẩy, mà dưới áp suất, là ở dạng lỏng trong bình phân phối. Các tỷ lệ thành phần được điều chỉnh sao cho pha nước và chất đẩy trở thành một, cụ thể là, có một pha. Nếu có hai pha, cần phải khuấy bình phân phối trước khi phân phối một phần dung lượng, ví dụ, thông qua van có đồng hồ đo. Liều được phân phối của tác nhân được là được đẩy vào từ các van có đồng hồ đo trong bình xịt tinh luyện.

- 79 -

Các chất đẩy có thể bao gồm hydro-chứa cloroflocarbon, floccarbon chứa hydro, dimethyl ete và diethyl ete. Theo một số phương án, HFA 134a (1,1,1,2 tetrafloetan) có thể được sử dụng.

Các nồng độ cụ thể của các nguyên liệu thiết yếu có thể được xác định bởi thí nghiệm tương đối đơn giản. Để hấp thụ thông qua đường uống, thường có mong muốn gia tăng, *ví dụ*, ít nhất gấp đôi hoặc gấp ba, liều dùng thông qua tiêm hoặc sử dụng thông qua đường tiêu hóa.

Hạt lipid

iARN, *ví dụ*, dsARN theo sáng chế có thể được bao nang đầy đủ trong chế phẩm lipid, *ví dụ*, LNP, hoặc hạt axit nucleic-lipid khác.

Như được sử dụng ở đây, thuật ngữ "LNP" đề cập đến hạt lipid axit nucleic ổn định. LNP chứa lipid tích điện dương, lipid không tích điện dương, và lipid ngăn chặn sự kết cụm của hạt (*ví dụ*, liên hợp PEG-lipid). LNP cực kỳ hữu dụng cho các áp dụng toàn thân, như chúng thể hiện vòng đời tuần hoàn được kéo dài sau khi tiêm trong tĩnh mạch (i.v.) tiêm và tích lũy ở các vị trí xa (*ví dụ*, các vị trí được phân cắt về vật lý từ vị trí dùng). LNP bao gồm "pSPLP," mà bao gồm tác nhân gây ngưng tụ được đóng gói-axit nucleic cấu trúc kép như nêu trong Công bố đơn PCT số WO 00/03683. Các hạt theo sáng chế thường có đường kính trung bình của khoảng 50 nm đến 150 nm, thông thường hơn khoảng 60 nm đến 130 nm, thông thường hơn khoảng 70 nm đến 110 nm, thông thường nhất khoảng 70 nm đến 90 nm, và là cơ bản là không độc hại. Ngoài ra, axit nucleic khi có mặt trong các hạt lipid axit nucleic theo sáng chế là kháng dung dịch trong nước với sự thoái biến với nucleaza. Các hạt lipid axit nucleic và phương pháp điều chế của chế phẩm được bộc lộ trong, *ví dụ*, Sáng chế Mỹ số 5,976,567; 5,981,501; 6,534,484; 6,586,410; 6,815,432; Công bố đơn Mỹ số 2010/0324120 và Công bố đơn PCT số WO 96/40964.

Theo một phương án, tỉ lệ lipid với thuốc (tỷ lệ khối lượng/khối lượng) (*ví dụ*, tỷ lệ lipid với dsARN) sẽ nằm trong khoảng từ 1:1 đến 50:1, từ 1:1 đến 25:1, từ 3:1 đến 15:1, từ 4:1 đến 10:1, từ 5:1 đến 9:1, hoặc khoảng 6:1 đến 9:1. Các khoảng làm trung gian cho các khoảng được trích ở trên cũng được coi là một phần của sáng chế.

- 80 -

Lipit cation có thể là, ví dụ, N,N-đioleoyl-N,N-đimetylmoni clorua (DODAC), N,N-đistearyl-N,N-đimetylmoni bromua (DDAB), N-(I-(2,3-đioleoyloxy)propyl)-N,N,N-trimetylmoni clorua (DOTAP), N-(I-(2,3-đioleoyloxy)propyl)-N,N,N-trimetylmoni clorua (DOTMA), N,N-đimetyl-2,3-đioleoyloxy)propylamin (DODMA), 1,2-Đilinoleoyloxy-N,N-đimetylaminopropan (DLinDMA), 1,2-Đilinolenyloxy-N,N-đimetylaminopropan (DLinDMA), 1,2-Đilinoleylcarbamoxyloxy-3-đimetylaminopropan (DLin-C-DAP), 1,2-Đilinoleoxy-3-(đimetylamin)axetoxypopropan (DLin-DAC), 1,2-Đilinoleoxy-3-morpholinopropan (DLin-MA), 1,2-Đilinoleoyl-3-đimetylaminopropan (DLinDAP), 1,2-Đilinoleylthio-3-đimetylaminopropan (DLin-S-DMA), 1-Linoleoyl-2-linoleoyloxy-3-đimetylaminopropan (DLin-2-DMA), muối 1,2-Đilinoleoyloxy-3-trimetylaminopropan clorua (DLin-TMA.Cl), muối 1,2-Đilinoleoyl-3-trimetylaminopropan clorua (DLin-TAP.Cl), 1,2-Đilinoleoyloxy-3-(N-metylpiperazino)propan (DLin-MPZ), hoặc 3-(N,N-Đilinoleylamino)-1,2-propandiol (DLinAP), 3-(N,N-Đioleylamino)-1,2-propandiol (DOAP), 1,2-Đilinoleoxyloxy-3-(2-N,N-đimetylamin)etoxypopropan (DLin-EG-DMA), 1,2-Đilinolenyloxy-N,N-đimetylaminopropan (DLinDMA), 2,2-Đilinoleyl-4-đimetylaminometyl-[1,3]-đioxolan (DLin-K-DMA) hoặc chất tương tự của chúng, (3aR,5s,6aS)-N,N-đimetyl-2,2-đi((9Z,12Z)-octađeca-9,12-đienyl)tetrahydro-3aH-xyclopenta[d][1,3]đioxol-5-amin (ALN100), (6Z,9Z,28Z,31Z)-heptatriaconta-6,9,28,31-tetraen-19-yl 4-(đimetylamin)butanoat (MC3), 1,1'-(2-(4-(2-((2-(bis(2-hydroxyđodexyl)amino)etyl)(2-hydroxyđodexyl)amino)etyl)piperazin-1-yl)etylazanediy)l)điđodecan-2-ol (Tech G1), hoặc hỗn hợp của chúng. Lipit cation có thể bao gồm từ 20 mol % đến 50 mol % hoặc khoảng 40 mol % của tổng lipit có mặt trong hạt.

Theo phương án khác, hợp chất 2,2-Đilinoleyl-4-đimetylaminometyl-[1,3]-đioxolan có thể được sử dụng để điều chế các hạt nano lipit-sARNi. Sự tổng hợp 2,2-Đilinoleyl-4-đimetylaminometyl-[1,3]-đioxolan được mô tả trong tài liệu Đơn quốc tế số PCT/US2009/061897, được công bố dưới dạng WO/2010/048536, mà được kết hợp ở đây để tham khảo.

Theo một phương án, hạt lipit-sARNi bao gồm 40% 2, 2-Đilinoleyl-4-đimetylaminometyl-[1,3]-đioxolan: 10% DSPC: 40% Cholesteol: 10% PEG-C-DOMG (phần trăm mol) với kích cỡ hạt $63,0 \pm 20$ nm và tỷ lệ siARN/Lipit 0,027.

Lipit ion hóa được/không cation có thể là lipit anion hoặc lipit trung tính bao gồm, nhưng không giới hạn ở, distearoylphosphatidylcholin (DSPC), dioleoylphosphatidylcholin (DOPC), đipalmitoylphosphatidylcholin (DPPC), dioleoylphosphatidylglyxerol (DOPG), đipalmitoylphosphatidylglyxerol (DPPG), dioleoyl-phosphatidyletanolamin (DOPE), palmitoyloleoylphosphatidylcholin (POPC), palmitoyloleoylphosphatidyletanolamin (POPE), dioleoyl-phosphatidyletanolamin 4-(N-maleimidometyl)-xyclohexan-1- carboxylat (DOPE-mal), đipalmitoyl phosphatidyl etanolamin (DPPE), đimyristoylphosphoetanolamin (DMPE), distearoyl-phosphatidyl-etanolamin (DSPE), 16-O-monometyl PE, 16-O-đimetyl PE, 18-1 -trans PE, 1 -stearoyl-2-oleoyl- phosphatidylestanolamin (SOPE), cholesteol, hoặc hỗn hợp của chúng. Cation không lipit có thể là từ 5 mol % đến 90 mol %, khoảng 10 mol %, hoặc khoảng 58 mol % nếu cholesteol được bao gồm, của tổng lipit có mặt trong hạt.

Thể liên hợp lipit mà ức chế sự tập hợp của các hạt có thể là, ví dụ, polyetylenglycol (PEG)-lipit bao gồm, không giới hạn, PEG-điaxylglyxerol (DAG), PEG-đialkyloxypropyl (DAA), PEG-phospholipit, PEG-xeramit (Cer), hoặc hỗn hợp của chúng. Thể liên hợp PEG-DAA có thể là, ví dụ, PEG-đilauryloxypropyl (C_{12}), PEG-đimyristyloxypropyl (C_{14}), PEG-đipalmityloxypropyl (C_{16}), hoặc PEG- distearyloxypropyl (C_{18}). Lipit được liên hợp mà ngăn chặn sự tập hợp của các hạt có thể là từ 0 mol % đến 20 mol % hoặc khoảng 2 mol % của tổng lipit có mặt trong hạt.

Theo một số phương án, hạt lipit axit nucleic còn bao gồm cholesterol ở, ví dụ, khoảng 10 mol % đến 60 mol % hoặc khoảng 48 mol % của tổng lipit có mặt trong hạt.

Theo một phương án, thể lipit ND98·4HCl (MW 1487) (xem Đơn sáng chế Mỹ số 12/056,230, nộp ngày 3/26/2008, được kết hợp ở đây để tham khảo), Cholesterol (Sigma-Aldrich), và PEG-xeramit C16 (Avanti Polar Lipids) có thể được sử dụng để điều chế các hạt nano lipit-dsARN (cụ thể là, các hạt LNP01). Các dung dịch gốc trong mỗi etanol có thể được điều chế như sau: ND98, 133 mg/ml; Cholesterol, 25 mg/ml, PEG-xeramit C16, 100 mg/ml. Các dung dịch gốc ND98, Cholesterol, và PEG-xeramit C16 có thể sau đó được kết hợp trong, ví dụ, tỉ lệ mol 42:48:10. Dung dịch lipit được kết hợp có thể được trộn với dsARN có nước (ví dụ, trong natri axetat độ pH 5) như vậy nồng độ etanol cuối cùng là khoảng 35-45% và nồng độ natri axetat cuối cùng là khoảng 100-300 mM. Các hạt nano lipit-dsARN chủ yếu hình thành một cách tự nhiên khi trộn. Dựa vào khoảng cách hạt phân

- 82 -

phối mong muốn, hỗn hợp hạt nano thu được có thể được đun thông qua màng polycarbonat (ví dụ, cắt nhỏ 100 nm) bằng cách sử dụng, ví dụ, máy đun bình nhiệt, như Lipex Extruder (Northern Lipids, Inc). Trong một số trường hợp, bước đun có thể được bỏ qua. Việc loại bỏ ethanol và trao đổi chất đệm đồng thời có thể được thực hiện bởi, ví dụ, chạy thận hoặc lọc dòng chảy tiếp xúc. Chất đệm có thể được đổi với, ví dụ, nước muối đệm phosphat (PBS) ở khoảng độ pH 7, ví dụ, khoảng độ pH 6,9, khoảng độ pH 7,0, khoảng độ pH 7,1, khoảng độ pH 7,2, khoảng độ pH 7,3, hoặc khoảng độ pH 7,4. Chế phẩm LNP01 được mô tả, ví dụ, trong Công bố đơn quốc tế số WO 2008/042973, được kết hợp ở đây để tham khảo.

Ví dụ khác về chế phẩm lipid-dsARN được mô tả trong Bảng A.

Bảng A. Chế phẩm dsARN lipid ví dụ

	Lipit Ion hóa được/Cation	Thế liên hợp lipid cation/lipit không cation/cholesterol/PEG-lipit Tỷ lệ lipid:sARNi
LNP_DLInDMA	1,2-Đilinolenyloxy-N,N-đimetylaminopropan (DLInDMA)	DLInDMA/DPPC/Cholesterol/PEG-cDMA (57,1/7,1/34,4/1,4) lipit:sARNi ~ 7:1
2-XTC	2,2-Đilinoleyl-4-đimetylaminooethyl-[1,3]-dioxolan (XTC)	XTC/DPPC/Cholesterol/PEG-cDMA 57,1/7,1/34,4/1,4 lipit:sARNi ~ 7:1
LNP05	2,2-Đilinoleyl-4-đimetylaminooethyl-[1,3]-dioxolan (XTC)	XTC/DSPC/Cholesterol/PEG-DMG 57,5/7,5/31,5/3,5 lipit:sARNi ~ 6:1

- 83 -

LNP06	2,2-Dilinoleyl-4-dimethylaminoethyl-[1,3]-dioxolan (XTC)	XTC/DSPC/Cholesteol/PEG-DMG 57,5/7,5/31,5/3,5 lipit:sARNi ~ 11:1
LNP07	2,2-Dilinoleyl-4-dimethylaminoethyl-[1,3]-dioxolan (XTC)	XTC/DSPC/Cholesteol/PEG-DMG 60/7,5/31/1,5, lipit:sARNi ~ 6:1
LNP08	2,2-Dilinoleyl-4-dimethylaminoethyl-[1,3]-dioxolan (XTC)	XTC/DSPC/Cholesteol/PEG-DMG 60/7,5/31/1,5, lipit:sARNi ~ 11:1
LNP09	2,2-Dilinoleyl-4-dimethylaminoethyl-[1,3]-dioxolan (XTC)	XTC/DSPC/Cholesteol/PEG-DMG 50/10/38,5/1,5 lipit:sARNi 10:1
LNP10	(3aR,5s,6aS)-N,N-dimethyl-2,2-di((9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienyl)tetrahydro-3aH-xyclopenta[d][1,3]dioxol-5-amin (ALN100)	ALN100/DSPC/Cholesteol/PEG-DMG 50/10/38,5/1,5 lipit:sARNi 10:1
LNP11	(6Z,9Z,28Z,31Z)-heptatriaconta-6,9,28,31-tetraen-19-yl 4-(dimethylamino)butanoat (MC3)	MC-3/DSPC/Cholesteol/PEG-DMG 50/10/38,5/1,5 lipit:sARNi 10:1

- 84 -

LNP12	1,1'-(2-(4-(2-((2-(bis(2-hydroxydodecyl)amino)ethyl)(2-hydroxydodecyl)amino)ethyl)piperazin-1-yl)ethylazanediyldidodecan-2-ol (C12-200>	Tech G1/DSPC/Cholesteol/PEG-DMG 50/10/38,5/1,5 lipit:sARNi 10:1
LNP13	XTC	XTC/DSPC/Chol/PEG-DMG 50/10/38,5/1,5 lipit:sARNi: 33:1
LNP14	MC3	MC3/DSPC/Chol/PEG-DMG 40/15/40/5 lipit:sARNi: 11:1
LNP15	MC3	MC3/DSPC/Chol/PEG-DSG/GalNAc-PEG-DSG 50/10/35/4,5/0,5 lipit:sARNi: 11:1
LNP16	MC3	MC3/DSPC/Chol/PEG-DMG 50/10/38,5/1,5 lipit:sARNi: 7:1
LNP17	MC3	MC3/DSPC/Chol/PEG-DSG 50/10/38,5/1,5 lipit:sARNi: 10:1
LNP18	MC3	MC3/DSPC/Chol/PEG-DMG 50/10/38,5/1,5 lipit:sARNi: 12:1
LNP19	MC3	MC3/DSPC/Chol/PEG-DMG

- 85 -

		50/10/35/5 lipit:sARNi: 8:1
LNP20	MC3	MC3/DSPC/Chol/PEG-DPG 50/10/38,5/1,5 lipit:sARNi: 10:1
LNP21	C12-200	C12-200/DSPC/Chol/PEG-DSG 50/10/38,5/1,5 lipit:sARNi: 7:1
LNP22	XTC	XTC/DSPC/Chol/PEG-DSG 50/10/38,5/1,5 lipit:sARNi: 10:1

Các chữ viết tắt trong Bảng A bao gồm: DSPC: distearoylphosphatidylcholin; DPPC: dipalmitoylphosphatidylcholin; PEG-DMG: PEG-diđimyristoyl glyxerol (C14-PEG, hoặc PEG-C14) (PEG có khối lượng mol trung bình bằng 2000); PEG-DSG: PEG-distyryl glyxerol (C18-PEG, hoặc PEG-C18) (PEG có khối lượng mol trung bình bằng 2000); PEG-cDMA: PEG-carbamoyl-1,2-diđimystyloxypropylamin (PEG có khối lượng mol trung bình bằng 2000).

DLinDMA (1,2-Đilinolenyloxy-N,N-đimetylaminopropan) chứa chế phẩm được mô tả trong Công bố Quốc tế Số WO2009/127060, nộp ngày 15 tháng 4 năm 2009, mà được kết hợp ở đây để tham khảo.

XTC bao gồm chế phẩm được mô tả, ví dụ, trong Đơn tạm thời Mỹ số. 61/148,366, nộp ngày 29 tháng 1 năm 2009; Đơn tạm thời Mỹ số. 61/156,851, nộp ngày 2 tháng 3 năm 2009; Đơn tạm thời Mỹ số nộp ngày 10 tháng 6 năm 2009; Đơn tạm thời Mỹ số 61/228,373, nộp ngày 24 tháng 7 năm 2009; Đơn tạm thời Mỹ số 61/239,686, nộp ngày 3 tháng 9 năm 2009, và Đơn quốc tế số PCT/US2010/022614, nộp ngày 29 tháng 1 năm 2010, được kết hợp ở đây để tham khảo.

- 86 -

MC3 bao gồm các công thức được mô tả, *ví dụ*, trong Công bố đơn Mỹ số 2010/0324120, nộp ngày 10 tháng 6 năm 2010, được kết hợp ở đây để tham khảo.

ALNY-100 bao gồm chế phẩm được mô tả, *ví dụ*, Đơn sáng chế quốc tế số PCT/US09/63933, nộp ngày 10 tháng 11 năm 2009, được kết hợp ở đây để tham khảo.

C12-200 bao gồm chế phẩm như được mô tả trong Đơn tạm thời Mỹ số 61/175,770, nộp ngày 5 tháng 5 năm 2009 và Đơn quốc tế số PCT/US10/33777, nộp ngày 5 tháng 5 năm 2010, được kết hợp ở đây để tham khảo.

Chế phẩm bổ sung

i. Nhũ tương

Chế phẩm theo sáng chế có thể được điều chế và được hình thành như các nhũ tương. Nhũ tương thường là hệ thống hỗn tạp của một dịch lỏng được phân tán trong dịch lỏng khác ở dạng giọt thường có đường kính vượt quá 0,1 μm (xem *ví dụ*, Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems, Allen, LV., Popovich NG., và Ansel HC., 2004, Lippincott Williams & Wilkins (8th ed.), New York, NY; Idson, trong Pharmaceutical Dosage Forms, Lieberman, Rieger và Banker (Eds.), 1988, Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y., Tập 1, trang 199; Rosoff, trong Pharmaceutical Dosage Forms, Lieberman, Rieger và Banker (Eds.), 1988, Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y., Tập 1, trang 245; Block in Pharmaceutical Dosage Forms, Lieberman, Rieger và Banker (Eds.), 1988, Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y., Tập 2, trang 335; Higuchi và *cộng sự.*, trong Remington's Pharmaceutical Sciences, Mack Publishing Co., Easton, Pa., 1985, trang 301). Các nhũ tương thường là các hệ thống hai pha bao gồm hai pha lỏng chặt không trộn được và được phân tán với mỗi chất khác. Nói chung, các nhũ tương có thể hoặc là nước-trong-dầu (w/o) hoặc dầu-trong-nước (o/w). Khi pha nước được chia một cách tinh chế vào trong và được phân tán như các giọt ngấn vào trong pha khối dầu, thu được chế phẩm được gọi là nhũ tương nước-trong-dầu (w/o). Tùy ý, khi pha dầu là tinh chế được chia vào trong và được phân tán như các giọt ngấn vào trong khối pha nước, thu được chế phẩm được gọi là nhũ tương dầu-trong-nước (o/w). Các nhũ tương có thể chứa các thành phần bổ sung bổ sung vào các pha được phân tán, và thuốc hoạt tính mà có thể có mặt như dung dịch trong hoặc là pha nước, pha dầu hoặc mình nó như một pha riêng biệt. Tá được như chất nhũ hóa, chất ổn định, các thuốc nhuộm, và chống oxy hóa còn có thể có mặt trong các nhũ tương như cần

- 87 -

thiết. Các nhũ tương được còn có thể là nhiều nhũ tương mà bao gồm nhiều hơn hai pha như, ví dụ, trong trường hợp của các nhũ tương dầu-trong-nước-trong-dầu (o/w/o) và nước-trong-dầu-trong-nước (w/o/w). Các công thức cấu trúc kép như vậy thường mang lại các lợi thế cụ thể mà các nhũ tương nhị phân đơn giản không có. Nhiều loại nhũ tương trong đó các giọt dầu đơn của nhũ tương o/w kèm theo các giọt nước nhỏ tạo thành nhũ tương w/o/w. Như vậy hệ thống của các giọt dầu kèm theo trong các hạt cầu của nước ổn định hóa trong pha dầu liên tục cung cấp nhũ tương o/w/o.

Các nhũ tương là đặc trưng bởi tính ổn định nhiệt động thấp hoặc không có. Thông thường, được pha phân tán hoặc không liên tục của nhũ tương được phân tán tốt vào bên ngoài hoặc pha liên tục và được giữ trong dạng này thông qua các phương pháp dùng chất nhũ hóa hoặc độ nhớt của công thức. Hoặc là các pha của nhũ tương có thể là bán rắn hoặc rắn, như trường hợp của nhũ tương-dạng thuốc mỡ và kem. Các cách khác của các nhũ tương ổn định dựa trên việc sử dụng chất nhũ hóa mà có thể được hợp nhất trong các pha của nhũ tương. Các chất nhũ tương hóa có thể được phân loại rộng thành bốn loại: chất hoạt động bề mặt tổng hợp, các chất nhũ tương hóa có trong tự nhiên, bazơ hấp thụ, và chất rắn được phân tán mịn (xem ví dụ, Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems, Allen, LV., Popovich NG., và Ansel HC., 2004, Lippincott Williams & Wilkins (8th ed.), New York, NY; Idson, trong Pharmaceutical Dosage Forms, Lieberman, Rieger và Banker (Eds.), 1988, Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y., Tập 1, trang 199).

Chất hoạt động bề mặt tổng hợp, còn được gọi là chất có hoạt tính bề mặt, được phát hiện thấy là có khả năng ứng rưng rộng rãi trong chế phẩm nhũ tương và đã được xem xét trong tài liệu (xem ví dụ, Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems, Allen, LV., Popovich NG., và Ansel HC., 2004, Lippincott Williams & Wilkins (8th ed.), New York, NY; Rieger, trong Pharmaceutical Dosage Forms, Lieberman, Rieger và Banker (Eds.), 1988, Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y., Tập 1, trang 285; Idson, trong Pharmaceutical Dosage Forms, Lieberman, Rieger và Banker (Eds.), Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y., 1988, Tập 1, trang 199). Các chất hoạt tính bề mặt thường là lưỡng tính và bao gồm phần ưa nước và phần kỵ nước. Tỷ lệ của tính chất ưa nước với kỵ nước của chất hoạt tính bề mặt được gọi là cân bằng chất ưa nước/chất ưa lipid (HLB) và là dụng cụ có giá trị trong phân loại và lựa chọn các chất hoạt tính bề mặt trong chế phẩm của các

- 88 -

công thức. Chất hoạt động bề mặt có thể được phân loại thành các nhóm khác nhau dựa trên bản chất của nhóm ưa nước: không ion, anion, cation và lưỡng tính (xem ví dụ, Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems, Allen, LV., Popovich NG., và Ansel HC., 2004, Lippincott Williams & Wilkins (8th ed.), New York, NY Rieger, trong Pharmaceutical Dosage Forms, Lieberman, Rieger và Banker (Eds.), 1988, Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y., Tập 1, trang 285).

Chất nhũ hóa có trong tự nhiên được sử dụng trong công thức nhũ tương bao gồm lanolin, sáp ong, phosphatit, lecithin và keo. Bazơ hấp thụ có các tính chất ưa nước như vậy chúng có thể hút nước để hình thành các nhũ tương w/o mà vẫn giữ được tính đồng nhất bán rắn, như lanolin khan và dầu trắng ưa nước. Các chất rắn được chia tinh chế cũng được sử dụng như các chất nhũ hóa tốt đặc biệt là khi kết hợp với các chất hoạt tính bề mặt và trong chế phẩm nhót. Các bao gồm các chất rắn không hữu cơ có cực, như hydroxit kim loại nặng, đất sét không phòng như bentonit, atapulgite, hectorit, cao lanh, montmorillonit, chất keo nhôm silicat và chất keo magiê nhôm silicat, các chất màu và các chất rắn không cực như cacbon hoặc glyxeryl tristearat.

Nhiều loại nguyên liệu không nhũ tương cũng bao gồm trong công thức nhũ tương và đóng góp vào các tính chất của các nhũ tương. Chúng bao gồm mỡ, dầu, sáp, axit béo, rượu béo, este béo, chất làm ẩm, keo ưa nước, chất bảo quản và chất chống oxy hóa (Block, trong Pharmaceutical Dosage Forms, Lieberman, Rieger và Banker (Eds.), 1988, Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y., Tập 1, trang 335; Idson, trong Pharmaceutical Dosage Forms, Lieberman, Rieger và Banker (Eds.), 1988, Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y., Tập 1, trang 199).

Keo hoặc keo nước ưa nước bao gồm có trong tự nhiên và polyme tổng hợp như polysaccharit (ví dụ, keo, agar, axit alginate, caragenan, gồm guar, gồm karaya, và tragacanth), xenluloza phái sinh (ví dụ, carboxymethylxenluloza và carboxypropylxenluloza), và polyme tổng hợp (ví dụ, carbome, xenluloza ete, và polyme carboxyvinyl). Các chất phân tán hoặc phình trong nước để hình thành các dung dịch chất keo mà ổn định hóa các nhũ tương bằng cách hình thành các tấm chắc chắn giữa hai bề mặt xung quanh các giọt pha phân tán và bằng cách làm tăng độ nhớt của pha bên ngoài.

- 89 -

Khi các nhũ tương thường chứa nhiều nguyên liệu như các carbohydrat, protein, sterol và phosphatit mà có thể sẵn sàng hỗ trợ tăng trưởng các vi sinh vật, các công thức thường có các chất bảo quản. Thông thường các chất bảo quản được sử dụng bao gồm các công thức nhũ tương bao gồm methyl paraben, propyl paraben, các muối amoni bậc bốn, benzalkonium clorit, este của axit p-hydroxybenzoic, và axit boric. Chất chống oxy hóa là cũng thường được thêm vào công thức nhũ tương nhằm ngăn chặn sự hư hỏng của chế phẩm. Chất chống oxy hóa được sử dụng có thể là chất chống muối gốc tự do như tocopherol, alkyl galat, hydroxyanisol được butylat hóa, hydroxytoluen được butylat hóa, hoặc các chất khử như axit ascorbic và natri metabisulfit, và chất hiệp đồng chống oxy hóa như axit citric, axit tartaric, và lecithin.

Việc ứng dụng chế phẩm nhũ tương thông qua các đường dùng ngoài da, đường miệng và ngoài đường tiêu hóa và phương pháp sản xuất chúng đã được xem xét trong tài liệu (xem ví dụ, Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems, Allen, LV., Popovich NG., và Ansel HC., 2004, Lippincott Williams & Wilkins (8th ed.), New York, NY; Idson, trong Pharmaceutical Dosage Forms, Lieberman, Rieger và Banker (Eds.), 1988, Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y., Tập 1, trang 199). Chế phẩm nhũ tương dễ phân phối qua đường miệng đã được sử dụng rộng rãi vì dễ tạo chế phẩm, cũng như là hữu hiệu theo quan điểm về sự hấp thụ và sinh khả dụng (xem ví dụ, Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems, Allen, LV., Popovich NG., và Ansel HC., 2004, Lippincott Williams & Wilkins (8th ed.), New York, NY; Rosoff, trong Pharmaceutical Dosage Forms, Lieberman, Rieger và Banker (Eds.), 1988, Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y., Tập 1, trang 245; Idson, trong Pharmaceutical Dosage Forms, Lieberman, Rieger và Banker (Eds.), 1988, Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y., Tập 1, trang 199). Thuốc nhuận tràng gốc khoáng dầu, các vitamin tan trong dầu và chế phẩm dinh dưỡng nhiều chất béo là một trong các nguyên liệu mà đã thường được sử dụng qua đường uống như các nhũ tương o/w.

ii. Các vi nhũ tương

Theo một phương án của sáng chế, chế phẩm của các ARNi và axit nucleic được hình thành như các vi nhũ tương. Vi nhũ tương có thể được xác định là hệ thống gồm nước, dầu và chất lưỡng tính mà là dung dịch lỏng ổn định nhiệt động và tùy ý đẳng hướng đơn lẻ

(xem ví dụ, Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems, Allen, LV., Popovich NG., và Ansel HC., 2004, Lippincott Williams & Wilkins (8th ed.), New York, NY; Rosoff, trong Pharmaceutical Dosage Forms, Lieberman, Rieger và Banker (Eds.), 1988, Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y., Tập 1, trang 245). Thông thường vi nhũ tương là hệ thống được điều chế bằng cách trước hết phân tán dầu trong dung dịch chất hoạt động bề mặt trong nước và sau đó bổ sung lượng đủ của thành phần thứ tư, thường là rượu có chiều dài mạch trung bình để tạo thành hệ trong suốt. Do đó, vi nhũ tương cũng được mô tả là dịch phân tán trong đẳng hướng, ổn định về mặt nhiệt động học của hai dịch lỏng không trộn lẫn mà được làm ổn định bằng màng phân cách của phân tử có hoạt tính bề mặt (Leung và Shah, trong: Controlled Release of Drugs: Polymers and Aggregate Systems, Rosoff, M., Ed., 1989, VCH Publishers, New York, trang 185-215). Các vi nhũ tương thường được điều chế thông qua sự kết hợp của từ ba đến năm thành phần mà bao gồm dầu, nước, chất có hoạt tính bề mặt, đồng chất có hoạt tính bề mặt và chất điện giải. Vi nhũ tương thuộc loại nước-trong-dầu (w/o) hoặc dầu-trong-nước (o/w) tùy thuộc vào tính chất của dầu và chất hoạt động bề mặt được sử dụng và cấu trúc và sự đóng gói hình học của các đầu phân cực và các đuôi hydrocacbon của các phân tử chất hoạt động bề mặt (Schott, trong Remington's Pharmaceutical Sciences, Mack Publishing Co., Easton, Pa., 1985, trang 271).

Cách tiếp cận hiện tượng luận sử dụng sơ đồ pha đã được nghiên cứu bao quát và mang lại hiểu biết toàn diện, cho người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực, về việc làm thế nào để tạo chế phẩm vi nhũ tương (xem ví dụ, Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems, Allen, LV., Popovich NG., và Ansel HC., 2004, Lippincott Williams & Wilkins (8th ed.), New York, NY; Rosoff, trong Pharmaceutical Dosage Forms, Lieberman, Rieger và Banker (Eds.), 1988, Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y., Tập 1, trang 245; Block, trong Pharmaceutical Dosage Forms, Lieberman, Rieger và Banker (Eds.), 1988, Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y., Tập 1, trang 335). So với các nhũ tương thông thường, các vi nhũ tương đem lại lợi thế trong việc hòa tan các thuốc không tan trong nước trong công thức của các giọt ổn định nhiệt động mà được tạo ra một cách ngẫu nhiên.

Các chất hoạt tính bề mặt được sử dụng trong chế phẩm của các vi nhũ tương bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các chất hoạt tính bề mặt ion, các chất hoạt tính bề mặt không ion, Brij 96, polyoxyetylen oleyl ete, polyglyxerol este của axit béo, tetraglyxerol

- 91 -

monolaurat (ML310), tetraglyxerol monooleat (MO310), hexaglyxerol monooleat (PO310), hexaglyxerol pentaoleat (PO500), decaglyxerol monocaprat (MCA750), decaglyxerol monooleat (MO750), decaglyxerol sequioleat (SO750), decaglyxerol decaoleat (DAO750), đơn lẻ hoặc kết hợp với các đồng chất hoạt tính bề mặt. Đồng chất hoạt tính bề mặt, thường là rượu mạch ngắn như etanol, 1-propanol, và 1-butanol, hoạt tính để gia tăng lưu động bề mặt bằng việc thâm nhập vào trong màng chất hoạt tính bề mặt và kết quả là gây rối loạn màng bởi các khoảng trống được tạo ra giữa các phân tử chất hoạt tính bề mặt. Các vi nhũ tương có thể, tuy nhiên, được điều chế mà không sử dụng các đồng chất hoạt tính bề mặt và không có rượu tự nhũ tương hóa các hệ thống vi nhũ tương được biết đến trong lĩnh vực. Pha nước có thể thường là, nhưng không giới hạn ở, nước, dung dịch trong nước của thuốc, glyxerol, PEG300, PEG400, polyglyxerol, propylen glycol, và phái sinh của etylen glycol. Pha dầu có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nguyên liệu như Captex 300, Captex 355, Capmul MCM, este của axit béo, mono, di, và tri-glyxerit mạch trung bình (C8-C12), polyoxyetylated este của glyxeryl của axit béo, rượu béo, glyxerit được polyglycol hóa, C8-C10 glyxerit bão hòa được polyglycol hóa, dầu thực vật và dầu silicon.

Các vi nhũ tương là đặc biệt được ưa thích từ quan điểm hòa tan của thuốc và tăng sự hấp thụ của thuốc. Vi nhũ tương gốc lipit (cả o/w và w/o) đã được đề xuất làm tăng cường sinh khả dụng qua đường miệng của thuốc, bao gồm peptit (xem ví dụ, Sáng chế Mỹ số. 6,191,105; 7,063,860; 7,070,802; 7,157,099; Constantinides và cộng sự., *Pharmaceutical Research*, 1994, 11, 1385-1390; Ritschel, *Meth. Find. Exp. Clin. Pharmacol.*, 1993, 13, 205). Vi nhũ tương mang lại ưu điểm của sự hòa tan thuốc được cải thiện, sự bảo vệ thuốc khỏi sự thủy phân bằng enzym, sự tăng cường có thể có của sự hấp thụ thuốc do sự thay đổi gây ra bởi chất hoạt động bề mặt ở độ lỏng và độ thấm của màng, sự dễ dàng điều chế, sự dễ dàng dùng qua đường miệng cho các dạng liều lượng rắn, hiệu lực lâm sàng được cải thiện, và độ độc giảm (xem ví dụ, Sáng chế Mỹ số. 6,191,105; 7,063,860; 7,070,802; 7,157,099; Constantinides và cộng sự., *Pharmaceutical Research*, 1994, 11, 1385; Ho và cộng sự., *J. Pharm. Sci.*, 1996, 85, 138-143). Thường các vi nhũ tương có thể hình thành một cách ngẫu nhiên khi các thành phần của chúng được đưa vào với nhau ở nhiệt độ môi trường. Điều này có thể là đặc biệt là có lợi khi hình thành thuốc không chịu nhiệt, peptit hoặc các ARNi. Các vi nhũ tương cũng có hiệu quả trong phân phối qua da của các thành phần hoạt tính trong cả hai ứng dụng mỹ phẩm và dược. Nó được kỳ vọng là chế phẩm vi

- 92 -

nhũ tương và chế phẩm theo sáng chế sẽ tạo điều kiện tăng sự hấp thụ toàn thân của các ARNi và axit nucleic từ đường tiêu hóa, cũng như sự hấp thu tế bào khu vực của các ARNi và axit nucleic.

Các vi nhũ tương theo sáng chế còn có thể chứa bổ sung các thành phần và các phụ gia như sorbitan monostearat (Grill 3), Labrasol, và chất tăng cường sự thẩm thấu để cải thiện tích chất của công thức và để tăng hấp thụ của các ARNi và axit nucleic theo sáng chế. Chất tăng cường thẩm thấu được sử dụng trong vi nhũ tương của thể hiện sáng chế có thể được phân loại thuộc vào một trong năm loại lớn--chất hoạt động bề mặt, axit béo, muối mật, chất chelat hóa, và chất không hoạt động bề mặt không chelat hóa (Lee và cộng sự., *Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems*, 1991, trang 92). Mỗi loại này đã được đề cập ở trên.

iii. Vi hạt

Tác nhân ARNi theo sáng chế có thể được kết hợp vào trong hạt, ví dụ, vi hạt. Vi hạt có thể là tạo ra bằng cách phun sấy, nhưng có thể cũng được tạo ra bởi khác phương pháp bao gồm làm đông khô, bốc hơi, sấy tầng chất lỏng, sấy chân không, hoặc sự kết hợp của các phương pháp này.

iv. Chất tăng cường thẩm thấu

Theo một phương án, sáng chế sử dụng nhiều loại chất tăng cường thẩm thấu để tác động đến hiệu quả phân phối của axit nucleic, đặc biệt là các ARNi đối với da động vật. Đa phần thuốc có trong dung dịch đều ở dạng được ion hóa và không được ion hóa. Tuy nhiên, thường chỉ có lipid hòa tan hoặc thuốc ưa lipid là có thể vượt qua màng tế bào. Đã có các phát hiện rằng thậm chí các thuốc không ưa lipid có thể vượt qua màng tế bào nếu màng được vượt qua đó được xử lý bằng chất tăng cường thẩm thấu. Ngoài ra để hỗ trợ sự truyền của các thuốc không ưa lipid, thuốc ưa lipid vượt màng tế bào, các chất tăng cường tế bào cũng tăng cường độ thấm của các chất tăng cường thẩm thấu thuốc ưa lipid.

Chất tăng cường thẩm thấu có thể được phân loại thuộc vào một trong năm loại lớn, tức là, chất hoạt động bề mặt, axit béo, muối mật, chất chelat hóa, và chất không hoạt động bề mặt không chelat hóa (xem ví dụ, Malmsten, M. *Surfactants and polymers in drug delivery*, Informa Health Care, New York, NY, 2002; Lee và cộng sự., *Critical Reviews in*

Therapeutic Drug Carrier Systems, 1991, trang 92). Mỗi loại của các chất tăng cường thẩm thấu được nhắc đến ở trên được mô tả chi tiết hơn dưới đây.

Chất hoạt tính bề mặt (hoặc "các tác nhân hoạt tính bề mặt") là các thực thể hóa học mà, khi tan trong dung dịch trong nước, làm giảm sự căng bề mặt của dung dịch hoặc sức căng giữa các bề mặt giữa dung dịch trong nước và các chất lỏng khác, với kết quả là sự hấp thụ của ARNi thông qua màng nhầy được tăng cường. Ngoài muối mật và axit béo, các chất tăng cường thẩm thấu bao gồm, ví dụ, natri lauryl sulfat, polyoxyetylen-9-lauryl ete và polyoxyetylen-20-xetyl ete) (xem ví dụ, Malmsten, M. Surfactants and polymers in drug delivery, Informa Health Care, New York, NY, 2002; Lee và cộng sự., Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems, 1991, trang 92); và nhũ tương hóa chất flo hóa, chẳng hạn như FC-43. Takahashi và cộng sự., *J. Pharm. Pharmacol.*, 1988, 40, 252).

Nhiều loại axit béo và dẫn xuất của chúng mà có hoạt tính như các chất tăng cường thẩm thấu bao gồm, ví dụ, axit oleic, axit lauric, axit capric (axit n-decanoic), axit myristic, axit palmitic, axit stearic, axit linoleic, axit linolenic, đicaprat, tricapat, monoolein (1-monooleoyl-rac-glyxerol), đilaurin, axit caprylic, axit arachidonic, glyxerol 1-monocapat, 1-đodexylazaxycloheptan-2-on, axylcarnitin, axylcholin, C₁₋₂₀ alkyl este của chúng (ví dụ, methyl, isopropyl và t-butyl), và mono- và di-glyxerit của chúng (cụ thể là, oleat, laurat, caprat, myristat, palmitat, stearat, linoleat, v.v.) (xem ví dụ, Touitou, E., và cộng sự. Enhancement in Drug Delivery, CRC Press, Danvers, MA, 2006; Lee và cộng sự., Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems, 1991, trang 92; Muranishi, Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems, 1990, 7, 1-33; El Hariri và cộng sự., *J. Pharm. Pharmacol.*, 1992, 44, 651-654).

Vai trò sinh lý của mật bao gồm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phân tán và sự hấp thụ của lipit và vitamin hòa tan trong chất béo (xem ví dụ, Malmsten, M. Surfactants and polymers in drug delivery, Informa Health Care, New York, NY, 2002; Brunton, Chương 38 trong: Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 9th Ed., Hardman và cộng sự. Eds., McGraw-Hill, New York, 1996, trang 934-935). Nhiều loại các muối mật tự nhiên, và phái sinh tổng hợp của chúng, hoạt tính như chất tăng cường sự thẩm thấu. Do đó thuật ngữ "các muối mật" bao gồm bất kỳ các thành phần trong tự nhiên của mật cũng như bất kỳ của chất phái sinh tổng hợp của chúng. Muối mật thích hợp bao gồm, ví dụ, axit

cholic (hoặc muối natri được dùng của nó, natri cholat), axit dehydrocholic (natri dehydrocholat), axit deoxycholic (natri deoxycholat), gluaxit cholic (natri glucolat), axit glycholic (natri glycocholat), axit glycodeoxycholic (natri glycodeoxycholat), axit taurocholic (natri taurocholat), axit taurodeoxycholic (natri taurodeoxycholat), axit chenodeoxycholic (natri chenodeoxycholat), axit ursodeoxycholic (UDCA), natri tauro-24,25-dihydro-fusidat (STDHF), natri glycodihydrofusidat và polyoxyetylen-9-lauryl ete (POE) (xem ví dụ, Malmsten, M. *Surfactants and polymers in drug delivery*, Informa Health Care, New York, NY, 2002; Lee và cộng sự., *Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems*, 1991, trang 92; Swinyard, Chương 39 trong: *Remington's Pharmaceutical Sciences*, 18th Ed., Gennaro, ed., Mack Publishing Co., Easton, Pa., 1990, trang 782-783; Muranishi, *Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems*, 1990, 7, 1-33; Yamamoto và cộng sự., *J. Pharm. Exp. Ther.*, 1992, 263, 25; Yamashita và cộng sự., *J. Pharm. Sci.*, 1990, 79, 579-583).

Các chất chelat hóa, như được sử dụng trong kết nối của sáng chế, có thể được định nghĩa là hợp chất mà loại bỏ ion kim loại từ dung dịch bởi tạo thành các cấu trúc kép, với kết quả là sự hấp thụ của các ARNi thông qua niêm mạc được tăng lên. Đối với việc sử dụng chúng làm chất tăng cường thẩm thấu trong sáng chế, chất chelat hóa có ưu điểm bổ sung là cũng đáp ứng làm chất ức chế ADNaza, làm ADN nucleaza được xác định đặc điểm nhiều nhất cần ion kim loại hóa trị hai để xúc tác và do đó bị ức chế bởi chất chelat hóa (Jarrett, *J. Chromatogr.*, 1993, 618, 315-339). Chất chelat hóa thích hợp bao gồm nhưng không giới hạn ở dinatri etylendiamintetraaxetat (EDTA), axit xitric, salicylat (ví dụ, natri salixylat, 5-metoxysalixylat và homovanilat), dẫn xuất N-axyl của collagen, laureth-9 và dẫn xuất N-amino axyl của beta-diketon (enamin)(xem ví dụ, Katdare, A. và cộng sự., *Excipient development for pharmaceutical, biotechnology, and drug delivery*, CRC Press, Danvers, MA, 2006; Lee và cộng sự., *Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems*, 1991, trang 92; Muranishi, *Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems*, 1990, 7, 1-33; Buur và cộng sự., *J. Control Rel.*, 1990, 14, 43-51).

Như được dùng trong bản mô tả này, hợp chất tăng cường thẩm thấu chất không hoạt động bề mặt không chelat hóa có thể được xác định là hợp chất mà chứng tỏ hoạt tính không đáng kể làm chất chelat hóa hoặc làm chất hoạt động bề mặt nhưng tuy nhiên làm tăng

cường sự hấp thụ của iARN qua niêm mạc đường tiêu hóa (xem ví dụ, Muranishi, *Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems*, 1990, 7, 1-33). Nhóm chất tăng cường thẩm thấu này bao gồm, ví dụ, urê vòng chưa no, dẫn xuất 1-alkyl- và 1-alkenylazaxyclo-alkanon (Lee và cộng sự., *Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems*, 1991, trang 92); và chất kháng viêm không steroid chẳng hạn như diclofenac natri, indomethacin và phenylbutazon (Yamashita và cộng sự., *J. Pharm. Pharmacol.*, 1987, 39, 621-626).

Các tác nhân mà làm tăng sự hấp thụ của các ARNi ở mức độ tế bào còn có thể là bổ sung được và chế phẩm khác theo sáng chế. Ví dụ, lipit cation, chẳng hạn như lipofectin (Junichi và cộng sự, Sáng chế Mỹ số. 5,705,188), dẫn xuất glycerol cation, và phân tử polycation, chẳng hạn như polylysine (Lollo và cộng sự., Đơn PCT WO 97/30731), còn được biết là làm tăng cường sự hấp thụ tế bào của dsARN. Các ví dụ về chất phản ứng chuyển nạp có trên thị trường bao gồm, ví dụ Lipofectamine™ (Invitrogen; Carlsbad, CA), Lipofectamine 2000™ (Invitrogen; Carlsbad, CA), 293fectin™ (Invitrogen; Carlsbad, CA), Cellfectin™ (Invitrogen; Carlsbad, CA), DMRIE-C™ (Invitrogen; Carlsbad, CA), FreeStyle™ MAX (Invitrogen; Carlsbad, CA), Lipofectamine™ 2000 CD (Invitrogen; Carlsbad, CA), Lipofectamine™ (Invitrogen; Carlsbad, CA), ARNiMAX (Invitrogen; Carlsbad, CA), Oligofectamine™ (Invitrogen; Carlsbad, CA), Optifect™ (Invitrogen; Carlsbad, CA), Chất phản ứng Chuyển nạp X-tremeGENE Q2 (Roche; Grenzacherstrasse, Thụy Sĩ), Chất phản ứng Chuyển nạp Liposom DOTAP (Grenzacherstrasse, Thụy Sĩ), Chất phản ứng Chuyển nạp Liposom DOSPER (Grenzacherstrasse, Thụy Sĩ), hoặc Eugene (Grenzacherstrasse, Thụy Sĩ), Chất phản ứng Transfectam® (Promega; Madison, WI), Chất phản ứng Chuyển nạp TransFast™ (Promega; Madison, WI), Chất phản ứng Tfx™-20 (Promega; Madison, WI), Chất phản ứng Tfx™-50 (Promega; Madison, WI), DreamFect™ (OZ Biosciences; Marseille, Pháp), EcoTransfect (OZ Biosciences; Marseille, Pháp), Chất phản ứng Chuyển nạp TransPass^a D1 (New England Biolabs; Ipswich, MA, Mỹ), LyoVec™/LipoGen™ (Invitrogen; San Diego, CA, Mỹ), Chất phản ứng Chuyển nạp PerFectin (Genlantis; San Diego, CA, Mỹ), Chất phản ứng Chuyển nạp NeuroPORTER (Genlantis; San Diego, CA, Mỹ), Chất phản ứng Chuyển nạp GenePORTER (Genlantis; San Diego, CA, Mỹ), Chất phản ứng Chuyển nạp GenePORTER 2 (Genlantis; San Diego, CA, Mỹ), Chất phản ứng Chuyển nạp Cytofectin (Genlantis; San Diego, CA, Mỹ), Chất phản ứng Chuyển nạp BaculoPORTER (Genlantis; San Diego, CA, Mỹ), Chất phản ứng Chuyển

- 96 -

nạp TroganPORTER™ (Genlantis; San Diego, CA, Mỹ), RiboFect (Bioline; Taunton, MA, Mỹ), PlasFect (Bioline; Taunton, MA, Mỹ), UniFECTOR (B-Bridge International; Mountain View, CA, Mỹ), SureFECTOR (B-Bridge International; Mountain View, CA, Mỹ), hoặc HiFect™ (B-Bridge International, Mountain View, CA, Mỹ), trong số các chất khác.

Các tác nhân có thể được sử dụng để tăng sự thẩm thấu của axit nucleic được sử dụng, bao gồm glycol như etylen glycol và propylen glycol, pyrol như 2-pyrol, azon, và terpen như là limonen và menthon.

v. Chất mang

Một số chất tổng hợp của sáng chế cũng kết hợp với hợp chất mang trong chế phẩm. Như được sử dụng ở đây, “hợp chất mang” hoặc “chất mang” có thể là axit nucleic, hoặc chất tương tự mà trở (cụ thể là, không có hoạt tính sinh học về bản chất) nhưng được công nhận là axit nucleic bởi các quá trình *trong cơ thể* mà làm giảm tính sinh học của axit nucleic có hoạt tính sinh học bằng cách, ví dụ, làm suy thoái axit nucleic hoạt tính sinh học hoặc thúc đẩy loại bỏ nó khỏi sự tuần hoàn. Việc đồng sử dụng axit nucleic và hợp chất mang, điển hình là với lượng dư của chất thứ hai, có thể dẫn đến việc giảm đáng kể lượng axit nucleic được phục hồi lại trong gan, thận hoặc phần chứa ngoài lưu thông, được cho là do sự cạnh tranh giữa các hợp chất mang và axit nucleic cho thụ thể chung. Ví dụ, việc thu hồi của dsARN phosphorothioat một phần ở mô gan có thể được giảm đi khi nó được đồng sử dụng với axit polyinosinic, dextran sulfat, axit polyxytidic hoặc axit 4-axetamido-4'isothioxyano-stilben-2,2'-disulfonic (Miyao và cộng sự., DsRNA Res. Dev., 1995, 5, 115-121; Takakura và cộng sự., DsRNA & Nucl. Acid Drug Dev., 1996, 6, 177-183).

vi. Tá dược

Ngược lại với hợp chất mang, một “chất mang dược” hoặc “tá dược” là một dung môi dược dụng, tác nhân ngưng tụ chất chuyển dược khác để chuyển một hoặc nhiều axit nucleic của động vật. Tá dược có thể ở dạng lỏng hoặc rắn và được lựa chọn, với các cách sử dụng đã được lên kế hoạch trong đầu, để đáp ứng được phần lớn mong muốn, nhất quán, v.v., khi được kết hợp với một axit nucleic và các thành phần khác của một thành phần dược nhất định. Thông thường các chất mang dược bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các tác nhân liên kết (ví dụ, tinh bột ngô được tiền gelatin hóa, polyvinylpyrrolidon hoặc

hydroxypropyl metylxenluloza, v. v.); các chất làm đặc (ví dụ, lactoza và các đường khác, xenluloza vi tinh thể, pectin, gelatin, canxi sulfat, etyl xenluloza, polyacrylat hoặc canxi hydro phosphat, v.v.); các chất bôi trơn (ví dụ, magiê stearat, bột talc, silic oxit, chất keo silicon đioxit, axit stearic, stearat kim loại, các dầu thực vật được hydro hóa, bột ngô, polyetylen glycol, natri benzoat, natri axetat, v.v.); chất phân rã (ví dụ, tinh bột, natri tinh bột glycolat, v.v.); và các tác nhân làm ẩm (ví dụ, natri lauryl sulfat, v.v.).

Các tá dược hữu cơ hoặc vô cơ có thể chấp nhận được thích hợp với việc sử dụng bên ngoài mà không phản ứng độc với axit nucleic có thể được sử dụng để xây dựng các chế phẩm theo sáng chế. Các dược chất mang thích hợp bao gồm, nhưng không giới hạn ở nước, muối, rượu, polyetylen glycol, gelatin, lactoza, amylaza, magiê stearat, bột talc, axit silic, parafin nhớt, hydroxymetylxenluloza, polyvinylpyrrolidon và các chất tương tự.

Các chế phẩm để sử dụng axit nucleic cục bộ có thể bao gồm thuốc nước tiệt trùng hoặc không được tiệt trùng, thuốc không chứa nước trong các dung môi phổ biến như rượu, hoặc dung dịch của axit nucleic trong các dạng dầu lỏng hoặc rắn. Các dung dịch này cũng có thể chứa chất đệm, chất pha loãng và các chất phụ gia khác. Các tá dược hữu cơ hoặc vô cơ chấp nhận được thích hợp với việc sử dụng bên ngoài mà không phản ứng độc hại với axit nucleic có thể được sử dụng.

Các tá dược thích hợp chấp nhận được bao gồm, nhưng không giới hạn ở nước, dung dịch muối, rượu, polyetylen glycol, gelatin, lactoza, amyloza, magiê stearat, bột talc, axit silic, màng parafin nhớt, hydroxymetylxenluloza, polyvinylpyrrolidon và các chất tương tự.

vii. Các thành phần khác

Các chế phẩm theo sáng chế có thể chứa thêm các thành phần phụ khác vẫn thường được tìm thấy trong dược phẩm, ở các mức sử dụng được đặt sẵn trong lĩnh vực. Do đó, ví dụ, chế phẩm có thể chứa thêm các nguyên liệu dược tương thích các nguyên liệu hoạt tính dược như, ví dụ, thuốc trị ngứa, chất làm se da, thuốc gây tê tại chỗ hoặc tác nhân chống viêm, hoặc có thể chứa các nguyên liệu bổ sung hữu dụng trong việc tạo dạng vật lý nhiều loại liều của chế phẩm theo sáng chế, như là thuốc nhuộm, các tác nhân hương liệu, chất bảo quản, chất chống oxy hóa, các chất làm mờ, các chất làm đặc và chất ổn định. Tuy nhiên, các nguyên liệu đó, khi được thêm vào, không được can thiệp quá mức vào các hoạt tính sinh học của các thành phần chế phẩm theo sáng chế. Các công thức có thể được khử trùng

và, nếu muốn, trộn với các tác nhân phụ trợ, *ví dụ*, chất bôi trơn, chất bảo quản, chất ổn định, chất làm ẩm, chất chuyển thể sữa, muối để tác động đến áp suất thẩm lọc, chất đệm, phẩm màu, gia vị và/hoặc chất thơm và các chất giống vậy mà không gây hại đến (các) axit nucleic trong chế phẩm.

Huyền phù trong nước có thể chứa các chất làm tăng độ nhớt của huyền phù bao gồm, *ví dụ*, natri carboxymetyl xenluloza, sorbitol và/hoặc dextran. Huyền phù còn có thể chứa chất ổn định.

Theo một số phương án, dược phẩm được nêu trong sáng chế bao gồm (a) một hoặc nhiều hợp chất iARN và (b) một hoặc nhiều tác nhân mà hoạt động theo cơ chế không ARNi và hữu dụng trong việc điều trị, *ví dụ*, PH1.

Thử nghiệm dược phẩm

Độc tính và hiệu quả điều trị của các hợp chất trên có thể được xác định bởi các thủ tục dược tiêu chuẩn trong nuôi cấy tế bào hoặc thực nghiệm trên động vật, *ví dụ*, để xác định LD50 (liều thuốc gây chết người đối với 50% dân số) và ED50 (liều thuốc điều trị hiệu quả đối với 50% dân số). Tỷ lệ liều lượng giữa các hiệu ứng độc hại và điều trị là chỉ số điều trị và nó có thể được thể hiện bằng tỉ lệ LD50/ED50. Các hợp chất mà có chỉ số điều trị cao được ưa thích.

Các dữ liệu thu được từ các thử nghiệm nuôi cấy tế bào và nghiên cứu động vật có thể được dùng để xây dựng một loạt các liều lượng sử dụng cho con người. Liều lượng của các hợp chất được mô tả ở đây trong sáng chế nằm chung trong khoảng nồng độ có ED50 và một chút hoặc không có độc. Liều dùng có thể thay đổi trong phạm vi này phụ thuộc vào công thức liều lượng được sử dụng và con đường sử dụng chúng. Đối với bất kỳ hợp chất nào được sử dụng trong các phương pháp theo sáng chế, liều lượng điều trị hiệu quả có thể được đánh giá ngay từ đầu với các thử nghiệm nuôi cấy tế bào. Liều dùng có thể được bào chế trong các mô hình động vật để đạt được khoảng nồng độ lưu thông trong huyết tương của hợp chất hoặc, khi thích hợp, của sản phẩm polypeptit của trình tự đích (*ví dụ*, đạt được nồng độ giảm của polypeptit) bao gồm IC₅₀ (*tức là*, nồng độ của hợp chất thử nghiệm đạt được triệu chứng ức chế tối đa) như được xác định trong nuôi cấy tế bào. Các thông tin trên có thể sử dụng để xác định chính xác hơn các liều lượng hữu ích cho con người. Mức độ trong huyết tương có thể được đo lường, *ví dụ*, bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao.

Ngoài việc sử dụng chúng, như thảo luận ở trên, iARN được nêu trong sáng chế có thể được dùng kết hợp với các tác nhân đã biết khác hữu hiệu để điều trị quy trình bệnh lý mà qua trung gian lượng quá tải sắt và có thể được điều trị bằng cách ức chế sự biểu hiện HAO1. Trong bất kỳ trường hợp nào, bác sĩ điều trị có thể điều chỉnh số lượng và thời gian sử dụng ARNi dựa trên các kết quả thu được bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn đo lường hiệu quả được biết đến trong lĩnh vực hoặc được mô tả trong tài liệu này.

V. Phương pháp ức chế sự biểu hiện HAO1

Sáng chế đề xuất phương pháp ức chế sự biểu hiện của HAO1 (hydroxyaxit oxidaza 1) trong tế bào. Phương pháp này bao gồm bước cho tế bào tiếp xúc với tác nhân ARNi, ví dụ, tác nhân ARNi sợi kép, ở lượng hữu hiệu để ức chế sự biểu hiện của HAO1 trong tế bào, bằng cách đó ức chế sự biểu hiện của HAO1 trong tế bào.

Sự tiếp xúc của tế bào với tác nhân ARNi sợi kép có thể được thực hiện *trong ống nghiệm* hoặc *trong cơ thể*. Sự tiếp xúc tế bào *trong cơ thể* với tác nhân ARNi bao gồm việc cho tế bào hoặc nhóm tế bào ở đối tượng, ví dụ, đối tượng người, tiếp xúc với tác nhân ARNi. Sự kết hợp của các phương pháp *in vitro* và *in vivo* để cho tiếp xúc cũng có thể được. Sự tiếp xúc có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp, như thảo luận ở trên. Hơn nữa, sự tiếp xúc tế bào có thể được hoàn thành thông qua một phối tử nhắm đích, bao gồm bất kỳ phối tử nào được mô tả ở đây hoặc được biết đến trong lĩnh vực. Theo một số phương án, phối tử hướng đích là gốc carbohydrat, ví dụ, phối tử GalNAc₃, hoặc phối tử khác bất kỳ mà định hướng tác nhân ARNi đến vị trí quan tâm, ví dụ, gan của đối tượng.

Thuật ngữ "ức chế," như được sử dụng ở đây, được sử dụng thay đổi với "làm giảm," "làm câm," "sự điều hòa giảm" và các thuật ngữ tương tự khác, và bao gồm bất kỳ mức độ nào của sự ức chế.

Cụm từ "ức chế sự biểu hiện của HAO1" được dự định là dùng để chỉ sự ức chế của sự biểu hiện của gen HAO1 bất kỳ (chẳng hạn như, ví dụ, gen HAO1 ở chuột, gen HAO1 ở chuột nhắt, gen HAO1 ở khỉ, hoặc gen HAO1 ở người) cũng như là các biến thể hoặc các thể đột biến của gen HAO1. Do đó, gen HAO1 có thể là gen HAO1 kiểu dại, gen HAO1 đột biến, hoặc gen HAO1 chuyển gen trong trường hợp tế bào, nhóm tế bào, hoặc sinh vật được thao tác di truyền.

"Ức chế sự biểu hiện của gen HAO1" bao gồm mức độ bất kỳ của sự ức chế của gen HAO1, *ví dụ*, ít nhất sự triệt tiêu một phần của sự biểu hiện của gen HAO1. Sự biểu hiện của gen HAO1 có thể được đánh giá dựa trên mức độ, hoặc sự thay đổi trong mức độ, của biến thể bất kỳ kết hợp với sự biểu hiện gen HAO1, *ví dụ*, hàm lượng mRNA HAO1, hàm lượng protein HAO1. Mức độ này có thể được đánh giá trong một tế bào riêng biệt hoặc trong một nhóm tế bào, bao gồm, *ví dụ*, một mẫu thử được lấy từ đối tượng.

Sự ức chế có thể được đánh giá bằng sự giảm đi của hàm lượng tuyệt đối hoặc tương đối của một hoặc nhiều biến thể mà kết hợp với sự biểu hiện HAO1 so với mức độ đối chứng. Mức độ kiểm soát có thể là bất kỳ loại nào của mức độ kiểm soát được sử dụng trong lĩnh vực, *ví dụ*, một mức cơ bản trước khi dùng thuốc, hoặc mức được xác định từ đối tượng, tế bào tương tự, hoặc mẫu chưa được xử lý hoặc được xử lý với kiểm soát (như, *ví dụ* chỉ kiểm soát đệm hoặc kiểm soát tác nhân bất hoạt).

Theo một số phương án của phương pháp theo sáng chế, sự biểu hiện của gen HAO1 bị ức chế bằng ít nhất là khoảng 5%, ít nhất là khoảng 10%, ít nhất là khoảng 15%, ít nhất là khoảng 20%, ít nhất là khoảng 25%, ít nhất là khoảng 30%, ít nhất là khoảng 35%, ít nhất là khoảng 40%, ít nhất là khoảng 45%, ít nhất là khoảng 50%, ít nhất là khoảng 55%, ít nhất là khoảng 60%, ít nhất là khoảng 65%, ít nhất là khoảng 70%, ít nhất là khoảng 75%, ít nhất là khoảng 80%, ít nhất là khoảng 85%, ít nhất là khoảng 90%, ít nhất là khoảng 91%, ít nhất là khoảng 92%, ít nhất là khoảng 93%, ít nhất là khoảng 94%, ít nhất là khoảng 95%, ít nhất là khoảng 96%, ít nhất là khoảng 97%, ít nhất là khoảng 98%, hoặc ít nhất là khoảng 99%.

Sự ức chế của sự biểu hiện của gen HAO1 có thể được biểu thị bằng sự giảm đi của hàm lượng của mRNA được biểu hiện bởi tế bào hoặc nhóm tế bào thứ nhất (tế bào này có thể có mặt, *ví dụ*, trong mẫu có nguồn gốc từ đối tượng) trong đó gen HAO1 được phiên mã và được xử lý (*ví dụ*, bằng cách cho tế bào hoặc các tế bào tiếp xúc với tác nhân ARNi theo sáng chế, hoặc bằng cách dùng tác nhân ARNi theo sáng chế cho đối tượng trong đó tế bào này có mặt) sao cho sự biểu hiện của gen HAO1 bị ức chế, khi so với tế bào hoặc nhóm tế bào thứ hai về cơ bản giống với tế bào hoặc nhóm tế bào thứ nhất nhưng mà không được xử lý như vậy ((các) tế bào đối chứng). Theo một số phương án, sự ức chế được đánh giá bằng cách biểu diễn hàm lượng của mRNA trong tế bào được xử lý dưới dạng tỷ lệ phần trăm của hàm lượng của mRNA trong tế bào đối chứng, bằng cách sử dụng công thức sau đây:

- 101 -

$$\frac{(\text{mARN ở tế bào đối chứng}) - (\text{mARN ở tế bào được xử lý})}{(\text{mARN ở tế bào đối chứng})} \cdot 100\%$$

Theo cách khác, sự ức chế của sự biểu hiện của gen HAO1 có thể được đánh giá trong mối quan hệ với sự giảm đi của tham số mà có liên kết về mặt chức năng với sự biểu hiện gen HAO1, *ví dụ*, sự biểu hiện protein HAO1. Việc làm câm gen HAO1 có thể được xác định trong tế bào bất kỳ có biểu hiện HAO1, về mặt cấu trúc hoặc bằng cách thiết kế hệ gen, và bằng thử nghiệm bất kỳ đã biết trong lĩnh vực. Gan là vị trí chính của sự biểu hiện HAO1. Các nơi khác mà gen HAO1 cũng biểu hiện đáng kể là thận và dạ con.

Sự ức chế của sự biểu hiện của protein HAO1 có thể được biểu thị bằng sự giảm đi của hàm lượng của protein HAO1 mà được biểu hiện bởi tế bào hoặc nhóm tế bào (*ví dụ*, hàm lượng của protein được biểu hiện trong mẫu có nguồn gốc từ đối tượng). Như đã giải thích ở trên đối với sự đánh giá của sự triệt tiêu mARN, sự ức chế của mức độ biểu hiện protein ở tế bào hoặc nhóm tế bào được xử lý được biểu diễn một cách tương tự dưới dạng tỷ lệ phần trăm của hàm lượng của protein ở tế bào hoặc nhóm tế bào đối chứng.

Tế bào hoặc nhóm tế bào đối chứng mà có thể được sử dụng để đánh giá sự ức chế của sự biểu hiện của gen HAO1 bao gồm tế bào hoặc nhóm tế bào mà chưa được tiếp xúc với tác nhân ARNi theo sáng chế. Ví dụ, tế bào hoặc nhóm tế bào điều khiển có thể được lấy từ từng đối tượng (*ví dụ*, đối tượng là người hoặc động vật) trước khi điều trị cho đối tượng bằng một tác nhân ARNi.

Hàm lượng của mARN HAO1 mà được biểu hiện bởi tế bào hoặc nhóm tế bào có thể được xác định bằng cách sử dụng phương pháp bất kỳ đã biết trong lĩnh vực để đánh giá sự biểu hiện mARN. Theo một phương án, mức độ của sự biểu hiện của HAO1 trong mẫu được xác định bằng cách phát hiện polynucleotit được phiên mã, hoặc một phần của chúng, *ví dụ*, mARN của gen HAO1. ARN có thể được chiết xuất từ các tế bào bằng cách sử dụng kỹ thuật chiết xuất ARN bao gồm, ví dụ, sử dụng chiết xuất axit phenol/guanidin isotioxyanat (RNAzol B; Biogenesis), bộ kit điều chế ARN RNeasy (Qiagen) hoặc PAXgene (PreAnalytix, Thụy Sĩ). Các dạng thử nghiệm điển hình sử dụng sự lai hóa axit ribonucleic bao gồm thử nghiệm chạy nhân, RT-PCR, thử nghiệm bảo vệ ARNaza (Melton và cộng sự., *Nuc. Acids Res.* 12:7035), thẩm tách Northern, sự lai hóa *in situ*, và phân tích vi mảng.

- 102 -

Theo một phương án, mức độ của sự biểu hiện của HAO1 được xác định bằng cách sử dụng đoạn dò axit nucleic. Thuật ngữ "đoạn dò", như được dùng trong bản mô tả này, dùng để chỉ phân tử bất kỳ mà có khả năng liên kết có chọn lọc với HAO1 cụ thể. Đoạn dò có thể được tổng hợp bằng một trong các kỹ năng trong lĩnh vực, hoặc có từ các chế phẩm sinh học thích hợp. Các đoạn dò có thể được cấu tạo đặc biệt để được gắn nhãn. Các ví dụ về các phân tử có thể được sử dụng như đoạn dò, bao gồm nhưng không giới hạn ARN, ADN, protein, các kháng thể, và các phân tử hữu cơ.

Sự phân lập mARN có thể được sử dụng trong các thử nghiệm lai tạo hoặc khuếch đại nhưng không giới hạn ở các phân tích Southern hoặc Northern, phân tích phản ứng chuỗi polymeraza (PCR) và mảng đầu dò. Phương pháp khác để xác định hàm lượng mARN bao gồm bước cho mARN đã được phân lập tiếp xúc với phân tử axit nucleic (đoạn dò) mà có thể lai hóa với mARN HAO1. Theo một phương án, mARN được giữ cố định trên một mặt phẳng rắn và tiếp xúc với một đoạn dò, ví dụ bằng cách chạy mARN được phân lập trên gel agarosa và chuyển mARN từ chất gel đó tới màng, như nitrocellulose. Trong một phương án khác, (các) đoạn dò được gắn cố định trên một mặt phẳng rắn và mARN được tiếp xúc với (các) đoạn dò, ví dụ, trong gen chip Affymetrix. Người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực có thể dễ dàng điều chỉnh phương pháp phát hiện mARN đã biết để sử dụng trong việc xác định hàm lượng của mARN HAO1.

Phương pháp khác để xác định mức độ của sự biểu hiện của HAO1 trong mẫu bao gồm quy trình khuếch đại axit nucleic và/hoặc transcriptaza ngược (để điều chế cADN) của ví dụ như mARN trong mẫu, ví dụ, bằng RT-PCR (phương án thí nghiệm nêu trong Mullis, 1987, Sáng chế Mỹ số. 4,683,202), phản ứng chuỗi ligaza (Barany (1991) *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 88:189-193), sự sao chép trình tự tự duy trì (Guatelli và cộng sự. (1990) *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 87:1874-1878), hệ thống khuếch đại phiên mã (Kwoh và cộng sự. (1989) *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 86:1173-1177), Q-Beta Replicaza (Lizardi và cộng sự. (1988) *Bio/Technology* 6:1197), sự sao chép vòng lăn (Lizardi và cộng sự., Sáng chế Mỹ số. 5,854,033) hoặc phương pháp khuếch đại axit nucleic khác bất kỳ, sau đó là sự phát hiện của phân tử được khuếch đại bằng cách sử dụng các kỹ thuật đã biết rõ đối với người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực. Các sơ đồ phát hiện này đặc biệt hữu dụng cho việc phát hiện các phân tử axit nucleic nếu các phân tử đo xuất hiện với số lượng rất ít. Theo khía

cạnh cụ thể của sáng chế, mức độ của sự biểu hiện của HAO1 được xác định bằng RT-PCR phát huỳnh quang định lượng (*tức là*, Hệ thống TaqMan™).

Mức độ biểu hiện của mARN HAO1 có thể được theo dõi bằng các sử dụng thử tách màng chẳng hạn như dùng trong phân tích lai hóa chẳng hạn như Northern, Southern, vẽ chấm, và phương pháp tương tự, hoặc vi giếng, ống mẫu, gel, hạt hoặc sợi (hoặc giá đỡ rắn bất kỳ có chứa axit nucleic được liên kết). Xem Sáng chế Mỹ Số. 5,770,722, 5,874,219, 5,744,305, 5,677,195 và 5,445,934, được kết hợp ở đây để tham khảo. Việc xác định mức độ biểu hiện HAO1 cũng có thể bao gồm việc sử dụng đoạn dò axit nucleic trong dung dịch.

Theo một số phương án, mức độ của sự biểu hiện mARN được đánh giá bằng cách sử dụng thử nghiệm ADN phân nhánh (bADN) hoặc PCR thời gian thực (qPCR). Sử dụng phương pháp được mô tả và lấy ví dụ trong các Ví dụ ở đây.

Mức độ biểu hiện protein HAO1 có thể được xác định bằng cách sử dụng phương pháp bất kỳ đã biết trong lĩnh vực để đo hàm lượng protein. Các phương pháp đó bao gồm, ví dụ, hiện tượng điện chuyển, mao mạch điện, chất lỏng sắc ký hiệu suất cao (HPLC), lớp mỏng sắc ký (TLC), sắc ký siêu khuếch tán, các phản ứng chất lỏng hoặc gel, hấp thụ quang phổ, thử nghiệm đo màu, thử nghiệm quang phổ, đo dòng tế bào, khuếch tán miễn dịch (đơn hoặc đôi), phản ứng miễn dịch điện di, phương pháp Western blot, miễn dịch phóng xạ (RIA), thử nghiệm miễn dịch enzym liên kết (ELISA), thử nghiệm miễn dịch huỳnh quang, thử nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang, và tương tự.

Thuật ngữ “mẫu thử” như được sử dụng ở đây đề cập đến tập hợp các chất lỏng, tế bào hoặc mô tương tự nhau được phân lập khỏi đối tượng cũng như các chất lỏng, các tế bào hoặc mô hiện ở trên đối tượng. Ví dụ về chất lỏng sinh học bao gồm máu, huyết thanh và nước ối, huyết tương, bạch huyết, nước tiểu, dịch não tủy, nước bọt, tuyến lệ, và tương tự. Mẫu mô có thể bao gồm mẫu từ các mẫu mô, bộ phận hoặc các vùng được chọn. Ví dụ, các mẫu thử có thể được lấy từ các bộ phận đặc biệt, một phần của các bộ phận đó, hoặc chất lỏng hoặc các tế bào của các bộ phận đó. Trong một số phương án nhất định, các mẫu thử có thể được lấy từ gan (ví dụ, toàn bộ gan hoặc một số đoạn của gan hoặc một số loại tế bào trong gan, như, ví dụ, tế bào gan). Theo một số phương án, “mẫu có nguồn gốc từ đối tượng” dùng để chỉ máu hoặc huyết tương được rút ra từ đối tượng. Ở các phương án khác, một “mẫu thử lấy từ đối tượng” có nghĩa là lấy mô gan từ đối tượng.

- 104 -

Theo một số phương án của phương pháp theo sáng chế, tác nhân iARN được sử dụng cho đối tượng như tác nhân ARNi được đưa đến một nơi đặc biệt của đối tượng. Sự ức chế của sự biểu hiện của HAO1 có thể được đánh giá bằng cách sử dụng các phép đo của hàm lượng hoặc sự thay đổi trong hàm lượng của mRNA HAO1 hoặc protein HAO1 trong mẫu có nguồn gốc từ dịch hoặc mô từ vị trí cụ thể ở đối tượng. Theo một số phương án, vị trí này là gan. Nơi được chọn cũng có thể là tiểu khu hoặc tiểu nhóm tế bào từ bất kỳ nơi nào nằm trong các nơi đã được nhắc đến ở trên. Nơi được chọn cũng có thể bao gồm các tế bào thể hiện loại thụ thể đặc biệt.

VI. Phương pháp điều trị hoặc ngăn ngừa rối loạn có kết hợp với HAO1

Sáng chế cũng đề xuất phương pháp để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh và tình trạng bệnh mà có thể được điều biến bởi sự biểu hiện gen HAO1. Ví dụ, hợp phân được mô tả trong bản mô tả này có thể được dùng để điều trị rối loạn bất kỳ kết hợp với PH1.

Hiệu quả của điều trị hoặc phòng ngừa bệnh có thể được đánh giá, ví dụ bằng cách đo sự tiến triển của bệnh, sự thuyên giảm của bệnh, mức độ nghiêm trọng của triệu chứng, sự giảm đau, chất lượng cuộc sống, liều thuốc cần thiết để duy trì hiệu quả điều trị, mức độ của chất đánh dấu bệnh hoặc thông số có thể đo thích hợp cho bệnh đang được điều trị hoặc đang được hướng đến để phòng ngừa. Điều này là đơn giản trong khả năng của một người có trình độ trong lĩnh vực để theo dõi hiệu quả của việc điều trị hoặc ngăn ngừa bằng việc đo các thông số đó, hoặc bất kỳ sự kết hợp của các thông số.

Hiệu quả điều trị hoặc phòng ngừa là điều hiển nhiên khi có sự cải thiện có ý nghĩa thống kê về một hoặc nhiều tham số về tình trạng bệnh, hoặc bởi sự thất bại dẫn đến tình trạng trở nên tồi tệ hơn hoặc phát triển các triệu chứng ở nơi mà chúng không được lường trước. Ví dụ, sự thay đổi tốt ít nhất 10% ở tham số đo được của bệnh, và tốt hơn là ít nhất 20%, 30%, 40%, 50% hoặc hơn có thể được chỉ định cho điều trị hiệu quả. Sự hiệu quả của thuốc cho ARNi hoặc công thức của thuốc đó còn có thể được đánh giá bằng cách sử dụng mô hình động vật thử nghiệm đối với bệnh được biết đến trong lĩnh vực. Khi sử dụng mô hình động vật thử nghiệm, hiệu quả điều trị được chứng minh khi có sự giảm có ý nghĩa thống kê ở chất đánh dấu hoặc triệu chứng được quan sát thấy.

Theo cách khác, hiệu quả này có thể được đo bằng sự giảm độ trầm trọng của bệnh như được xác định bởi người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực chẩn đoán dựa trên thang điểm độ trầm trọng của bệnh chấp nhận được về mặt lâm sàng.

Theo một số phương án của phương pháp theo sáng chế, sự biểu hiện HAO1 được giảm đi trong khoảng thời gian kéo dài, *ví dụ*, ít nhất một tuần, hai tuần, ba tuần, hoặc bốn tuần hoặc lâu hơn. Ví dụ, trong các trường hợp nhất định, sự biểu hiện của gen HAO1 bị triệt tiêu đi ít nhất là khoảng 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 98%, hoặc 100% bằng cách sử dụng tác nhân iARN được mô tả trong bản mô tả này. Theo một số phương án, gen HAO1 bị triệt tiêu đi ít nhất là khoảng 60%, 70%, hoặc 80% bằng cách sử dụng tác nhân iARN. Theo một số phương án, gen HAO1 bị triệt tiêu đi ít nhất là khoảng 85%, 90%, hoặc 95% bằng cách sử dụng oligonucleotit mạch kép. Theo phương án khác, gen HAO1 vẫn bị triệt tiêu trong 7 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, hoặc lâu hơn sau khi sử dụng.

Sử dụng

Các tác nhân ARNi theo sáng chế có thể được dùng cho đối tượng bằng cách sử dụng đường dùng bất kỳ được biết trong lĩnh vực này, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở dưới da, trong tĩnh mạch, trong cơ, trong lòng mạch, trong cuống phổi, trong màng phổi, trong màng bụng, trong động mạch, bạch huyết, não tủy và dạng kết hợp bất kỳ của chúng. Theo một số phương án, các tác nhân được dùng dưới da.

Theo một số phương án, việc dùng này là qua đường tiêm vào bể chứa. Việc tiêm vào bể chứa có thể giải phóng tác nhân ARNi theo cách đồng nhất qua một thời gian kéo dài. Do đó, việc tiêm vào bể chứa có thể làm giảm tần suất dùng liều lượng cần để đạt được hiệu quả mong muốn, *ví dụ*, sự ức chế mong muốn của HAO1, hoặc hiệu quả trị liệu hoặc dự phòng. Một mũi tiêm cũng có thể cung cấp huyết thanh nồng độ cao. Các mũi tiêm có thể bao gồm tiêm dưới da hoặc tiêm vào cơ. Theo một số phương án, việc tiêm vào bể chứa là tiêm dưới da.

Theo một số phương án, việc dùng này là qua bơm. Bơm có thể là bơm bên ngoài hoặc bơm được phẫu thuật cấy ghép. Trong một số phương án nhất định, bơm là loại bơm thẩm thấu được cấy dưới da. Trong các phương án khác, bơm là loại máy bơm truyền dịch. Bơm có thể được sử dụng để tiêm tĩnh mạch, tiêm dưới da, động mạch hoặc tiêm truyền

- 106 -

ngoài màng cứng. Theo một số phương án, bơm truyền là bơm truyền dưới da. Theo các phương án khác, bơm này là bơm được cấy thông qua phẫu thuật phân phối tác nhân ARNi đến gan.

Các cách sử dụng khác bao gồm ngoài màng cứng, trong não, trong não thất, sử dụng trong mũi, trong động mạch, trong tim, truyền trong xương, nội tủy mạch, và trong thủy tinh thể, và phổi. Các chế độ sử dụng có thể được chọn dựa trên việc điều trị cục bộ hay toàn thân là mong muốn hay dựa trên vùng được điều trị nào. Lộ trình và vị trí của việc sử dụng có thể được chọn để tăng việc nhắm mục tiêu.

Phương pháp này bao gồm bước sử dụng tác nhân iARN, *ví dụ*, liều lượng đủ để làm giảm hàm lượng của mRNA HAO1 trong ít nhất 5, nhiều tốt hơn là 7, 10, 14, 21, 25, 30 hoặc 40 ngày; và một cách tùy ý, sử dụng liều lượng đơn lẻ thứ hai của dsARN, trong đó liều lượng đơn lẻ thứ hai này được dùng ít nhất 5, nhiều tốt hơn là 7, 10, 14, 21, 25, 30 hoặc 40 ngày sau khi liều lượng đơn lẻ thứ nhất được dùng, bằng cách đó ức chế sự biểu hiện của gen HAO1 ở đối tượng.

Theo một phương án, các liều lượng tác nhân iARN theo sáng chế được dùng không nhiều hơn một lần mỗi bốn tuần, không nhiều hơn một lần mỗi bốn tuần, không nhiều hơn một lần mỗi ba tuần, không nhiều hơn một lần mỗi hai tuần, hoặc không nhiều hơn một lần mỗi tuần. Theo phương án khác, việc sử dụng này có thể được duy trì trong một, hai, ba hoặc sáu tháng, hoặc một năm hoặc lâu hơn. Theo một phương án khác, các liều lượng tác nhân iARN theo sáng chế được dùng một tuần một lần trong ba tuần.

Nhìn chung, tác nhân iARN không hoạt hóa hệ miễn dịch, *ví dụ*, không làm tăng mức xytokin, như mức TNF-alpha hoặc IFN-alpha. Ví dụ, khi được đo bằng thử nghiệm, chẳng hạn như thử nghiệm PBMC in vitro, chẳng hạn như được mô tả trong bản mô tả này, sự tăng lên của hàm lượng TNF-alpha hoặc IFN-alpha, nhỏ hơn 30%, 20%, hoặc 10% của tế bào đối chứng được điều trị bằng dsARN đối chứng, chẳng hạn như dsARN mà không hướng đích HAO1.

Ví dụ, đối tượng có thể được dùng lượng chữa bệnh của tác nhân iARN, như 0,3 mg/kg, 0,5 mg/kg, 1,0 mg/kg, 1,5 mg/kg, 2,0 mg/kg, 2,5 mg/kg, hoặc 3 mg/kg dsARN. Tác nhân iARN có thể được sử dụng qua đường truyền trong mạch trong khoảng thời gian, như trong khoảng thời gian 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, hoặc 25 phút. Việc dùng lặp lại, ví

- 107 -

dự, một cách thường xuyên, như hàng hai tuần (*tức là*, mỗi hai tuần) trong một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng hoặc lâu hơn. Sau chế độ dùng liều bắt đầu, việc điều trị có thể được dùng trên cơ sở ít thường xuyên hơn. Ví dụ, sau khi dùng mỗi hai tuần trong ba tháng, có thể lặp lại việc sử dụng mỗi tháng một lần, trong sáu tháng hoặc một năm hoặc lâu hơn. Việc sử dụng tác nhân iARN có thể làm giảm hàm lượng HAO1, *ví dụ*, trong tế bào, mô, máu, nước tiểu hoặc khoang khác của bệnh nhân đi ít nhất 10%, ít nhất 15%, ít nhất 20%, ít nhất 25%, ít nhất 30%, ít nhất 40%, ít nhất 50%, ít nhất 60%, ít nhất 70%, ít nhất 80 % hoặc ít nhất 90% hoặc nhiều hơn.

Trước khi dùng liều đầy đủ của tác nhân iARN, bệnh nhân có thể được dùng liều nhỏ hơn, như liều dẫn đến phản ứng truyền nhỏ hơn 5%, và được theo dõi về tác dụng không mong muốn, như phản ứng dị ứng, hoặc về các mức lipid tăng cao hoặc huyết áp. Trong ví dụ khác, bệnh nhân có thể được theo dõi tác dụng kích thích miễn dịch không mong muốn, như gia tăng hàm lượng xytokin (*ví dụ*, TNF-alpha hoặc INF-alpha).

Bệnh nhân cần tác nhân ARNi HAO1 có thể được nhận dạng bằng cách xem xét tiền sử gia đình. Người chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như bác sĩ, y tá, hoặc thành viên gia đình, có thể xem xét tiền sử gia đình trước khi kê đơn hoặc sử dụng dsARN HAO1. Thử nghiệm ADN cũng có thể được tiến hành trên bệnh nhân để xác định sự đột biến trong gen AGT1, trước khi dùng tác nhân ARNi HAO1 cho bệnh nhân. Sự chẩn đoán PH1 có thể được xác nhận bằng thử nghiệm bất kỳ đã biết rõ đối với người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực.

Hiệu quả điều trị hoặc phòng ngừa là điều hiển nhiên khi có sự cải thiện có ý nghĩa thống kê về một hoặc nhiều tham số về tình trạng bệnh, hoặc bởi sự thất bại dẫn đến tình trạng trở nên tồi tệ hơn hoặc phát triển các triệu chứng ở nơi mà chúng không được lường trước. Ví dụ, sự thay đổi tốt ít nhất 10% ở tham số đo được của bệnh, và tốt hơn là ít nhất 20%, 30%, 40%, 50% hoặc hơn có thể được chỉ định cho điều trị hiệu quả. Hiệu quả đối với tác nhân iARN theo sáng chế hoặc chế phẩm tác nhân iARN được đưa ra cũng có thể được đánh giá bằng cách sử dụng mô hình động vật thử nghiệm đối với bệnh đưa ra đã biết trong lĩnh vực kỹ thuật này. Khi sử dụng mô hình động vật thử nghiệm, hiệu quả điều trị được chứng minh khi có sự giảm có ý nghĩa thống kê ở chất đánh dấu hoặc triệu chứng được quan sát thấy.

- 108 -

Liều lượng của tác nhân ARNi mà được dùng cho đối tượng có thể được điều chỉnh để làm cho cân bằng nguy cơ và lợi ích của liều lượng cụ thể, ví dụ, để đạt được mức độ mong muốn của sự triệt tiêu gen HAO1 (như được đánh giá, *ví dụ*, dựa trên sự triệt tiêu mARN HAO1, sự biểu hiện protein HAO1, hoặc sự giảm hàm lượng oxalat) hoặc hiệu quả trị liệu hoặc phòng ngừa mong muốn, cùng lúc đó tránh được các tác dụng phụ không mong muốn.

Theo một số phương án, tác nhân ARNi được dùng thành hai liều hoặc nhiều hơn. Nếu muốn để tạo thuận lợi cho việc truyền lặp lại hoặc thường xuyên, việc cấy thiết bị phân phối, *ví dụ*, bơm, ống dẫn bán vĩnh viễn (*ví dụ*, trong tĩnh mạch, trong màng bụng, trong bể lớn hoặc trong bao), hoặc bể chứa có thể thích hợp. Theo một số phương án, số lượng hoặc hàm lượng của liều lượng tiếp theo phụ thuộc vào sự đạt được hiệu quả mong muốn, *ví dụ*, sự triệt tiêu của gen HAO1, hoặc sự đạt được hiệu quả trị liệu hoặc dự phòng, *ví dụ*, làm giảm sự quá tải sắt. Theo một số phương án, tác nhân ARNi được dùng theo lịch biểu. Ví dụ, tác nhân ARNi có thể được dùng mỗi tuần một lần, mỗi tuần hai lần, ba lần mỗi tuần, bốn lần mỗi tuần, hoặc năm lần mỗi tuần. Theo một số phương án, phát đồ này bao gồm các lần dùng cách đều, *ví dụ*, hàng giờ, mỗi bốn giờ, mỗi sáu giờ, mỗi tám giờ, mỗi mười hai giờ, hàng ngày, mỗi 2 ngày, mỗi 3 ngày, mỗi 4 ngày, mỗi 5 ngày, hàng tuần, hàng hai tuần hoặc hàng tháng. Theo các phương án khác, lịch biểu này gồm các lần sử dụng cách gần nhau, sau đó là khoảng cách thời gian lâu hơn không dùng tác nhân này. Ví dụ, lịch trình này có thể bao gồm nhóm liều ban đầu mà được dùng trong khoảng thời gian tương đối ngắn (*ví dụ*, khoảng mỗi 6 giờ, khoảng mỗi 12 giờ, khoảng mỗi 24 giờ, khoảng mỗi 48 giờ, hoặc khoảng mỗi 72 giờ) tiếp theo là khoảng thời gian lâu hơn (*ví dụ*, khoảng 1 tuần, khoảng 2 tuần, khoảng 3 tuần, khoảng 4 tuần, khoảng 5 tuần, khoảng 6 tuần, khoảng 7 tuần, hoặc khoảng 8 tuần) trong thời gian đó tác nhân ARNi không được dùng. Theo một phương án, tác nhân ARNi ban đầu được dùng mỗi giờ và sau đó được dùng ở khoảng cách lâu hơn (*ví dụ*, hàng ngày, hàng tuần, hai tuần, hoặc hàng tháng). Theo một phương án khác, tác nhân ARNi ban đầu được dùng hàng ngày và sau đó được dùng ở khoảng cách lâu hơn (*ví dụ*, hàng tuần, hai tuần, hoặc hàng tháng). Theo một số phương án, việc gia tăng khoảng cách lâu hơn theo thời gian hoặc được xác định dựa trên việc đạt được tác dụng mong muốn. Theo phương án cụ thể, tác nhân ARNi được dùng một lần hàng ngày trong tuần đầu tiên, sau đó dùng liều hàng tuần bắt đầu vào ngày dùng thứ tám. Theo phương án cụ thể

- 109 -

khác, tác nhân ARNi được dùng mỗi ngày khác trong tuần đầu tiên, sau đó dùng liều hàng tuần bắt đầu vào ngày dùng thứ tám.

Theo một số phương án, tác nhân ARNi được dùng theo chế độ liều lượng mà bao gồm "pha tải" của các lần dùng khoảng cách gần nhau mà có thể được theo dõi bằng "pha duy trì", trong đó tác nhân ARNi được dùng ở các khoảng thời gian cách nhau lâu hơn. Theo một phương án, giai đoạn tải gồm năm lần dùng hàng ngày của tác nhân ARNi trong tuần đầu tiên. Theo phương án khác, giai đoạn duy trì gồm một hoặc hai lần dùng hàng tuần của tác nhân ARNi. Theo phương án nữa, giai đoạn duy trì kéo dài 5 tuần.

Lịch biểu bất kỳ trong số các lịch biểu này có thể tùy ý được lặp lại một hoặc nhiều lần lặp lại. Số lượng bước lặp có thể phụ thuộc vào sự đạt được hiệu quả mong muốn, *ví dụ*, sự triệt tiêu của gen HAO1, và/hoặc sự đạt được hiệu quả trị liệu hoặc dự phòng, *ví dụ*, làm giảm hàm lượng oxalat hoặc làm giảm triệu chứng của PH1.

Theo một khía cạnh khác, các dấu hiệu của sáng chế, phương pháp hướng dẫn người sử dụng cuối, *ví dụ*, điều dưỡng viên hoặc đối tượng, về cách dùng tác nhân iARN được mô tả ở đây. Phương pháp này bao gồm, tùy ý, cung cấp cho người dùng cuối một hoặc nhiều liều của tác nhân iARN, và chỉ định cho người dùng cuối dùng tác nhân iARN theo phác đồ được mô tả ở đây, do đó chỉ định cho người dùng cuối.

VII. Bộ kit

Sáng chế cũng đề xuất bộ kit để sử dụng tác nhân iARN bất kỳ và/hoặc thực hiện phương pháp bất kỳ theo sáng chế. Các bộ kit bao gồm một hoặc nhiều tác nhân ARNi và hướng dẫn sử dụng, *ví dụ*, hướng dẫn để ức chế sự biểu hiện của HAO1 trong tế bào bằng cách cho tế bào tiếp xúc với (các) tác nhân ARNi ở lượng hữu hiệu để ức chế sự biểu hiện của HAO1. Bộ kit có thể tùy ý có chứa thêm phương tiện để làm tế bào tiếp xúc với tác nhân ARNi (*ví dụ*, dụng cụ tiêm), hoặc phương tiện để đo sự ức chế của HAO1 (*ví dụ*, phương tiện để đo sự ức chế của mRNA HAO1 hoặc protein). Phương tiện để đo sự ức chế của HAO1 này có thể có chứa phương tiện để thu mẫu từ đối tượng, chẳng hạn như, *ví dụ*, mẫu huyết tương. Bộ kit theo sáng chế có thể tùy ý còn chứa các phương tiện để sử dụng (các) tác nhân ARNi cho đối tượng hoặc phương tiện để xác định lượng có hiệu quả điều trị bệnh hoặc lượng có hiệu quả phòng bệnh.

VII. Chất đánh dấu chẩn đoán đối với PH1 và các tình trạng bệnh liên quan

Cũng được mô tả trong bản mô tả này là chất đánh dấu và phương pháp chẩn đoán của tình trạng bệnh gây ra bởi sự sản xuất quá mức oxalat, cụ thể là PH1 và các tình trạng bệnh liên quan, cũng như là với các tác nhân để điều trị các tình trạng bệnh này.

Theo một khía cạnh khác, sáng chế đề cập đến phương pháp điều trị tình trạng bệnh PH1 ở đối tượng (bệnh tạo sỏi, đặc biệt là PH1). Phương pháp chẩn đoán này bao gồm các bước: (a) phá vỡ sự biểu hiện HAO1 ở đối tượng (b) thu lấy huyết thanh sinh học từ đối tượng này; và (b) xác định hàm lượng của glycolat trong huyết thanh này. Cần hiểu rõ rằng hàm lượng tăng lên của glycolat trong huyết thanh, so với đối chứng âm, cho thấy sự ức chế của enzym glycolat oxidaza giúp ngăn ngừa sự sản xuất oxalat gây ra bởi tình trạng bệnh PH1.

Theo một phương án, được mô tả trong bản mô tả này là bộ kit để chẩn đoán tình trạng bệnh PH1, bộ kit này bao gồm các thành phần sau: (a) tác nhân để xác định sự có mặt của chất phân tích quan tâm trong huyết thanh, trong đó chất phân tích quan tâm này là một trong số các glycolat; và (b) phương tiện định cỡ. Ví dụ, chất phân tích quan tâm này là glycolat, tác nhân này là siARN hướng đích HAO1.

Trừ khi được định nghĩa, mọi thuật ngữ kỹ thuật và khoa học được sử dụng trong tài liệu này có nghĩa tương tự như cách hiểu chung thông thường của người có kỹ năng bình thường trong lĩnh vực của sáng chế này. Mặc dù các phương pháp và nguyên liệu giống hoặc tương đương với các gì được mô tả ở tài liệu này có thể được sử dụng trong thực hành hoặc thử nghiệm sARNi và các phương pháp đặc trưng theo sáng chế, các phương pháp và nguyên liệu thích hợp vẫn được mô tả dưới đây. Tất cả các ấn phẩm, các ứng dụng bằng sáng chế, bằng sáng chế và các tài liệu tham khảo khác được nhắc đến ở đây được kết hợp vào đây chỉ để tham khảo. Trong trường hợp xung đột, các đặc điểm kỹ thuật hiện tại, bao gồm cả định nghĩa sẽ được sử dụng. Ngoài ra, nguyên liệu, phương pháp, và ví dụ chỉ dùng để minh họa và không phải để hạn chế.

CÁC VÍ DỤ

Nguyên liệu và phương pháp

Các nguyên liệu và phương pháp sau được sử dụng trong các Ví dụ. Như được dùng trong bản mô tả này, "HAO" và "GO" được sử dụng thay thế lẫn nhau.

Tổng hợp siARN

ARN sợi đơn được sản xuất bằng cách tổng hợp pha rắn trên thang chia độ 1 μmol sử dụng thiết bị tổng hợp Expedite 8909 (Applied Biosystems, Appliedera Deutschland GmbH, Darmstadt, Đức) và thủy tinh lỏng có kiểm soát (CPG, 500Å, Proligo Biochemie GmbH, Hamburg, Đức) làm giá đỡ rắn. ARN và ARN chứa 2'-O-metyl nucleotit được tạo ra bằng cách tổng hợp pha rắn sử dụng lần lượt phosphoramidit và 2'-O-metyl phosphoramidit tương ứng (Proligo Biochemie GmbH, Hamburg, Đức). Các khối xây dựng này được kết hợp ở các vị trí chọn lọc trong trình tự của chuỗi oligoribonucleotit sử dụng hóa học nucleosit phosphoramidit tiêu chuẩn như được mô tả trong tài liệu Current protocols in nucleic acid chemistry, Beaucage, S.L. và cộng sự. (Edrs.), John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA. Liên kết phosphorothioat được đưa vào bằng cách thay thế dung dịch chất oxy hóa iot bằng dung dịch của Chất phản ứng Beaucage (Chruachem Ltd, Glasgow, Anh) trong axetonitril (1%). Chất phản ứng phụ khác được thu từ hãng Mallinckrodt Baker (Griesheim, Đức).

Sự khử bảo vệ và sự tinh chế của oligoribonucleotit thô bằng HPLC trao đổi anion được thực hiện theo các quy trình đã được thiết lập. Hiệu suất và nồng độ được xác định bởi sự hấp thụ UV của dung dịch của ARN tương ứng ở chiều dài bước sóng bằng 260 nm bằng cách sử dụng quang phổ kế (DU 640B, Beckman Coulter GmbH, Unterschleißheim, Đức).

ARN sợi kép được tạo ra bằng cách trộn dung dịch đẳng mol của các sợi bổ sung trong đệm ủ (20 mM natri phosphat, độ pH 6,8; 100 mM natri clorua), được gia nhiệt trong bể nước ở nhiệt độ 85 - 90°C trong thời gian 3 phút và để nguội xuống nhiệt độ trong phòng trong khoảng thời gian 3 - 4 giờ. Dung dịch ARN đã được ủ được lưu trữ ở nhiệt độ -20 °C đến khi sử dụng.

- 112 -

Trong một số trường hợp, cặp đôi (dsARN) được tổng hợp nhiều hơn một lần. Các mẻ khác nhau được gắn nhãn bằng các phần kéo dài khác nhau. Ví dụ, AD-62933.1 và AD-62933.2 là các mẻ khác nhau của cùng một cặp đôi.

Nuôi cấy và sự được biến nạp tế bào

Tế bào gan khỉ *Cynomolgus* sơ cấp (PCH) và tế bào gan chuột sơ cấp (PMH) được sử dụng. PCH (Celsis # M003055, lô CBT) hoặc PMH (mới được phân lập) được chuyển nạp bằng cách bổ sung 14,8µl Opti-MEM cộng với 0,2µl Lipofectamin ARNiMax trong mỗi giếng (Invitrogen, Carlsbad CA, cat # 13778-150) vào 5µl cặp đôi siARN trong mỗi giếng vào đĩa 96 giếng và được ủ ở nhiệt độ trong phòng trong thời gian 15 phút. 80µl môi trường InVitroGRO CP Chuột nhắt (InVitro Technologies) chứa $\sim 2 \times 10^4$ tế bào PCH hoặc PMH sau đó được bổ sung vào hỗn hợp siARN. Tế bào được ủ trong 24 giờ trước khi tinh chế ARN. Các thí nghiệm liều lượng đơn lẻ được thực hiện ở nồng độ cặp đôi cuối cùng 10 hoặc 20 nM và 0,1 hoặc 0,2 nM và các thí nghiệm đáp ứng liều lượng được thực hiện trong khoảng liều lượng của nồng độ cặp đôi cuối cùng từ 10 nM đến 36 fM qua các dịch pha loãng 8, 6 lần.

Phân lập ARN tổng số

ARN tổng số được phân lập bằng cách sử dụng bộ kit phân lập mARN DYNABEADS (Invitrogen, phần #: 610-12). Các tế bào được thu hoạch và được làm tan trong 150µl Chất đệm Làm tan/Liên kết sau đó được trộn trong thời gian 5 phút ở tốc độ 850 vòng/phút bằng cách sử dụng thiết bị trộn gia nhiệt Eppendorf (tốc độ trộn ổn định trong suốt quy trình). Mười microlít hạt từ tính và 80µl hỗn hợp Chất đệm Làm tan/Liên kết được bổ sung vào đĩa đáy tròn và được trộn trong thời gian 1 phút. Các hạt từ tính được giữ lại bằng cách sử dụng bộ từ tính và dịch nổi được loại bỏ mà không ảnh hưởng đến các hạt. Sau khi loại bỏ dịch nổi bề mặt, tế bào đã được làm tan được bổ sung vào các hạt còn lại và được trộn trong thời gian 5 phút. Sau khi loại bỏ dịch nổi bề mặt, hạt từ tính được rửa 2 lần bằng 150µl Chất đệm Rửa A và được trộn trong thời gian 1 phút. Các hạt được lại bắt giữ và loại bỏ phần nổi. Sau đó các hạt được rửa bằng 150µl Chất đệm Rửa B, được bắt giữ và dịch nổi bề mặt được loại bỏ. Tiếp theo các hạt được rửa bằng 150µl Chất đệm Rửa giải, được bắt giữ và dịch nổi bề mặt được loại bỏ. Sau đó, hạt được để khô trong 2 phút. Sau khi

- 113 -

để khô, 50 μ l Chất đệm Rửa giải được bổ sung và được trộn trong thời gian 5 phút ở nhiệt độ 70°C. Các hạt được bắt giữ trên nam châm trong thời gian 5 phút. 40 μ l dịch nổi bề mặt được loại bỏ và được bổ sung vào đĩa 96 giếng khác.

Tổng hợp cADN

Tổng hợp cADN được thực hiện bằng cách sử dụng bộ kit phiên mã ngược cADN dung lượng cao ABI (Applied Biosystems, Foster City, CA, Cat #4368813).

Hỗn hợp chủ của 2 μ l 10X Chất đệm, 0,8 μ l 25X dNTP, 2 μ l đoạn môi ngẫu nhiên, 1 μ l transcriptaza ngược, 1 μ l chất ức chế ARNaza và 3,2 μ l H₂O trong mỗi phản ứng được bổ sung vào 10 μ l ARN tổng số. cADN được tạo ra bằng cách sử dụng chu trình nhiệt Bio-Rad C-1000 hoặc S-1000 (Hercules, CA) qua các bước sau: 10 phút 25°C, 120 phút 37°C, 5 giây 85°C, giữ nguyên 4°C.

Kỹ thuật PCR thời gian thực

2 μ l cADN được bổ sung vào hỗn hợp chủ chứa 0,5 μ l GAPDH ở chuột (cat # 4352339E Life Technologies) hoặc các đoạn dò GAPDH TaqMan ở khỉ Cynomolgus được thiết kế theo đặt hàng: (F- GCATCCTGGGCTACACTGA, (SEQ ID NO: 13) R- TGGGTGTCGCTGTTGAAGTC (SEQ ID NO: 14), Đoạn dò- CCAGGTGGTCTCCTCC (SEQ ID NO: 15)), 0,5 μ l HAO1 người hoặc chuột (HS00213909_M1- mà phản ứng chéo với HOA1 khỉ Cynomolgus, Mm 00439249_m1 cho các thử nghiệm ở chuột, life technologies) và 5 μ l hỗn hợp chủ đoạn dò Lightcycler 480 (Roche Cat # 04887301001) trong mỗi giếng trong 50 đĩa 384 giếng (Roche cat # 04887301001). PCR thời gian thực được thực hiện trong hệ thống PCR thời gian thực LightCycler480 (Roche) bằng cách sử dụng thử nghiệm $\Delta\Delta C_t$ (RQ). Mỗi sợi kép được kiểm tra trong hai lần chuyển nhiễm độc lập và mỗi lần chuyển nhiễm được thử nghiệm trong hai lần lặp, trừ khi có lưu ý khác theo các bảng tóm tắt.

Để tính số lần thay đổi tương đối, dữ liệu thời gian thực được phân tích bằng cách sử dụng phương pháp $\Delta\Delta C_t$ và được chuẩn hóa với các thử nghiệm được thực hiện bằng các tế bào được chuyển nhiễm bằng 10 nM AD-1955, hoặc các tế bào được chuyển nhiễm giả. IC50 được tính bằng cách sử dụng mô hình khớp 4 tham số sử dụng XLFit và được chuẩn

hóa đối với tế bào được chuyển nhiễm bằng AD-1955 hoặc các tế bào chưa quen thí nghiệm.

Các trình tự của sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa AD-1955 là: CÓ NGHĨA: 5'-cuuAcGcuGAGuAcuucGAdTsdT-3' (SEQ ID NO: 16); và ĐỐI NGHĨA: 5'-UCGAAGuACUcAGCGuAAGdTsdT-3' (SEQ ID NO: 17).

Bảng B: Chữ viết tắt của các monome nucleotit sử dụng trong biểu diễn trình tự axit nucleic.

Chữ viết tắt	(Các) Nucleotit
A	Ađenosin-3'-phosphat
Ab	beta-L-ađenosin-3`-phosphat
Af	2'-floađenosin-3'-phosphat
Afs	2'-floađenosin-3'-phosphorothioat
As	ađenosin-3'-phosphorothioat
C	xytidin-3'-phosphat
Cb	beta-L-xytidin-3'-phosphat
Cf	2'-floxytidin-3'-phosphat
Cfs	2'-floxytidin-3'-phosphorothioat
Cs	xytidin-3'-phosphorothioat
G	guanosin-3'-phosphat
Gb	beta-L-guanosin-3`-phosphat
Gbs	beta-L-guanosin-3`-phosphorothioat
Gf	2'-floguanosin-3'-phosphat
Gfs	2'-floguanosin-3'-phosphorothioat
Gs	guanosin-3'-phosphorothioat
T	5'-metyluridin-3'-phosphat

- 115 -

Chữ viết tắt	(Các) Nucleotit
Tf	2'-flo-5-metyluridin-3'-phosphat
Tfs	2'-flo-5-metyluridin-3'-phosphorothioat
Ts	5-metyluridin-3'-phosphorothioat
U	uridin-3'-phosphat
Uf	2'-flouridin-3'-phosphat
Ufs	2'-flouridin -3'-phosphorothioat
Us	uridin -3'-phosphorothioat
N	nucleotit bất kỳ (G, A, C, T hoặc U)
a	2'-O-metyladenosin-3'-phosphat
as	2'-O-metyladenosin-3'- phosphorothioat
c	2'-O-metylxytidin-3'-phosphat
cs	2'-O-metylxytidin-3'- phosphorothioat
g	2'-O-metylguanosin-3'-phosphat
gs	2'-O-metylguanosin-3'- phosphorothioat
t	2'-O-metyl-5-metyluridin-3'-phosphat
ts	2'-O-metyl-5-metyluridin-3'-phosphorothioat
u	2'-O-metyluridin-3'-phosphat
us	2'-O-metyluridin-3'-phosphorothioat
dT	2'-đeoxytymidin
dTs	2'-đeoxytymidin-3'-phosphothioat
dU	2'-đeoxyuridin
s	cầu nối phosphorothioat

- 116 -

Chữ viết tắt	(Các) Nucleotit
L96	N-[tris(GalNAc-alkyl)-amidodecanoyl]-4-hydroxyprolinol Hyp-(GalNAc-alkyl) ₃
(Aeo)	2'-O-metoxyletyladenôsin-3'-phosphat
(Aeos)	2'-O-metoxyletyladenôsin-3'-phosphorothioat
(Geo)	2'-O-metoxyletylguanôsin-3'-phosphat
(Geos)	2'-O-metoxyletylguanôsin-3'- phosphorothioat
(Teo)	2'-O-metoxyletyl-5-metyluridin-3'-phosphat
(Teos)	2'-O-metoxyletyl-5-metyluridin-3'- phosphorothioat
(m5Ceo)	2'-O-metoxyletyl-5-metylxytidin-3'-phosphat
(m5Ceos)	2'-O-metoxyletyl-5-metylxytidin-3'- phosphorothioat
(A3m)	3'-O-metylâdenôsin-2'-phosphat
(A3mx)	3'-O-metyl-xylofuranosylâdenôsin-2'-phosphat
(G3m)	3'-O-metylguanôsin-2'-phosphat
(G3mx)	3'-O-metyl-xylofuranosylguanôsin-2'-phosphat
(C3m)	3'-O-metylxytidin-2'-phosphat
(C3mx)	3'-O-metyl-xylofuranosylxytidin-2'-phosphat
(U3m)	3'-O-metyluridin-2'-phosphat
(U3mx)	3'-O-metylxyloouridin-2'-phosphat
(Chd)	2'-O-hexadexyl-xytidin-3'-phosphat
(pshe)	hydroxyletylphosphorothioat
(Uhd)	2'-O-hexadexyl-uridin-3'-phosphat
(Tgn)	S-Isome của axit tymidin-glycol nucleic (GNA)
(Cgn)	Axit nucleic xytidin- glycol (GNA)

- 117 -

Chữ viết tắt	(Các) Nucleotit
(Chd)	2'-O-hexadexyl-xytidin-3'-phosphat
(Ggn)	2'-O-hexadexyl-xytidin-3'-phosphat
(Agn)	Axit nucleic adenosin-glycol (GNA)
P	5'-phosphat
(m5Cam)	2'-O-(N-metylaxetamit)-5-metylxytidin-3'-phosphat
(m5Cams)	2'-O-(N-metylaxetamit)-5-metylxytidin-3'-phosphorothioat
(Tam)	2'-O-(N-metylaxetamit)tymidin-3'-phosphat
(Tams)	2'-O-(N-metylaxetamit)tymidin-3'-phosphorothioat
(Aam)	2'-O-(N-metylaxetamit)Adenosin-3'-phosphat
(Aams)	2'-O-(N-metylaxetamit)Adenosin-3'-phosphorothioat
(Gam)	2'-O-(N-metylaxetamit)guanosin-3'-phosphat
(Gams)	2'-O-(N-metylaxetamit)guanosin-3'-phosphorothioat
Y34	2'-O-Metyl không bazơ
Y44	2-hydroxymetyl-tetrahydrofuran-5-phosphat

Ví dụ 1. Thiết kế, Dự đoán Tính đặc hiệu và Hiệu lực của siARN

Thiết kế siARN được thực hiện để nhận dạng siARN hướng đích bản phiên mã HAO1 ở người, khỉ *Cynomolgus*, chuột, và chuột nhắt được chú thích trong cơ sở dữ liệu Gen NCBI (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/>).

Thiết kế sử dụng các bản phiên mã sau đây từ bộ sưu tập NCBI RefSeq: mARN HAO1 người (*Homo sapiens*) là NM_017545.2; mARN HAO1 khỉ *Cynomolgus* (*Macaca fascicularis*) là XM_005568381.1; mARN HAO1 chuột (*Mus musculus*) là NM_010403.2; mARN HAO1 chuột nhắt (*Rattus norvegicus*) là XM_006235096.1.

- 118 -

Do sự khác biệt trình tự động vật linh trưởng/động vật gặm nhấm cao, các cặp đôi siARN được thiết kế trong vài mẻ riêng rẽ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẻ chứa bắt cặp chỉ các bản phiên mã người và cyno; chỉ các bản phiên mã người, cyno, chuột, và chuột nhắt; và chỉ các bản phiên mã chuột và chuột nhắt. Mọi siARN kép đều được cấu tạo để chia sẻ 100% nhận dạng với các danh sách bản mã của người và các loài khác đã được liệt kê, được xem xét trong mỗi lứa (ở trên).

Tính đặc hiệu của tất cả 19mer có thể có được dự đoán từ mỗi trình tự. Sau đó ứng viên 19mer mà thiếu các đoạn lặp dài hơn 7 nucleotit được chọn. 1069 ứng viên siARN ở người/cyno, 184 ở người/cyno/chuột/chuột nhắt, và 579 ở chuột/chuột nhắt được dùng trong các tra cứu toàn diện tương phản với các hệ phiên mã thích hợp (được xác định dưới dạng tập hợp của các bản ghi NM_ và XM_ trong các tập hợp NCBI Refseq ở người, cyno, chuột, hoặc chuột nhắt) sử dụng thuật toán "tổng lực" toàn diện được thực hiện trong tập lệnh python 'BruteForce.py'. Sau đó bảng mã phân tích các sự sắp xếp, bảng mã oligo để tạo ra một số điểm dựa trên vị trí và số lượng của lỗi bắt cặp giữa các siARN và bất kỳ bảng mã có tiềm năng ngoài-mục tiêu. Điểm ngoài đích được lấy trọng số để nhấn mạnh các khác biệt ở các vùng 'hạt giống' của các siARN, ở các vị trí 2-9 từ đầu 5' của phân tử này. Mỗi cặp bản sao oligo từ tìm kiếm cường độ đã cho thấy sự không tương xứng bằng cách tổng hợp các kết quả không tương xứng; sự không tương xứng tại vị trí 2-9 được tính là 2,8, sự không tương xứng tại các vị trí 10-11 được tính là 1,2, và sự không tương xứng tại khu vực 12-19 được tính là 1,0. Một sự dự báo ngoài mục tiêu bổ sung được thực hiện bằng cách so sánh tần số heptamer và octomer từ 3 hexamer riêng biệt từ hạt giống của mỗi oligo. Các hexamer từ các vị trí 2-7 so với đầu 5' được sử dụng để tạo 2 heptamer và một octome. Heptamer1 được tạo ra bằng cách bổ sung A ở đầu 3' vào hexamer; heptamer2 được tạo ra bằng cách bổ sung A ở đầu 5' vào hexamer; octome được tạo ra bằng cách bổ sung A vào cả đầu 5' và 3' của hexamer. Tần suất của octome và heptamer ở UTRome ở đầu 3' của người, cyno, chuột nhắt, hoặc chuột (được xác định là trình tự con của hệ phiên mã từ cơ sở dữ liệu Refseq của NCBI trong đó đầu của vùng mã hóa, 'CDS', được xác định rõ) được tính trước. Tần suất octome được chuẩn hóa về tần suất heptamer bằng cách sử dụng giá trị trung bình từ khoảng tần suất octome. Sau đó 'mirSeedScore' được tính bằng cách tính tổng của ((3 X số đếm octome chuẩn hóa) + (2 X số đếm heptamer2) + (1 X số đếm heptamer1)).

- 119 -

Cả hai sợi siARN đều được phân vào loại đặc hiệu theo số điểm tính toán được: điểm số trên 3 đủ tiêu chuẩn là đặc hiệu cao, bằng 3 là đặc hiệu và giữa 2,2 với 2,8 là đặc hiệu vừa phải. siARN được phân loại theo tính đặc hiệu của sợi đối nghĩa. Sau đó các cặp đôi từ tập hợp người/cyno và chuột/chuột nhất mà các oligo đối nghĩa của chúng thiếu GC ở vị trí thứ nhất, thiếu G ở cả vị trí 13 và 14, và có 3 hoặc nhiều Us hoặc As trong vùng hạt (đặc điểm của các cặp đôi có hiệu lực được dự đoán cao) được chọn. Tương tự, các cặp đôi từ tập hợp người/cyno/chuột và người/cyno/chuột/chuột nhất mà có 3 hoặc nhiều hơn Us hoặc As trong vùng hạt được chọn.

Các sợi kép được liên hợp với GalNAc ứng viên, lần lượt dài 21 và 23 nucleotit trên các sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa, được tạo ra bằng cách kéo dài 4 nucleotit bổ sung đối nghĩa dài 19mer theo hướng 3' (bảo toàn sự hỗ trợ hoàn hảo với bản phiên mã đích). Sợi có nghĩa được xác định là bổ sung ngược với 21 nucleotit đầu tiên của sợi đối nghĩa 23mer. Các sợi kép được lựa chọn mà duy trì sự bắt cặp hoàn hảo với tất cả các loại bản phiên mã được chọn trên toàn bộ 23 nucleotit.

Các sợi đối nghĩa mà có chứa C hoặc G ở vị trí 5' thứ nhất được cải biến để có U ở vị trí 5' thứ nhất, trừ khi việc làm như vậy sẽ đưa vào loạt gồm 4 hoặc nhiều Us liên tiếp (5' → 3'), trong trường hợp đó chúng được cải biến để có A ở vị trí 5' thứ nhất. Các sợi có nghĩa để bắt cặp với các cặp đôi có các sợi đối nghĩa "được hoán đổi UA" được cải biến tương ứng để bảo toàn tính bổ sung. Các ví dụ được mô tả dưới đây bao gồm AD-62989 và AD-62993.

Tổng số 31 oligo 21/23mer có nghĩa và 31 oligo 21/23mer đối nghĩa có nguồn gốc từ người/cyno, 19 oligo 21/23mer có nghĩa và 19 oligo 21/23mer đối nghĩa có nguồn gốc từ người/cyno/chuột/chuột nhất, và 48 oligo 21/23mer có nghĩa và 48 oligo 21/23mer đối nghĩa có nguồn gốc từ chuột/chuột nhất được tổng hợp và tạo thành các cặp đôi liên hợp GalNAc.

Các trình tự của sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa của các sợi kép cải biến được thể hiện trên Bảng 1, và các trình tự của sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa của các sợi kép không được cải biến được thể hiện trên Bảng 2.

Bảng 1a. Các trình tự được cải biến HAO1

Tên cặp đôi	Trình tự sợi có nghĩa	SEQ ID NO:	Trình tự sợi đối nghĩa	SEQ ID NO:	Loài
AD- 62933	GfsasAfuGfuGfaAfAfGfuC faUfcGfaCfaAfL96	18	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfuUfcsusg	89	Hs/Mm
AD- 62939	UfsusUfuCfaAfuGfGfGfu GfuCfcUfaGfgAfL96	19	usCfscUfaGfgAfcAfcccAfu UfgAfaAfasgsu	90	Hs/Mm
AD- 62944	GfsasAfaGfuCfaUfCfGfaC faAfgAfcAfuUfL96	20	asAfsuGfuCfuUfgUfcgaUf gAfcUfuUfcsasc	91	Hs/Mm
AD- 62949	UfscsAfuCfgAfcAfAfGfaCf aUfuGfgUfgAfL96	21	usCfsaCfcAfaUfgUfcuuGfu CfgAfuGfascsu	92	Hs/Mm
AD- 62954	UfsusUfcAfaUfgGfGfUfg UfcCfuAfgGfaAfL96	22	usUfscCfuAfgGfaCfaccCfa UfuGfaAfasasg	93	Hs/Mm
AD- 62959	AfsasUfgGfgUfgUfCfCfuA fgGfaAfcCfuUfL96	23	asAfsgGfuUfcCfuAfggaCfa CfcCfaUfusgsa	94	Hs/Mm
AD- 62964	GfsasCfaGfuGfcAfCfAfaU faUfuUfuCfcAfL96	24	usGfsgAfaAfaUfaUfuguGf cAfcUfgUfcsasg	95	Hs/Mm
AD- 62969	AfscsUfuUfuCfaAfUfGfgG fuGfuCfcUfaAfL96	25	usUfsaGfgAfcAfcCfcauUfg AfaAfaGfuscsa	96	Hs/Mm
AD- 62934	AfsasGfuCfaUfcGfAfCfaA fgAfcAfuUfgAfL96	26	usCfsaAfuGfuCfuUfgucGf aUfgAfcUfususc	97	Hs/Mm
AD- 62940	AfsusCfgAfcAfaGfAfCfaUf uGfgUfgAfgAfL96	27	usCfsuCfaCfcAfaUfgucUfu GfuCfgAfusgsa	98	Hs/Mm

- 121 -

AD- 62945	GfsgsGfaGfaAfaGfGfUfg UfuCfaAfgAfuAfL96	28	usAfsuCfuUfgAfaCfaccUfu UfcUfcCfcscsc	99	Hs/Mm
AD- 62950	CfsusUfuUfcAfaUfGfGfg UfgUfcCfuAfgAfL96	29	usCfsuAfgGfaCfaCfccaUfu GfaAfaAfgsusc	100	Hs/Mm
AD- 62955	UfscsAfaUfgGfgUfGfUfcC fuAfgGfaAfcAfL96	30	usGfsuUfcCfuAfgGfacaCfc CfaUfuGfasasa	101	Hs/Mm
AD- 62960	UfsusGfaCfuUfuUfCfAfa UfgGfgUfgUfcAfL96	31	usGfsaCfaCfcCfaUfugaAfa AfgUfcAfasasa	102	Hs/Mm
AD- 62965	AfsasAfgUfcAfuCfGfAfcAf aGfaCfaUfuAfL96	32	usAfsaUfgUfcUfuGfucgAf uGfaCfuUfuscsa	103	Hs/Mm
AD- 62970	CfsasGfgGfgGfaGfAfAfaG fgUfgUfuCfaAfL96	33	usUfsgAfaCfaCfcUfuucUfc CfcCfcUfgsgsa	104	Hs/Mm
AD- 62935	CfsasUfuGfgUfgAfGfGfaA faAfaUfcCfuUfL96	34	asAfsgGfaUfuUfuUfccuCfa CfcAfaUfgsusc	105	Hs/Mm
AD- 62941	AfscsAfuUfgGfuGfAfGfgA faAfaAfuCfcUfL96	35	asGfsgAfuUfuUfuCfcucAfc CfaAfuGfuscsu	106	Hs/Mm
AD- 62946	AfsgsGfgGfgAfgAfAfAfgG fuGfuUfcAfaAfL96	36	usUfsuGfaAfcAfcCfuuuCfu CfcCfcCfusgsg	107	Hs/Mm
AD- 62951	AfsusGfgUfgGfuAfAfUfu UfgUfgAfuUfuUfL96	37	asAfsaAfuCfaCfaAfauuAfc CfaCfcAfuscsc	108	Hs
AD- 62956	GfsasCfuUfgCfaUfCfCfuG fgAfaAfuAfuAfL96	38	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg CfaAfgUfcscsa	109	Hs
AD- 62961	GfsgsAfaGfgGfaAfGfGfuA fgAfaGfuCfuUfL96	39	asAfsgAfcUfuCfuAfccuUfc CfcUfuCfcsasc	110	Hs

- 122 -

AD- 62966	UfsgsUfcUfuCfuGfUfUfu AfgAfuUfuCfcUfL96	40	asGfsgAfaAfuCfuAfaacAfg AfaGfaCfasgsg	111	Hs
AD- 62971	CfsusUfuGfgCfuGfUfUfu CfcAfaGfaUfcUfL96	41	asGfsaUfcUfuGfgAfaacAfg CfcAfaAfgsgsa	112	Hs
AD- 62936	AfsasUfgUfgUfuUfGfGfg CfaAfcGfuCfaUfL96	42	asUfsgAfcGfuUfgCfccaAfa CfaCfaUfususu	113	Hs
AD- 62942	UfsgsUfgAfcUfgUfGfGfaC faCfcCfcUfuAfL96	43	usAfsaGfgGfgUfgUfccaCfa GfuCfaCfasasa	114	Hs
AD- 62947	GfsasUfgGfgGfuGfCfCfaG fcUfaCfuAfuUfL96	44	asAfsuAfgUfaGfcUfggcAfc CfcCfaUfcscsa	115	Hs
AD- 62952	GfsasAfaAfuGfuGfUfUfu GfgGfcAfaCfgUfL96	45	asCfsgUfuGfcCfcAfaacAfc AfuUfuUfcsasa	116	Hs
AD- 62957	GfsgsCfuGfuUfuCfCfAfaG faUfcUfgAfcAfL96	46	usGfsuCfaGfaUfcUfuggAf aAfcAfgCfcsasa	117	Hs
AD- 62962	UfscsCfaAfcAfaAfAfUfaG fcCfaCfcCfcUfL96	47	asGfsgGfgUfgGfcUfauuUf uGfuUfgGfasasa	118	Hs
AD- 62967	GfsusCfuUfcUfgUfUfUfa GfaUfuUfcCfuUfL96	48	asAfsgGfaAfaUfcUfaaaCfa GfaAfgAfcasg	119	Hs
AD- 62972	UfsgsGfaAfgGfgAfAfGfgU faGfaAfgUfcUfL96	49	asGfsaCfuUfcUfaCfcuuCfc CfuUfcCfascsa	120	Hs
AD- 62937	UfscsCfuUfuGfgCfUfGfu UfuCfcAfaGfaUfL96	50	asUfscUfuGfgAfaAfcagCfc AfaAfgGfasusu	121	Hs
AD- 62943	CfsasUfcUfcUfcAfGfCfuG fgGfaUfgAfuAfL96	51	usAfsuCfaUfcCfcAfgcuGfa GfaGfaUfgsgsg	122	Hs

- 123 -

AD- 62948	GfsgsGfgUfgCfcAfGfCfuA fcUfaUfuGfaUfL96	52	asUfscAfaUfaGfuAfgcuGfg CfaCfcCfcsasu	123	Hs
AD- 62953	AfsusGfuGfuUfuGfGfGfc AfaCfgUfcAfuAfL96	53	usAfsuGfaCfgUfuGfcccAfa AfcAfcAfususu	124	Hs
AD- 62958	CfsusGfuUfuAfgAfUfUfu CfcUfuAfaGfaAfL96	54	usUfscUfuAfaGfgAfaauCf uAfaAfcAfgsasa	125	Hs
AD- 62963	AfsgsAfaAfgAfaAfUfGfgA fcUfuGfcAfuAfL96	55	usAfsuGfcAfaGfuCfcauUf uCfuUfuCfusasg	126	Hs
AD- 62968	GfscsAfuCfcUfgGfAfAfaU faUfaUfuAfaAfL96	56	usUfsuAfaUfaUfaUfuucCf aGfgAfuGfcsasa	127	Hs
AD- 62973	CfscsUfgUfcAfgAfCfCfaUf gGfgAfaCfuAfL96	57	usAfsuGfcCfaUfcCfacaCfc AfuGfuUfusasa	128	Hs
AD- 62938	AfsasAfcAfuGfgUfGfUfgG faUfgGfgAfuAfL96	58	usUfscAfaAfaUfuUfuucAf uCfcUfgAfgsusu	130	Hs
AD- 62974	CfsusCfaGfgAfuGfAfAfaA faUfuUfuGfaAfL96	59	usUfsuGfuCfaAfgUfaauAf cAfuGfcUfgsasa	131	Hs
AD- 62978	CfsasGfcAfuGfuAfUfUfaC fuUfgAfcAfaAfL96	60	usGfsaUfuUfaGfcAfuguUf gUfuCfaUfasasu	132	Hs
AD- 62982	UfsasUfgAfaCfaAfCfAfuG fcUfaAfaUfcAfL96	61	usCfscUfaAfaAfcAfuuuGfg AfuAfuAfususc	133	Hs
AD- 62986	AfsusAfuAfuCfcAfAfAfuG fuUfuUfaGfgAfL96	62	usUfsgGfaUfaCfaGfcuuCfc AfuCfuGfgsasa	134	Hs
AD- 62990	CfscsAfgAfuGfgAfAfGfcU fgUfaUfcCfaAfL96	63			

- 124 -

AD- 62994	GfsasCfuUfuCfaUfCfCfuG fgAfaAfuAfuAfL96	64	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg AfaAfgUfcscsa	135	Hs
AD- 62998	CfscsCfcGfgCfuAfAfUfuU fgUfaUfcAfaUfL96	65	asUfsuGfaUfaCfaAfauuAf gCfcGfgGfgsgsa	136	Hs
AD- 63002	UfsusAfaAfcAfuGfGfCfuU fgAfaUfgGfgAfL96	66	usCfscCfaUfuCfaAfgccAfu GfuUfuAfascsa	137	Hs
AD- 62975	AfsasUfgUfgUfuUfAfGfaC faAfcGfuCfaUfL96	67	asUfsgAfcGfuUfgUfcuaAfa CfaCfaUfususu	138	Mm
AD- 62979	AfscsUfaAfaGfgAfAfGfaA fuUfcCfgGfuUfL96	68	asAfscCfgGfaAfuUfcuuCfc UfuUfaGfusasu	139	Mm
AD- 62983	UfsasUfaUfcCfaAfAfUfgU fuUfuAfgGfaUfL96	69	asUfscCfuAfaAfaCfauuUfg GfaUfaUfasusu	140	Mm
AD- 62987	GfsusGfcGfgAfaAfGfGfcA fcUfgAfuGfuUfL96	70	asAfscAfuCfaGfuGfccuUfu CfcGfcAfcscasc	141	Mm
AD- 62991	UfsasAfaAfcAfgUfGfGfuU fcUfuAfaAfuUfL96	71	asAfsuUfuAfaGfaAfccaCfu GfuUfuUfasasa	142	Mm
AD- 62995	AfsusGfaAfaAfaUfUfUfu GfaAfaCfcAfgUfL96	72	asCfsuGfgUfuUfcAfaaaUf uUfuUfcAfuscsc	143	Mm
AD- 62999	AfsasCfaAfaAfuAfGfCfaAf uCfcCfuUfuUfL96	73	asAfsaAfgGfgAfuUfgcuAfu UfuUfgUfusgsg	144	Mm
AD- 63003	CfsusGfaAfaCfaGfAfUfcU fgUfcGfaCfuUfL96	74	asAfsgUfcGfaCfaGfaucUfg UfuUfcAfgscsa	145	Mm
AD- 62976	UfsusGfuUfgCfaAfAfGfgG fcAfuUfuUfgAfL96	75	usCfsaAfaAfuGfcCfcuuUfg CfaAfcAfasusu	146	Mm

- 125 -

AD-62980	CfsusCfaUfuGfuUfUfAfu UfaAfcCfuGfuAfl96	76	usAfscAfgGfuUfaAfuaaAfc AfaUfgAfgsas	147	Mm
AD-62984	CfsasAfcAfaAfaUfAfGfcAf aUfcCfcUfuUfl96	77	asAfsaGfgGfaUfuGfcuaUf uUfuGfuUfgsgsa	148	Mm
AD-62992	CfsasUfuGfuUfuAfUfUfa AfcCfuGfuAfuUfl96	78	asAfsuAfcAfgGfuUfaauAfa AfcAfaUfgsasg	149	Mm
AD-62996	UfsasUfcAfgCfuGfGfGfaA fgAfuAfuCfaAfl96	79	usUfsgAfuAfuCfuUfcccAfg CfuGfaUfasgsa	150	Mm
AD-63000	UfsgsUfcCfuAfgGfAfAfcCf uUfuUfaGfaAfl96	80	usUfscUfaAfaAfgGfuucCfu AfgGfaCfascsc	151	Mm
AD-63004	UfscsCfaAfcAfaAfAfUfaG fcAfaUfcCfcUfl96	81	asGfsgGfaUfuGfcUfauuUf uGfuUfgGfasasa	152	Mm
AD-62977	GfsgsUfgUfgCfgGfAfAfaG fgCfaCfuGfaUfl96	82	asUfscAfgUfgCfcUfuucCfg CfaCfaCfcscsc	153	Mm
AD-62981	UfsusGfaAfaCfcAfGfUfaC fuUfuAfuCfaUfl96	83	asUfsgAfuAfaAfgUfacuGfg UfuUfcAfasasa	154	Mm
AD-62985	UfsasCfuUfcCfaAfAfGfuC fuAfuAfuAfuAfl96	84	usAfsuAfuAfuAfgAfcuuUf gGfaAfgUfascsu	155	Mm
AD-62989	UfscsCfuAfgGfaAfCfCfuU fuUfaGfaAfaUfl96	85	asUfsuUfcUfaAfaAfgguUfc CfuAfgGfascsa	156	Mm
AD-62993	CfsusCfcUfgAfgGfAfAfaAf uUfuUfgGfaAfl96	86	usUfscCfaAfaAfuUfuucCfu CfaGfgAfgsasa	157	Mm
AD-62997	GfscsUfcCfgGfaAfUfGfuU fgCfuGfaAfaUfl96	87	asUfsuUfcAfgCfaAfcauUfc CfgGfaGfcsasu	158	Mm

- 126 -

AD- 63001	GfsusGfuUfuGfuGfGfGfg AfgAfcCfaAfuAfL96	88	usAfsuUfgGfuCfuCfcccAfc AfaAfcAfcsasg	159	Mm
--------------	--	----	--	-----	----

- 127 -

Bảng 1b: Các trình tự được cải biến HAO1 khác.

Tên cặp đôi	Trình tự sợi có nghĩa	SEQ ID NO:	Trình tự sợi đối nghĩa	SEQ ID NO:	Loài
AD- 62933 .2	GfsasAfuGfuGfaAfAfGfuCfa UfcGfaCfaAfL96	18	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfuUfcsusg	89	Hs/Mm
AD- 62939 .2	UfsusUfuCfaAfuGfGfGfuGfu CfcUfaGfgAfL96	19	usCfscUfaGfgAfcAfcccAfu UfgAfaAfasgsu	90	Hs/Mm
AD- 62944 .2	GfsasAfaGfuCfaUfCfGfaCfaA fgAfcAfuUfL96	20	asAfsuGfuCfuUfgUfcgaUf gAfcUfuUfcsasc	91	Hs/Mm
AD- 62949 .2	UfscsAfuCfgAfcAfAfGfaCfaU fuGfgUfgAfL96	21	usCfsaCfcAfaUfgUfcuuGfu CfgAfuGfascsu	92	Hs/Mm
AD- 62954 .2	UfsusUfcAfaUfgGfGfUfgUfc CfuAfgGfaAfL96	22	usUfscCfuAfgGfaCfaccCfa UfuGfaAfasasg	93	Hs/Mm
AD- 62959 .2	AfsasUfgGfgUfgUfCfCfuAfg GfaAfcCfuUfL96	23	asAfsgGfuUfcCfuAfggaCfa CfcCfaUfusgsa	94	Hs/Mm
AD- 62964 .2	GfsasCfaGfuGfcAfCfAfaUfaU fuUfuCfcAfL96	24	usGfsgAfaAfaUfaUfuguGf cAfcUfgUfcsasg	95	Hs/Mm

- 128 -

AD- 62969 .2	AfscsUfuUfuCfaAfUfGfgGfu GfuCfcUfaAfL96	25	usUfsaGfgAfcAfcCfcUfuUfg AfaAfaGfuscsa	96	Hs/Mm
AD- 62934 .2	AfsasGfuCfaUfcGfAfCfaAfgA fcAfuUfgAfL96	26	usCfsaAfuGfuCfuUfgucGf aUfgAfcUfususc	97	Hs/Mm
AD- 62940 .2	AfsusCfgAfcAfaGfAfCfaUfuG fgUfgAfgAfL96	27	usCfsuCfaCfcAfaUfgucUfu GfuCfgAfusgsa	98	Hs/Mm
AD- 62945 .2	GfsgsGfaGfaAfaGfGfUfgUfu CfaAfgAfuAfL96	28	usAfsuCfuUfgAfaCfaccUfu UfcUfcCfcscsc	99	Hs/Mm
AD- 62950 .2	CfsusUfuUfcAfaUfGfGfgUfg UfcCfuAfgAfL96	29	usCfsuAfgGfaCfaCfccaUfu GfaAfaAfgsusc	100	Hs/Mm
AD- 62955 .2	UfscsAfaUfgGfgUfGfUfcCfu AfgGfaAfcAfL96	30	usGfsuUfcCfuAfgGfacaCfc CfaUfuGfasasa	101	Hs/Mm
AD- 62960 .2	UfsusGfaCfuUfuUfCfAfaUfg GfgUfgUfcAfL96	31	usGfsaCfaCfcCfaUfugaAfa AfgUfcAfasasa	102	Hs/Mm
AD- 62965 .2	AfsasAfgUfcAfuCfGfAfcAfaG faCfaUfuAfL96	32	usAfsaUfgUfcUfuGfucgAf uGfaCfuUfuscsa	103	Hs/Mm

- 129 -

AD- 62970 .2	CfsasGfgGfgGfaGfAfAfaGfg UfgUfuCfaAfL96	33	usUfsgAfaCfaCfcUfuucUfc CfcCfcUfgsgsa	104	Hs/Mm
AD- 62935 .2	CfsasUfuGfgUfgAfGfGfaAfa AfaUfcCfuUfL96	34	asAfsgGfaUfuUfuUfccuCfa CfcAfaUfsgsusc	105	Hs/Mm
AD- 62941 .2	AfscsAfuUfgGfuGfAfGfgAfa AfaAfuCfcUfL96	35	asGfsgAfuUfuUfuCfcucAfc CfaAfuGfuscsu	106	Hs/Mm
AD- 62946 .2	AfsgsGfgGfgAfgAfAfAfgGfuG fuUfcAfaAfL96	36	usUfsuGfaAfcAfcCfuuuCfu CfcCfcCfusgsg	107	Hs/Mm
AD- 62951 .2	AfsusGfgUfgGfuAfAfUfuUfg UfgAfuUfuUfL96	37	asAfsaAfuCfaCfaAfauuAfc CfaCfcAfuscsc	108	Hs
AD- 62956 .2	GfsasCfuUfgCfaUfCfCfuGfgA faAfuAfuAfL96	38	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg CfaAfgUfcscsa	109	Hs
AD- 62961 .2	GfsgsAfaGfgGfaAfGfGfuAfg AfaGfuCfuUfL96	39	asAfsgAfcUfuCfuAfccuUfc CfcUfuCfcsasc	110	Hs
AD- 62966 .2	UfsgsUfcUfuCfuGfUfUfuAfg AfuUfuCfcUfL96	40	asGfsgAfaAfuCfuAfaacAfg AfaGfaCfasgsg	111	Hs

- 130 -

AD- 62971 .2	CfsusUfuGfgCfuGfUfUfuCfc AfaGfaUfcUfL96	41	asGfsaUfcUfuGfgAfaacAfg CfcAfaAfgsgsa	112	Hs
AD- 62936 .2	AfsasUfgUfgUfuUfGfGfgCfa AfcGfuCfaUfL96	42	asUfsgAfcGfuUfgCfccaAfa CfaCfaUfususu	113	Hs
AD- 62942 .2	UfsgsUfgAfcUfgUfGfGfaCfaC fcCfcUfuAfL96	43	usAfsaGfgGfgUfgUfccaCfa GfuCfaCfasasa	114	Hs
AD- 62947 .2	GfsasUfgGfgGfuGfCfCfaGfc UfaCfuAfuUfL96	44	asAfsuAfgUfaGfcUfggcAfc CfcCfaUfcscsa	115	Hs
AD- 62952 .2	GfsasAfaAfuGfuGfUfUfuGfg GfcAfaCfgUfL96	45	asCfsgUfuGfcCfcAfaacAfc AfuUfuUfcsasa	116	Hs
AD- 62957 .2	GfsgsCfuGfuUfuCfCfAfaGfa UfcUfgAfcAfL96	46	usGfsuCfaGfaUfcUfuggAf aAfcAfgCfcsasa	117	Hs
AD- 62962 .2	UfscsCfaAfcAfaAfAfUfaGfcC faCfcCfcUfL96	47	asGfsgGfgUfgGfcUfauuUf uGfuUfgGfasasa	118	Hs
AD- 62967 .2	GfsusCfuUfcUfgUfUfUfaGfa UfuUfcCfuUfL96	48	asAfsgGfaAfaUfcUfaaaCfa GfaAfgAfcsasg	119	Hs

- 131 -

AD- 62972 .2	UfsgsGfaAfgGfgAfaGfgUfa GfaAfgUfcUfL96	49	asGfsaCfuUfcUfaCfcuuCfc CfuUfcCfascsa	120	Hs
AD- 62937 .2	UfscsCfuUfuGfgCfUfGfuUfu CfcAfaGfaUfL96	50	asUfscUfuGfgAfaAfcagCfc AfaAfgGfasusu	121	Hs
AD- 62943 .2	CfsasUfcUfcUfcAfGfCfuGfgG faUfgAfuAfL96	51	usAfsuCfaUfcCfcAfgcuGfa GfaGfaUfgsgsg	122	Hs
AD- 62948 .2	GfsgsGfgUfgCfcAfGfCfuAfcU faUfuGfaUfL96	52	asUfscAfaUfaGfuAfgcuGfg CfaCfcCfcsasu	123	Hs
AD- 62953 .2	AfsusGfuGfuUfuGfGfGfcAfa CfgUfcAfuAfL96	53	usAfsuGfaCfgUfuGfcccAfa AfcAfcAfususu	124	Hs
AD- 62958 .2	CfsusGfuUfuAfgAfUfUfuCfc UfuAfaGfaAfL96	54	usUfscUfuAfaGfgAfaauCf uAfaAfcAfgsasa	125	Hs
AD- 62963 .2	AfsgsAfaAfgAfaAfUfGfgAfcU fuGfcAfuAfL96	55	usAfsuGfcAfaGfuCfcuUf uCfuUfuCfusasg	126	Hs
AD- 62968 .2	GfscsAfuCfcUfgGfAfaUfaU faUfuAfaAfL96	56	usUfsuAfaUfaUfaUfuucCf aGfgAfuGfcsasa	127	Hs

- 132 -

AD- 62973 .2	CfscsUfgUfcAfgAfCfCfaUfgG fgAfaCfuAfL96	57	usAfsGufuCfcCfaUfgguCfu GfaCfaGfgscsu	128	Hs
AD- 62938 .2	AfsasAfcAfuGfgUfGfUfgGfa UfgGfgAfuAfL96	58	usAfsuCfcCfaUfcCfacaCfc AfuGfuUfusasa	129	Hs
AD- 62974 .2	CfsusCfaGfgAfuGfAfAfaAfaU fuUfuGfaAfL96	59	usUfscAfaAfaUfuUfuucAf uCfcUfgAfgsusu	130	Hs
AD- 62978 .2	CfsasGfcAfuGfuAfUfUfaCfu UfgAfcAfaAfL96	60	usUfsuGfuCfaAfgUfaauAf cAfuGfcUfgsasa	131	Hs
AD- 62982 .2	UfsasUfgAfaCfaAfCfAfuGfcU faAfaUfcAfL96	61	usGfsaUfuUfaGfcAfuguUf gUfuCfaUfasasu	132	Hs
AD- 62986 .2	AfsusAfuAfuCfcAfAfAfuGfu UfuUfaGfgAfL96	62	usCfscUfaAfaAfcAfuuuGfg AfuAfuAfususc	133	Hs
AD- 62990 .2	CfscsAfgAfuGfgAfAfGfcUfgU faUfcCfaAfL96	63	usUfsgGfaUfaCfaGfcuuCfc AfuCfuGfgsasa	134	Hs
AD- 62994 .2	GfsasCfuUfuCfaUfCfCfuGfgA faAfuAfuAfL96	64	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg AfaAfgUfcscsa	135	Hs

- 133 -

AD- 62998 .2	CfscsCfcGfgCfuAfAfUfuUfgU faUfcAfaUfL96	65	asUfsuGfaUfaCfaAfauuAf gCfcGfgGfgsgsa	136	Hs
AD- 63002 .2	UfsusAfaAfcAfuGfGfCfuUfg AfaUfgGfgAfL96	66	usCfscCfaUfuCfaAfgccAfu GfuUfuAfasca	137	Hs
AD- 62975 .2	AfsasUfgUfgUfuUfAfGfaCfa AfcGfuCfaUfL96	67	asUfsgAfcGfuUfgUfcuaAfa CfaCfaUfususu	138	Mm
AD- 62979 .2	AfscsUfaAfaGfgAfAfGfaAfuU fcCfgGfuUfL96	68	asAfscCfgGfaAfuUfcuuCfc UfuUfaGfusasu	139	Mm
AD- 62983 .2	UfsasUfaUfcCfaAfAfUfgUfu UfuAfgGfaUfL96	69	asUfscCfuAfaAfaCfauuUfg GfaUfaUfasusu	140	Mm
AD- 62987 .2	GfsusGfcGfgAfaAfGfGfcAfcU fgAfuGfuUfL96	70	asAfscAfuCfaGfuGfccuUfu CfcGfcAfcscasc	141	Mm
AD- 62991 .2	UfsasAfaAfcAfgUfGfGfuUfc UfuAfaAfuUfL96	71	asAfsuUfuAfaGfaAfccaCfu GfuUfuUfasasa	142	Mm
AD- 62995 .2	AfsusGfaAfaAfaUfUfUfuGfa AfaCfcAfgUfL96	72	asCfsuGfgUfuUfcAfaaaUf uUfuUfcAfuscsc	143	Mm

- 134 -

AD- 62999 .2	AfsasCfaAfaAfuAfGfCfaAfuC fcCfuUfuUfL96	73	asAfsaAfgGfgAfuUfgcuAfu UfuUfgUfusgsg	144	Mm
AD- 63003 .2	CfsusGfaAfaCfaGfAfUfcUfgU fcGfaCfuUfL96	74	asAfsgUfcGfaCfaGfaucUfg UfuUfcAfgscsa	145	Mm
AD- 62976 .2	UfsusGfuUfgCfaAfAfGfgGfc AfuUfuUfgAfL96	75	usCfsaAfaAfuGfcCfcuuUfg CfaAfcAfasusu	146	Mm
AD- 62980 .2	CfsusCfaUfuGfuUfUfAfuUfa AfcCfuGfuAfL96	76	usAfscAfgGfuUfaAfuaaAfc AfaUfgAfgsasusu	147	Mm
AD- 62984 .2	CfsasAfcAfaAfaUfAfGfcAfaU fcCfcUfuUfL96	77	asAfsaGfgGfaUfuGfcuaUf uUfuGfuUfgsgsa	148	Mm
AD- 62992 .2	CfsasUfuGfuUfuAfUfUfaAfc CfuGfuAfuUfL96	78	asAfsuAfcAfgGfuUfaauAfa AfcAfaUfgsasg	149	Mm
AD- 62996 .2	UfsasUfcAfgCfuGfGfGfaAfgA fuAfuCfaAfL96	79	usUfsgAfuAfuCfuUfcccAfg CfuGfaUfasgsa	150	Mm
AD- 63000 .2	UfsgsUfcCfuAfgGfAfAfcCfuU fuUfaGfaAfL96	80	usUfscUfaAfaAfgGfuucCfu AfgGfaCfascsc	151	Mm

- 135 -

AD- 63004 .2	UfscsCfaAfcAfaAfAfUfaGfcA faUfcCfcUfL96	81	asGfsgGfaUfuGfcUfauuUf uGfuUfgGfasasa	152	Mm
AD- 62977 .2	GfsgsUfgUfgCfGfAfAfaGfgC faCfuGfaUfL96	82	asUfscAfgUfgCfcUfuucCfG CfaCfaCfcscsc	153	Mm
AD- 62981 .2	UfsusGfaAfaCfcAfGfUfaCfu UfuAfuCfaUfL96	83	asUfsgAfuAfaAfgUfacuGfg UfuUfcAfasasa	154	Mm
AD- 62985 .2	UfsasCfuUfcCfaAfAfGfuCfuA fuAfuAfuAfL96	84	usAfsuAfuAfuAfgAfcuuUf gGfaAfgUfascsu	155	Mm
AD- 62989 .2	UfscsCfuAfgGfaAfCfCfuUfuU faGfaAfaUfL96	85	asUfsuUfcUfaAfaAfgguUfc CfuAfgGfascsa	156	Mm
AD- 62993 .2	CfsusCfcUfgAfgGfAfAfaAfuU fuUfgGfaAfL96	86	usUfscCfaAfaAfuUfuucCfu CfaGfgAfgsasa	157	Mm
AD- 62997 .2	GfscsUfcCfGfAfaAfUfGfuUfgC fuGfaAfaUfL96	87	asUfsuUfcAfgCfaAfcauUfc CfGfaGfcsasu	158	Mm
AD- 63001 .2	GfsusGfuUfuGfuGfGfGfgAfg AfcCfaAfuAfL96	88	usAfsuUfgGfuCfuCfcccAfc AfaAfcAfcasg	159	Mm

- 136 -

AD- 62933 .1	GfsasAfuGfuGfaAfAfGfuCfa UfcGfaCfaAfL96	160	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfuUfcsusg	277	
AD- 65630 .1	Y44gsasAfuGfuGfaAfAfGfuC faUfcGfaCfaAfL96	161	PusUfsgUfcGfaUfgAfcuuU fcAfcAfuUfcsusg	278	
AD- 65636 .1	gsasauguGfaAfAfGfucauCf gacaL96	162	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfuUfcsusg	279	
AD- 65642 .1	gsasauguGfaAfAfGfucaucg acaL96	163	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfuUfcsusg	280	
AD- 65647 .1	gsasauguGfaaAfGfucaucgac aaL96	164	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfuUfcsusg	281	
AD- 65652 .1	gsasauguGfaaaGfucaucGfac aaL96	165	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfuUfcsusg	282	
AD- 65657 .1	gsasaugugaaaGfucaucGfaca aL96	166	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfuUfcsusg	283	
AD- 65662 .1	gsasauguGfaaaGfucaucgaca aL96	167	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfuUfcsusg	284	

- 137 -

AD- 65625 .1	AfsusGfuGfaAfAfGfuCfaUfc GfaCfaAfL96	168	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfususc	285	
AD- 65631 .1	asusguGfaAfAfGfucaucgaca aL96	169	usUfsgucGfaugacuuUfcAf caususc	286	
AD- 65637 .1	GfsasAfuGfuGfaAfAfGfuCfa UfcGfaCfaAfL96	170	usUfsgucGfaUfgAfcuuUfc Afcauucsusg	287	
AD- 65643 .1	GfsasAfuGfuGfaAfAfGfuCfa UfcGfaCfaAfL96	171	usUfsgucGfaUfGfacuuUfc Afcauucsusg	288	
AD- 65648 .1	GfsasAfuGfuGfaAfAfGfuCfa UfcGfaCfaAfL96	172	usUfsgucGfaugacuuUfcAf cauucsusg	289	
AD- 65653 .1	GfsasAfuGfuGfaAfAfGfuCfa UfcGfaCfaAfL96	173	usUfsgucGfaugacuuUfcac auucsusg	290	
AD- 65658 .1	GfsasAfuGfuGfaAfAfGfuCfa UfcGfaCfaAfL96	174	usUfsgucgaugacuuUfcaca uucsusg	291	
AD- 65663 .1	gsasauguGfaAfAfGfucaucga caaL96	175	usUfsgucGfaUfgAfcuuUfc Afcauucsusg	292	

- 138 -

AD- 65626 .1	gsasauguGfaAfAfGfucaucga caal96	176	usUfsgucGfaUfGfacuuUfc Afcauucsusg	293	
AD- 65638 .1	gsasauguGfaaAfGfucaucgac aaL96	177	usUfsgucGfaUfgAfcuuUfc Afcauucsusg	294	
AD- 65644 .1	gsasauguGfaaAfGfucaucgac aaL96	178	usUfsgucGfaUfGfacuuUfc Afcauucsusg	295	
AD- 65649 .1	gsasauguGfaaAfGfucaucgac aaL96	179	usUfsgucGfaugacuuUfcAf cauucsusg	296	
AD- 65654 .1	gsasaugugaaagucau(Cgn)ga caal96	180	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfuUfcsusg	297	
AD- 65659 .1	gsasaugdTgaaagucau(Cgn)g acaaL96	181	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfuUfcsusg	298	
AD- 65627 .1	gsasaudGugaaadGucau(Cgn)gacaaL96	182	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfuUfcsusg	299	
AD- 65633 .1	gsasaugdTgaaadGucau(Cgn) gacaaL96	183	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfuUfcsusg	300	

- 139 -

AD- 65639 .1	gsasaugudGaaadGucau(Cgn)gacaal96	184	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfuUfcsusg	301	
AD- 65645 .1	gsasaugugaaadGucaucdGac aaL96	185	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfuUfcsusg	302	
AD- 65650 .1	gsasaugugaaadGucaucdTac aaL96	186	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfuUfcsusg	303	
AD- 65655 .1	gsasaugugaaadGucaucY34a caaL96	187	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfuUfcsusg	304	
AD- 65660 .1	gsasaugugaaadGucadTcdTa caaL96	188	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfuUfcsusg	305	
AD- 65665 .1	gsasaugugaaadGucaucdGad CaaL96	189	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfuUfcsusg	306	
AD- 65628 .1	gsasaugugaaadGucaucdTad CaaL96	190	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfuUfcsusg	307	
AD- 65634 .1	gsasaugugaaadGucaucY34a dCaaL96	191	usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUf cAfcAfuUfcsusg	308	

- 140 -

AD- 65646 .1	GfsasAfuGfuGfaAfAfGfuCfa UfcGfaCfaAfL96	192	usdTsgucgaugdAcuudTcac auucsusg	309	
AD- 65656 .1	GfsasAfuGfuGfaAfAfGfuCfa UfcGfaCfaAfL96	193	usUsgucgaugacuudTcacau ucsusg	310	
AD- 65661 .1	GfsasAfuGfuGfaAfAfGfuCfa UfcGfaCfaAfL96	194	usdTsgucdGaugacuudTca cauucsusg	311	
AD- 65666 .1	GfsasAfuGfuGfaAfAfGfuCfa UfcGfaCfaAfL96	195	usUsgucdGaugacuudTcac auucsusg	312	
AD- 65629 .1	GfsasAfuGfuGfaAfAfGfuCfa UfcGfaCfaAfL96	196	usdTsgucgaugacuudTcdAc auucsusg	313	
AD- 65635 .1	GfsasAfuGfuGfaAfAfGfuCfa UfcGfaCfaAfL96	197	usdTsgucdGaugacuudTcd Acauucsusg	314	
AD- 65641 .1	gsasaugugaaadGucau(Cgn)g acaal96	198	usdTsgucgaugdAcuudTcac auucsusg	315	
AD- 62994 .1	GfsasCfuUfuCfaUfCfCfuGfgA faAfuAfuAfL96	199	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg AfaAfgUfcscsa	316	

- 141 -

AD- 65595 .1	gsascuuuCfaUfCfCfuggaAfau auaL96	200	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg AfaAfgUfcscsa	317	
AD- 65600 .1	gsascuuuCfaUfCfCfuggaaaau auaL96	201	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg AfaAfgUfcscsa	318	
AD- 65610 .1	gsascuuuCfaucCfuggaaAfua uaL96	202	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg AfaAfgUfcscsa	319	
AD- 65615 .1	gsascuuucaucCfuggaaAfua aL96	203	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg AfaAfgUfcscsa	320	
AD- 65620 .1	gsascuuuCfaucCfuggaaaauau aL96	204	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg AfaAfgUfcscsa	321	
AD- 65584 .1	CfsusUfuCfaUfCfCfuGfgAfaA fuAfuAfL96	205	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg AfaAfgsusc	322	
AD- 65590 .1	csusuuCfaUfCfCfuggaaaauau aL96	206	usAfsuauUfuccaggaUfgAf aagsusc	323	
AD- 65596 .1	GfsasCfuUfuCfaUfCfCfuGfgA faAfuAfuAfL96	207	usAfsuauUfuCfcAfggaUfg Afaagucscsa	324	

- 142 -

AD- 65601 .1	GfsasCfuUfuCfaUfCfCfuGfgA faAfuAfuAfL96	208	usAfsuauUfuCfCfaggaUfg Afaagucscsa	325	
AD- 65606 .1	GfsasCfuUfuCfaUfCfCfuGfgA faAfuAfuAfL96	209	usAfsuauUfuccaggaUfgAf aagucscsa	326	
AD- 65611 .1	GfsasCfuUfuCfaUfCfCfuGfgA faAfuAfuAfL96	210	usAfsuauUfuccaggaUfgaa agucscsa	327	
AD- 65616 .1	GfsasCfuUfuCfaUfCfCfuGfgA faAfuAfuAfL96	211	usAfsuauuuccaggaUfgaaa gucscsa	328	
AD- 65621 .1	gsascuuuCfaUfCfCfuggaaaau aual96	212	usAfsuauUfuCfCfaggaUfg Afaagucscsa	329	
AD- 65585 .1	gsascuuuCfaUfCfCfuggaaaau aual96	213	usAfsuauUfuCfCfaggaUfg Afaagucscsa	330	
AD- 65591 .1	gsascuuuCfaUfCfCfuggaaaau aual96	214	usAfsuauUfuccaggaUfgAf aagucscsa	331	
AD- 65597 .1	gsascuuuCfauCfCfuggaaaau ual96	215	usAfsuauUfuCfCfaggaUfg Afaagucscsa	332	

- 143 -

AD- 65602 .1	gsascuuuCfauCfCfuggaaa uaL96	216	usAfsuauUfuCfCfaggaUfg Afaagucscsa	333	
AD- 65607 .1	gsascuuuCfauCfCfuggaaa uaL96	217	usAfsuauUfuccaggaUfgAf aagucscsa	334	
AD- 65612 .1	gsascuuucauccuggaa(Agn)u aual96	218	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg AfaAfgUfcscsa	335	
AD- 65622 .1	gsascuuucaucdCuggaa(Agn) uual96	219	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg AfaAfgUfcscsa	336	
AD- 65586 .1	gsascudTucaucdCuggaa(Agn)uual96	220	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg AfaAfgUfcscsa	337	
AD- 65592 .1	gsascuudTcaucdCuggaa(Agn)uual96	221	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg AfaAfgUfcscsa	338	
AD- 65598 .1	gsascuuudCaucdCuggaa(Ag n)uual96	222	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg AfaAfgUfcscsa	339	
AD- 65603 .1	gsascuuucaucdCuggaadAua uaL96	223	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg AfaAfgUfcscsa	340	

- 144 -

AD- 65608 .1	gsascuuucaucdCuggaadTua uaL96	224	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg AfaAfgUfcscsa	341	
AD- 65613 .1	gsascuuucaucdCuggaaY34u aual96	225	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg AfaAfgUfcscsa	342	
AD- 65618 .1	gsascuuucaucdCuggdAadTu aual96	226	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg AfaAfgUfcscsa	343	
AD- 65623 .1	gsascuuucaucdCuggaadTud AuaL96	227	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg AfaAfgUfcscsa	344	
AD- 65587 .1	gsascuuucaucdCuggaa(Agn) udAuaL96	228	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg AfaAfgUfcscsa	345	
AD- 65593 .1	gsascuudTcaucdCuggaadAu dAuaL96	229	usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfg AfaAfgUfcscsa	346	
AD- 65599 .1	GfsasCfuUfuCfaUfCfCfuGfgA faAfuAfuAfl96	230	usdAsuauuuccdAggadTga aagucscsa	347	
AD- 65604 .1	GfsasCfuUfuCfaUfCfCfuGfgA faAfuAfuAfl96	231	usdAsuauuuccaggadTgaa agucscsa	348	

- 145 -

AD- 65609 .1	GfsasCfuUfuCfaUfCfCfuGfgA faAfuAfuAfL96	232	usAsuauuuccaggadTgaaag ucscsa	349	
AD- 65614 .1	GfsasCfuUfuCfaUfCfCfuGfgA faAfuAfuAfL96	233	usdAsuaudTuccaggadTga aagucscsa	350	
AD- 65619 .1	GfsasCfuUfuCfaUfCfCfuGfgA faAfuAfuAfL96	234	usAsuaudTuccaggadTgaa agucscsa	351	
AD- 65624 .1	GfsasCfuUfuCfaUfCfCfuGfgA faAfuAfuAfL96	235	usdAsuauuuccaggadTgdA aagucscsa	352	
AD- 65588 .1	GfsasCfuUfuCfaUfCfCfuGfgA faAfuAfuAfL96	236	usdAsuaudTuccaggadTgd Aaagucscsa	353	
AD- 65594 .1	gsascuuucaucdCuggaa(Agn) uauaL96	237	usdAsuauuuccdAggadTga aagucscsa	354	
AD- 68309 .1	asgsaaagGfuGfUfUfcaagaug ucaL96	238	usGfsacaUfcUfUfgaacAfcC fuuucuscsc	355	
AD- 68303 .1	csasuccuGfgAfAfAfuaauua acuL96	239	asGfsuuaAfuAfUfauuuCfc Afggaugsasa	356	

- 146 -

AD- 65626 .5	gsasauguGfaAfAfGfucaucga caaL96	240	usUfsgucGfaUfGfacuuUfc Afcuuucsusg	357	
AD- 68295 .1	asgsugcaCfaAfUfAfuuuucca uaL96	241	usAfsuggGfaAfAfauauUfg Ufgcacusgsu	358	
AD- 68273 .1	gsasaaguCfaUfCfGfacaagaca uuL96	242	asAfsuguCfuUfGfucgaUfg Afcuuucsasc	359	
AD- 68297 .1	asasugugAfaAfGfUfcaucgac aaaL96	243	usUfsuguCfgAfUfgacuUfu Cfacauuscsu	360	
AD- 68287 .1	csusggaaAfuAfUfAfuaaacug uuaL96	244	usAfsacaGfuUfAfauauAfu Ufuccagsgsa	361	
AD- 68300 .1	asusuuucCfcAfUfCfuguauua uuuL96	245	asAfsauaAfuAfCfagauGfg Gfaaaausasu	362	
AD- 68306 .1	usgsucguUfcUfUfUfuccaaca aaaL96	246	usUfsuugUfuGfGfaaaaGfa Afcgacascsc	363	
AD- 68292 .1	asusccugGfaAfAfUfauauuaa cuaL96	247	usAfsguuAfaUfAfuaauUfc Cfaggausgsa	364	

- 147 -

AD- 68298 .1	gscsauuuUfgAfGfAfggugaug aual96	248	usAfsucaUfcAfCfcucuCfaA faaugcscsc	365	
AD- 68277 .1	csasggggGfaGfAfAfgguguu caal96	249	usUfsgaaCfaCfCfuucUfcC fccugsgsa	366	
AD- 68289 .1	gsgsaaauAfuAfUfUfaacuguu aaal96	250	usUfsuaaCfaGfUfuaauAfu Afuuuccsasg	367	
AD- 68272 .1	csasuuggUfgAfGfGfaaaaauc cuul96	251	asAfsggaUfuUfUfuccuCfa Cfcaaugsc	368	
AD- 68282 .1	gsgsgagaAfaGfGfUfguugaag aual96	252	usAfsucuUfgAfAfcaccUfu Ufcuccscsc	369	
AD- 68285 .1	gsgscauuUfuGfAfGfaggugau gauL96	253	asUfscauCfaCfCfucucAfaA faugccscsu	370	
AD- 68290 .1	usascaaaGfgGfUfGfucguucu uuul96	254	asAfsaagAfaCfGfacacCfcU fuuguasusu	371	
AD- 68296 .1	usgsggauCfuUfGfGfugucgaa ucaL96	255	usGfsauuCfGfCfaccAfgA fucccasusu	372	

- 148 -

AD- 68288 .1	csusgacaGfuGfCfAfcaauauu uuaL96	256	usAfsaaaUfaUfUfgugcAfc Ufgucagsasu	373	
AD- 68299 .1	csasgugcAfcAfAfUfauuuuccc auL96	257	asUfsgggAfaAfAfuaauuGfu Gfcacugsusc	374	
AD- 68275 .1	ascsuuuuCfaAfUfGfggugucc uaaL96	258	usUfsaggAfcAfCfccauUfgA faaaguscsa	375	
AD- 68274 .1	ascsauugGfuGfAfGfgaaaaau ccuL96	259	asGfsgauUfuUfUfccucAfc Cfaauguscsu	376	
AD- 68294 .1	ususgcuuUfuGfAfCfuuuuca ugaL96	260	usCfsauuGfaAfAfagucAfa Afagcaasusg	377	
AD- 68302 .1	csasuuuuGfaGfAfGfgugauga ugaL96	261	usCfsaucAfuCfAfccucUfcA faaugsccsc	378	
AD- 68279 .1	ususgacuUfuUfCfAfaugggug ucaL96	262	usGfsacaCfcCfAfuugaAfaA fgucaasasa	379	
AD- 68304 .1	csgsacuuCfuGfUfUfuuaggac agaL96	263	usCfsuguCfcUfAfaaacAfgA fagucgsasc	380	

- 149 -

AD- 68286 .1	csuscugaGfuGfGfGfugccaga aual96	264	usAfsuucUfgGfCfaccCfU fcagagscsc	381	
AD- 68291 .1	gsgsgugcCfaGfAfAfugugaaa gual96	265	usAfsuuUfCfCfauucUfg Gfcacccsasc	382	
AD- 68283 .1	uscsaaugGfgUfGfUfccuagga acaL96	266	usGfsuucCfuAfGfgacaCfcC fauugasasa	383	
AD- 68280 .1	asasagucAfuCfGfAfcaagacau uaL96	267	usAfsaugUfCfUfgucgAfu Gfacuuuscsa	384	
AD- 68293 .1	asusuuugAfgAfGfGfugaugau gcaL96	268	usGfscauCfaUfCfaccuCfuC faaaausgsc	385	
AD- 68276 .1	asuscgacAfaGfAfCfauuggug agaL96	269	usCfsucaCfcAfAfugucUfu Gfucgausgsa	386	
AD- 68308 .1	gsgsugccAfgAfAfUfgugaaag ucaL96	270	usGfsacuUfuCfAfcauuCfu Gfgcaccscsa	387	
AD- 68278 .1	gsascaguGfcAfCfAfauuuuu ccaL96	271	usGfsgaaAfaUfAfuuguGfc Afcugucsasg	388	

- 150 -

AD- 68307 .1	ascsaaagAfgAfCfAfcugugcag aaL96	272	usUfscugCfaCfAfguguCfuC fuuuguscsa	389	
AD- 68284 .1	ususuucaAfuGfGfGfuguccua ggaL96	273	usCfscuaGfgAfCfaccAfuU fgaaaasgsu	390	
AD- 68301 .1	cscsguuuCfcAfAfGfaucugaca guL96	274	asCfsuguCfaGfAfucuuGfg Afaacggscsc	391	
AD- 68281 .1	asgsggggAfgAfAfAfgguguuca aaL96	275	usUfsugaAfcAfCfcuuuCfu Cfccccusgsg	392	
AD- 68305 .1	asgsucauCfgAfCfAfagacauug guL96	276	asCfscaaUfgUfCfuuguCfgA fugacususu	393	

- 151 -

Bảng 2a. Các trình tự không được cải biến HAO1 (người và người/chuột)

Tên cặp đôi	SEQ ID NO:	Trình tự sợi có nghĩa	SEQ ID NO:	Trình tự sợi đối nghĩa	Vị trí trong NM_0175 45.2
AD- 62933	394	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	443	UUGUCGAUGACUUUCAC AUUCUG	1072- 1094
AD- 62939	395	UUUUCAAUGGGUGUCC UAGGA	444	UCCUAGGACACCCAUUGA AAAGU	1302- 1324
AD- 62944	396	GAAAGUCAUCGACAAGA CAUU	445	AAUGUCUUGUCGAUGAC UUUCAC	1078- 1100
AD- 62949	397	UCAUCGACAAGACAUUG GUGA	446	UCACCAAUGUCUUGUCG AUGACU	1083- 1105
AD- 62954	398	UUUCAAUGGGUGUCCU AGGAA	447	UUCCUAGGACACCCAUUG AAAAG	1303- 1325
AD- 62959	399	AAUGGGUGUCCUAGGA ACCUU	448	AAGGUUCCUAGGACACCC AUUGA	1307- 1329
AD- 62964	400	GACAGUGCACAAUAUU UUCCA	449	UGGAAAAUAUUGUGCAC UGUCAG	1134- 1156_C2 1A
AD- 62969	401	ACUUUUCAAUGGGUGU CCUAA	450	UUAGGACACCCAUUGAA AAGUCA	1300- 1322_G2 1A

- 152 -

AD- 62934	402	AAGUCAUCGACAAGACA UUGA	451	UCAAUGUCUUGUCGAUG ACUUUC	1080- 1102_G2 1A
AD- 62940	403	AUCGACAAGACAUUGG UGAGA	452	UCUCACCAAUGUCUUGU CGAUGA	1085- 1107_G2 1A
AD- 62945	404	GGGAGAAAGGUGUUCA AGAUA	453	UAUCUUGAACACCUUUC UCCCCC	996- 1018_G2 1A
AD- 62950	405	CUUUUCAAUGGGUGUC CUAGA	454	UCUAGGACACCCAUUGAA AAGUC	1301- 1323_G2 1A
AD- 62955	406	UCAAUGGGUGUCCUAG GAACA	455	UGUUCCUAGGACACCCAU UGAAA	1305- 1327_C2 1A
AD- 62960	407	UUGACUUUUCAAUGGG UGUCA	456	UGACACCCAUUGAAAAG UCAAAA	1297- 1319_C2 1A
AD- 62965	408	AAAGUCAUCGACAAGAC AUUA	457	UAAUGUCUUGUCGAUGA CUUUCA	1079- 1101_G2 1A
AD- 62970	409	CAGGGGGAGAAAGGUG UUCAA	458	UUGAACACCUUUCUCCCC CUGGA	992-1014
AD- 62935	410	CAUUGGUGAGGAAAAA UCCUU	459	AAGGAUUUUUCCUCACC AAUGUC	1095- 1117

- 153 -

AD- 62941	411	ACAUUGGUGAGGAAAA AUCCU	460	AGGAUUUUUCCUCACCA AUGUCU	1094- 1116
AD- 62946	412	AGGGGGAGAAAGGUGU UCAA	461	UUUGAACACCUUUCUCCC CCUGG	993- 1015_G2 1A
AD- 62974	413	CUCAGGAUGAAAAAUU UUGAA	462	UUCAAAAUUUUUCAUCC UGAGUU	563-585
AD- 62978	414	CAGCAUGUAUUACUUG ACAAA	463	UUUGUCAAGUAAUACAU GCUGAA	1173- 1195
AD- 62982	415	UAUGAACACAUGCUGAA AUCA	464	UGAUUUAGCAUGUUGUU CAUAAU	53-75
AD- 62986	416	AUAUAUCCAAAUGUUU UAGGA	465	UCCUAAAACAUUUGGAU AUAUUC	1679- 1701
AD- 62990	417	CCAGAUGGAAGCUGUA UCCAA	466	UUGGAUACAGCUUCCAU CUGGAA	156-178
AD- 62994	418	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	467	UAUAUUUCCAGGAUGAA AGUCCA	1341- 1363
AD- 62998	419	CCCCGGCUAAUUUGUA UCAAU	468	AUUGAUACAAAUUAGCC GGGGGA	29-51
AD- 63002	420	UUAAACAUGGCUUGAA UGGGA	469	UCCCAUUCAAGCCAUGU UUAACA	765-787
AD- 62975	421	AAUGUGUUUAGACAAC GUCAU	470	AUGACGUUGUCUAAACA CAUUUU	1388- 1410
AD- 62979	422	ACUAAAGGAAGAAUCC GGUU	471	AACCGGAUUCUCCUU UAGUAU	1027- 1049

- 154 -

AD- 62983	423	UAUAUCCAAAUGUUUU AGGAU	472	AUCCUAAAACAUUUGGA UAUAUU	1680- 1702
AD- 62987	424	GUGCGGAAAGGCACUG AUGUU	473	AACAUCAGUGCCUUUCCG CACAC	902-924
AD- 62991	425	UAAAACAGUGGUUCUU AAAUU	474	AAUUUAAGAACCACUGU UUUAAA	1521- 1543
AD- 62995	426	AUGAAAAUUUUGAAA CCAGU	475	ACUGGUUUCAAAAUUUU UCAUCC	569-591
AD- 62999	427	AACAAAUAAGCAAUCCC UUUU	476	AAAAGGGAUUGCUAUUU UGUUGG	1264- 1286
AD- 63003	428	CUGAAACAGAUCUGUC GACUU	477	AAGUCGACAGAUCUGUU UCAGCA	195-217
AD- 62976	429	UUGUUGCAAAGGGCAU UUUGA	478	UCAAAAUGCCCUUUGCAA CAAUU	720-742
AD- 62980	430	CUCAUUGUUUAUUAAC CUGUA	479	UACAGGUUAAUAAACAA UGAGAU	1483- 1505
AD- 62984	431	CAACAAAUAAGCAAUCC CUUU	480	AAAGGGAUUGCUAUUUU GUUGGA	1263- 1285
AD- 62992	432	CAUUGUUUAUUAACCU GUAUU	481	AAUACAGGUUAAUAAAC AAUGAG	1485- 1507
AD- 62996	433	UAUCAGCUGGGAAGAU AUCAA	482	UUGAUUAUCUUCCCAGCU GAUAGA	670-692
AD- 63000	434	UGUCCUAGGAACCUUU UAGAA	483	UUCUAAAAGGUUCCUAG GACACC	1313- 1335

- 155 -

AD- 63004	435	UCCAACAAAUAAGCAAU CCCU	484	AGGGAUUGCUAUUUUGU UGGAAA	1261- 1283
AD- 62977	436	GGUGUGCGGAAAGGCA CUGAU	485	AUCAGUGCCUUUCCGCAC ACCCC	899-921
AD- 62981	437	UUGAAACCAGUACUUU AUCAU	486	AUGAUAAAGUACUGGUU UCAAAA	579-601
AD- 62985	438	UACUUCCAAAGUCUAU AUAUA	487	UAUAUAUAGACUUUGGA AGUACU	75- 97_G21A
AD- 62989	439	UCCUAGGAACCUUUUA GAAAU	488	AUUUCUAAAAGGUUCCU AGGACA	1315- 1337_G2 1U
AD- 62993	440	CUCCUGAGGAAAAUUU UGGAA	489	UUCCAAAAUUUCCUCA GGAGAA	603- 625_G21 A
AD- 62997	441	GCUCCGGAAUGUUGCU GAAAU	490	AUUUCAGCAACAUUCCG GAGCAU	181- 203_C21 U
AD- 63001	442	GUGUUUGUGGGGAGAC CAAUA	491	UAUUGGUCUCCCCACAAA CACAG	953- 975_C21 A

- 156 -

Bảng 2b. Các trình tự không được cải biến HAO1 (ở chuột)

Tên cặp đôi	SEQ ID NO:	Trình tự sợi có nghĩa	SEQ ID NO:	Trình tự sợi đối nghĩa	Vị trí trong NM_0104 03.2
AD- 6295 1	492	AUGGUGGUAUUUGUG AUUUU	514	AAAAUCACAAUUACCA CCAUCC	1642-1664
AD- 6295 6	493	GACUUGCAUCCUGGAA AUAUA	515	UAUAUUUCCAGGAUGC AAGUCCA	1338-1360
AD- 6296 1	494	GGAAGGGAAGGUAGAA GUCUU	516	AAGACUUCUACCUUCCC UUCCAC	864-886
AD- 6296 6	495	UGUCUUCUGUUUAGAU UUCCU	517	AGGAAAUCUAAACAGAA GACAGG	1506-1528
AD- 6297 1	496	CUUUGGCUGUUUCCAA GAUCU	518	AGAUCUUGGAAACAGCC AAAGGA	1109-1131
AD- 6293 6	497	AAUGUGUUUGGGCAAC GUCAU	519	AUGACGUUGCCCAAACA CAUUUU	1385-1407
AD- 6294 2	498	UGUGACUGUGGACACC CCUUA	520	UAAGGGGUGUCCACAG UCACAAA	486-508

- 157 -

AD- 6294 7	499	GAUGGGGUGCCAGCUA CUAUU	521	AAUAGUAGCUGGCACCC CAUCCA	814-836
AD- 6295 2	500	GAAAAUGUGUUUGGGC AACGU	522	ACGUUGCCCAAACACAU UUUCAA	1382-1404
AD- 6295 7	501	GGCUGUUUCCAAGAUC UGACA	523	UGUCAGAUCUUGGAAA CAGCCAA	1113-1135
AD- 6296 2	502	UCCAACAAAAUAGCCAC CCCU	524	AGGGGUGGCUAUUUUG UUGGAAA	1258-1280
AD- 6296 7	503	GUCUUCUGUUUAGAUU UCCUU	525	AAGGAAAUCUAAACAGA AGACAG	1507-1529
AD- 6297 2	504	UGGAAGGGAAGGUAGA AGUCU	526	AGACUUCUACCUUCCCU UCCACA	863-885
AD- 6293 7	505	UCCUUUGGCUGUUUCC AAGAU	527	AUCUUGGAAACAGCCAA AGGAUU	1107-1129
AD- 6294 3	506	CAUCUCUCAGCUGGGA UGAUA	528	UAUCAUCCCAGCUGAGA GAUGGG	662-684

- 158 -

AD- 6294 8	507	GGGGUGCCAGCUACUA UUGAU	529	AUCAAUAGUAGCUGGCA CCCCAU	817-839
AD- 6295 3	508	AUGUGUUUGGGCAACG UCAUA	530	UAUGACGUUGCCCAAAC ACAUUU	1386- 1408_C21 A
AD- 6295 8	509	CUGUUUAGAUUCCUU AAGAA	531	UUCUUAAGGAAAUCUA AACAGAA	1512- 1534_C21 A
AD- 6296 3	510	AGAAAGAAAUGGACUU GCAUA	532	UAUGCAAGUCCAUUUCU UUCUAG	1327- 1349_C21 A
AD- 6296 8	511	GCAUCCUGGAAAUAUA UUAAA	533	UUUAAUAUAUUUCCAG GAUGCAA	1343- 1365_C21 A
AD- 6297 3	512	CCUGUCAGACCAUGGGA ACUA	534	UAGUUCCCAUGGUCUG ACAGGCU	308- 330_G21A
AD- 6293 8	513	AAACAUGGUGUGGAUG GGAUA	535	UAUCCCAUCCACACCAU GUUUAA	763- 785_C21A

- 159 -

Bảng 2c: Các trình tự không được cải biến HAO1 khác

Tên cặp đôi	SEQ ID NO:	Trình tự sợi có nghĩa	SEQ ID NO:	Trình tự sợi đối nghĩa	Vị trí trong NM_017 545.2
AD- 62933.2	394	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	443	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 62939.2	395	UUUUCAAUGGGUGUCC UAGGA	444	UCCUAGGACACCCAUGAA AAGU	1302- 1324
AD- 62944.2	396	GAAAGUCAUCGACAAG ACAUU	445	AAUGUCUUGUCGAUGACUU UCAC	1078- 1100
AD- 62949.2	397	UCAUCGACAAGACAUU GGUGA	446	UCACCAAUGUCUUGUCGAU GACU	1083- 1105
AD- 62954.2	398	UUUCA AUGGGUGUCCU AGGAA	447	UUCCUAGGACACCCAUGA AAAG	1303- 1325
AD- 62959.2	399	AAUGGGUGUCCUAGGA ACCUU	448	AAGGUUCCUAGGACACCCA UUGA	1307- 1329
AD- 62964.2	400	GACAGUGCACAAUAUU UUCCA	449	UGGAAAAUAUUGUGCACUG UCAG	1134- 1156_C 21A
AD- 62969.2	401	ACUUUUC A AUGGGUGU CCUAA	450	UUAGGACACCCAUGAAAA GUCA	1300- 1322_G 21A

- 160 -

AD- 62934.2	402	AAGUCAUCGACAAGAC AUUGA	451	UCAAUGUCUUGUCGAUGAC UUUC	1080- 1102_G 21A
AD- 62940.2	403	AUCGACAAGACAUUGG UGAGA	452	UCUCACCAAUGUCUUGUCG AUGA	1085- 1107_G 21A
AD- 62945.2	404	GGGAGAAAGGUGUUCA AGAUA	453	UAUCUUGAACACCUUUCUC CCCC	996- 1018_G 21A
AD- 62950.2	405	CUUUUCAAUGGGUGUC CUAGA	454	UCUAGGACACCCAUGAAA AGUC	1301- 1323_G 21A
AD- 62955.2	406	UCAAUGGGUGUCCUAG GAACA	455	UGUUCCUAGGACACCCAUU GAAA	1305- 1327_C 21A
AD- 62960.2	407	UUGACUUUCAAUGGG UGUCA	456	UGACACCCAUGAAAAGUC AAAA	1297- 1319_C 21A
AD- 62965.2	408	AAAGUCAUCGACAAGA CAUUA	457	UAAUGUCUUGUCGAUGACU UUCA	1079- 1101_G 21A
AD- 62970.2	409	CAGGGGGAGAAAGGUG UUCAA	458	UUGAACACCUUUCUCCCCCU GGA	992- 1014
AD- 62935.2	410	CAUUGGUGAGGAAAAA UCCUU	459	AAGGAUUUUUCCUCACCAA UGUC	1095- 1117

- 161 -

AD- 62941.2	411	ACAUUGGUGAGGAAAA AUCCU	460	AGGAUUUUUCCUCACCAAU GUCU	1094- 1116
AD- 62946.2	412	AGGGGGAGAAAGGUGU UCAA	461	UUUGAACACCUUUCUCCCC UGG	993- 1015_G 21A
AD- 62974.2	413	CUCAGGAUGAAAAAUU UUGAA	462	UUCAAAAUUUUUCAUCCUG AGUU	563-585
AD- 62978.2	414	CAGCAUGUAUUACUUG ACAAA	463	UUUGUCAAGUAAUACAUGC UGAA	1173- 1195
AD- 62982.2	415	UAUGAACAACAUGCUA AAUCA	464	UGAUUUAGCAUGUUGUUCA UAAU	53-75
AD- 62986.2	416	AUAUAUCCAAAUGUUU UAGGA	465	UCCUAAAACAUUUGGAUUA AUUC	1679- 1701
AD- 62990.2	417	CCAGAUGGAAGCUGUA UCCAA	466	UUGGAUACAGCUUCCAUCU GGAA	156-178
AD- 62994.2	418	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	467	UAUAUUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 62998.2	419	CCCCGGCUAAUUUGUA UCAAU	468	AUUGAUACAAAUUAGCCGG GGGA	29-51
AD- 63002.2	420	UUAACAUGGCUUGAA UGGGA	469	UCCCAUUCAAGCCAUGUUU AACA	765-787
AD- 62975.2	421	AAUGUGUUUAGACAAC GUCAU	470	AUGACGUUGUCUAAACACA UUUU	1388- 1410
AD- 62979.2	422	ACUAAAGGAAGAAUUC CGGUU	471	AACCGGAUUCUUCCUUUA GUAU	1027- 1049

- 162 -

AD- 62983.2	423	UAUAUCCAAAUGUUUU AGGAU	472	AUCCUAAAACAUUUGGAUA UAUU	1680- 1702
AD- 62987.2	424	GUGCGGAAAGGCACUG AUGUU	473	AACAUCAGUGCCUUUCCGC ACAC	902-924
AD- 62991.2	425	UAAAACAGUGGUUCUU AAAUU	474	AAUUUAAGAACCACUGUUU UAAA	1521- 1543
AD- 62995.2	426	AUGAAAAUUUUUGAAA CCAGU	475	ACUGGUUUCAAAAUUUUUC AUCC	569-591
AD- 62999.2	427	AACAAAUAAGCAAUCCC UUUU	476	AAAAGGGAUUGCUAUUUUG UUGG	1264- 1286
AD- 63003.2	428	CUGAAACAGAUCUGUC GACUU	477	AAGUCGACAGAUCUGUUUC AGCA	195-217
AD- 62976.2	429	UUGUUGCAAAGGGCAU UUUGA	478	UCAAAAUGCCCUUUGCAAC AAUU	720-742
AD- 62980.2	430	CUCAUUGUUUAUUAAC CUGUA	479	UACAGGUUAAUAAACAUG AGAU	1483- 1505
AD- 62984.2	431	CAACAAAUAAGCAAUCC CUUU	480	AAAGGGAUUGCUAUUUUG UUGGA	1263- 1285
AD- 62992.2	432	CAUUGUUUAUUAACCU GUAUU	481	AAUACAGGUUAAUAAACAA UGAG	1485- 1507
AD- 62996.2	433	UAUCAGCUGGGAAGAU AUCAA	482	UUGAUAUUCUUCCCAGCUGA UAGA	670-692
AD- 63000.2	434	UGUCCUAGGAACCUUU UAGAA	483	UUCUAAAAGGUUCCUAGGA CACC	1313- 1335

- 163 -

AD- 63004.2	435	UCCAACAAAAUAGCAAU CCCU	484	AGGGAUUGCUAUUUUGUU GGAAA	1261- 1283
AD- 62977.2	436	GGUGUGCGGAAAGGCA CUGAU	485	AUCAGUGCCUUUCCGCACAC CCC	899-921
AD- 62981.2	437	UUGAAACCAGUACUUU AUCAU	486	AUGAUAAAGUACUGGUUUC AAAA	579-601
AD- 62985.2	438	UACUUCCAAAGUCUUAU AUUAU	487	UAUAUAUAGACUUUGGAAG UACU	75- 97_G21 A
AD- 62989.2	439	UCCUAGGAACCUUUUA GAAAU	488	AUUUCUAAAAGGUUCCUAG GACA	1315- 1337_G 21U
AD- 62993.2	440	CUCCUGAGGAAAAUUU UGGAA	489	UUCCAAAAUUUCCUCAGG AGAA	603- 625_G2 1A
AD- 62997.2	441	GCUCCGGAAUGUUGCU GAAAU	490	AUUUCAGCAACAUUCCGGA GCAU	181- 203_C2 1U
AD- 63001.2	442	GUGUUUGUGGGGAGA CCAAUA	491	UAUUGGUCUCCCCACAAACA CAG	953- 975_C2 1A
AD- 62951.2	492	AUGGUGGUAAUUUGU GAUUUU	514	AAAUCACAAAUUACCACCA UCC	1642- 1664
AD- 62956.2	493	GACUUGCAUCCUGGAA AUUAU	515	UAUAUUUCCAGGAUGCAAG UCCA	1338- 1360

- 164 -

AD- 62961.2	494	GGAAGGGAAGGUAGAA GUCUU	516	AAGACUUCUACCUUCCCUUC CAC	864-886
AD- 62966.2	495	UGUCUUCUGUUUAGAU UUCCU	517	AGGAAAUCUAAACAGAAGA CAGG	1506- 1528
AD- 62971.2	496	CUUUGGCUGUUUCCAA GAUCU	518	AGAUCUUGGAAACAGCCAA AGGA	1109- 1131
AD- 62936.2	497	AAUGUGUUUGGGCAAC GUCAU	519	AUGACGUUGCCCAAACACA UUUU	1385- 1407
AD- 62942.2	498	UGUGACUGUGGACACC CCUUA	520	UAAGGGGUGUCCACAGUCA CAAA	486-508
AD- 62947.2	499	GAUGGGGUGCCAGCUA CUAUU	521	AAUAGUAGCUGGCACCCCA UCCA	814-836
AD- 62952.2	500	GAAAAUGUGUUUGGGC AACGU	522	ACGUUGCCCAAACACAUUU UCAA	1382- 1404
AD- 62957.2	501	GGCUGUUUCCAAGAUC UGACA	523	UGUCAGAUCUUGGAAACAG CCAA	1113- 1135
AD- 62962.2	502	UCCAACAAAUAAGCCAC CCCU	524	AGGGGUGGCUAUUUUGUU GGAAA	1258- 1280
AD- 62967.2	503	GUCUUCUGUUUAGAUU UCCUU	525	AAGGAAAUCUAAACAGAAG ACAG	1507- 1529
AD- 62972.2	504	UGGAAGGGAAGGUAGA AGUCU	526	AGACUUCUACCUUCCCUUCC ACA	863-885
AD- 62937.2	505	UCCUUUGGCUGUUUCC AAGAU	527	AUCUUGGAAACAGCCAAAG GAUU	1107- 1129

- 165 -

AD- 62943.2	506	CAUCUCUCAGCUGGGA UGAUA	528	UAUCAUCCCAGCUGAGAGA UGGG	662-684
AD- 62948.2	507	GGGGUGCCAGCUACUA UUGAU	529	AUCAAUAGUAGCUGGCACC CCAU	817-839
AD- 62953.2	508	AUGUGUUUGGGCAACG UCAUA	530	UAUGACGUUGCCCAAACAC AUUU	1386- 1408_C 21A
AD- 62958.2	509	CUGUUUAGAUUCCUU AAGAA	531	UUCUUAAGGAAAUCUAAAC AGAA	1512- 1534_C 21A
AD- 62963.2	510	AGAAAGAAAUGGACUU GCAUA	532	UAUGCAAGUCCAUUUCUUU CUAG	1327- 1349_C 21A
AD- 62968.2	511	GCAUCCUGGAAAUUA UUAUA	533	UUUAAUAUAUUUCCAGGAU GCAA	1343- 1365_C 21A
AD- 62973.2	512	CCUGUCAGACCAUGGG AACUA	534	UAGUUCCCAUGGUCUGACA GGCU	308- 330_G2 1A
AD- 62938.2	513	AAACAUGGUGUGGAUG GGAUA	535	UAUCCCAUCCACACCAUGUU UAA	763- 785_C2 1A
AD- 62933.1	536	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	653	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65630.1	537	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	654	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094

- 166 -

AD- 65636.1	538	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	655	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65642.1	539	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	656	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65647.1	540	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	657	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65652.1	541	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	658	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65657.1	542	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	659	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65662.1	543	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	660	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65625.1	544	AUGUGAAAGUCAUCGA CAA	661	UUGUCGAUGACUUUCACAU UC	1072- 1094
AD- 65631.1	545	AUGUGAAAGUCAUCGA CAA	662	UUGUCGAUGACUUUCACAU UC	1072- 1094
AD- 65637.1	546	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	663	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65643.1	547	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	664	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65648.1	548	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	665	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65653.1	549	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	666	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094

- 167 -

AD- 65658.1	550	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	667	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65663.1	551	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	668	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65626.1	552	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	669	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65638.1	553	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	670	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65644.1	554	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	671	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65649.1	555	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	672	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65654.1	556	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	673	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65659.1	557	GAAUGTGAAAGUCAUC GACAA	674	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65627.1	558	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	675	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65633.1	559	GAAUGTGAAAGUCAUC GACAA	676	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65639.1	560	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	677	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65645.1	561	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	678	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094

- 168 -

AD- 65650.1	562	GAAUGUGAAAGUCAUC TACAA	679	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65655.1	563	GAAUGUGAAAGUCAUC ACAA	680	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65660.1	564	GAAUGUGAAAGUCATC TACAA	681	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65665.1	565	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	682	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65628.1	566	GAAUGUGAAAGUCAUC TACAA	683	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65634.1	567	GAAUGUGAAAGUCAUC ACAA	684	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65646.1	568	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	685	UTGUCGAUGACUUTCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65656.1	569	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	686	UUGUCGAUGACUUTCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65661.1	570	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	687	UTGUCGAUGACUUTCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65666.1	571	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	688	UUGUCGAUGACUUTCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65629.1	572	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	689	UTGUCGAUGACUUTCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 65635.1	573	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	690	UTGUCGAUGACUUTCACAU UCUG	1072- 1094

- 169 -

AD- 65641.1	574	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	691	UTGUCGAUGACUUTCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 62994.1	575	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	692	UAUAUUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65595.1	576	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	693	UAUAUUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65600.1	577	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	694	UAUAUUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65610.1	578	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	695	UAUAUUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65615.1	579	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	696	UAUAUUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65620.1	580	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	697	UAUAUUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65584.1	581	CUUUCAUCCUGGAAAU AUA	698	UAUAUUUCCAGGAUGAAAG UC	1341- 1361
AD- 65590.1	582	CUUUCAUCCUGGAAAU AUA	699	UAUAUUUCCAGGAUGAAAG UC	1341- 1361
AD- 65596.1	583	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	700	UAUAUUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65601.1	584	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	701	UAUAUUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65606.1	585	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	702	UAUAUUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363

- 170 -

AD- 65611.1	586	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	703	UAUAAUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65616.1	587	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	704	UAUAAUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65621.1	588	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	705	UAUAAUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65585.1	589	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	706	UAUAAUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65591.1	590	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	707	UAUAAUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65597.1	591	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	708	UAUAAUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65602.1	592	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	709	UAUAAUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65607.1	593	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	710	UAUAAUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65612.1	594	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	711	UAUAAUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65622.1	595	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	712	UAUAAUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65586.1	596	GACUTUCAUCCUGGAA AUAUA	713	UAUAAUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65592.1	597	GACUUTCAUCCUGGAA AUAUA	714	UAUAAUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363

- 171 -

AD- 65598.1	598	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	715	UAUAUUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65603.1	599	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	716	UAUAUUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65608.1	600	GACUUUCAUCCUGGAA TUAUA	717	UAUAUUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65613.1	601	GACUUUCAUCCUGGAA UAUA	718	UAUAUUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65618.1	602	GACUUUCAUCCUGGAA TUAUA	719	UAUAUUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65623.1	603	GACUUUCAUCCUGGAA TUAUA	720	UAUAUUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65587.1	604	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	721	UAUAUUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65593.1	605	GACUUTCAUCCUGGAA AUAUA	722	UAUAUUUCCAGGAUGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65599.1	606	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	723	UAUAUUUCCAGGATGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65604.1	607	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	724	UAUAUUUCCAGGATGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65609.1	608	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	725	UAUAUUUCCAGGATGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65614.1	609	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	726	UAUAUTUCCAGGATGAAAG UCCA	1341- 1363

- 172 -

AD- 65619.1	610	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	727	UAUAUTUCCAGGATGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65624.1	611	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	728	UAUAUUUCCAGGATGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65588.1	612	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	729	UAUAUTUCCAGGATGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 65594.1	613	GACUUUCAUCCUGGAA AUAUA	730	UAUAUUUCCAGGATGAAAG UCCA	1341- 1363
AD- 68309.1	614	AGAAAGGUGUUCAAGA UGUCA	731	UGACAUCUUGAACACCUUU CUCC	1001- 1022_C 21A
AD- 68303.1	615	CAUCCUGGAAAUUAU UAACU	732	AGUUAUAUAUUUCCAGGA UGAA	1349- 1370
AD- 65626.5	616	GAAUGUGAAAGUCAUC GACAA	733	UUGUCGAUGACUUUCACAU UCUG	1072- 1094
AD- 68295.1	617	AGUGCACAAUAUUUUC CCAUA	734	UAUGGGAAAAUAUUGUGCA CUGU	1139- 1160_C 21A
AD- 68273.1	618	GAAAGUCAUCGACAAG ACAUU	735	AAUGUCUUGUCGAUGACUU UCAC	1080- 1100
AD- 68297.1	619	AAUGUGAAAGUCAUCG ACAAA	736	UUUGUCGAUGACUUUCACA UUCU	1075- 1096_G 21A
AD- 68287.1	620	CUGGAAAUUAUUAAC UGUUA	737	UACAGUAAUAUAUUUCC AGGA	1353- 1374

- 173 -

AD- 68300.1	621	AUUUUCCTAUCUGUAU UAUUU	738	AAUAAUACAGAUGGGAAA AUAU	1149- 1170
AD- 68306.1	622	UGUCGUUCUUUCCAA CAAAA	739	UUUUGUUGGAAAAGAACGA CACC	1252- 1273
AD- 68292.1	623	AUCCUGGAAAUUAUU AACUA	740	UAGUAAUAUAUUUCCAGG AUGA	1350- 1371_G 21A
AD- 68298.1	624	GCAUUUUGAGAGGUGA UGAUA	741	UAUCAUCACCUCUAAAAU GCCC	734- 755_G2 1A
AD- 68277.1	625	CAGGGGGAGAAAGGUG UUCAA	742	UUGAACACCUUUCUCCCCU GGA	994- 1014
AD- 68289.1	626	GGAAAUUAUUAACUG UUAAA	743	UUUAAAGUUAUAUAUUU CCAG	1355- 1376
AD- 68272.1	627	CAUUGGUGAGGAAAAA UCCUU	744	AAGGAUUUUUCCUCACCAA UGUC	1097- 1117
AD- 68282.1	628	GGGAGAAAGGUGUUCA AGAUA	745	UAUCUUGAACACCUUUCUC CCCC	998- 1018_G 21A
AD- 68285.1	629	GGCAUUUUGAGAGGUG AUGAU	746	AUCAUCACCUCUAAAAUGC CCU	733-754
AD- 68290.1	630	UACAAAGGGUGUCGUU CUUUU	747	AAAAGAACGACACCUUUG UAUU	1243- 1264
AD- 68296.1	631	UGGGAUCUUGGUGUC GAAUCA	748	UGAUUCGACACCAAGAUCCC AUU	783-804

- 174 -

AD- 68288.1	632	CUGACAGUGCACAAUA UUUUA	749	UAAAAUAUUGUGCACUGUC AGAU	1134- 1155_C 21A
AD- 68299.1	633	CAGUGCACAAUAUUUU CCCAU	750	AUGGGAAAAUAUUGUGCAC UGUC	1138- 1159
AD- 68275.1	634	ACUUUUCAAUGGGUGU CCUAA	751	UUAGGACACCCAUUGAAAA GUCA	1302- 1322_G 21A
AD- 68274.1	635	ACAUUGGUGAGGAAAA AUCCU	752	AGGAUUUUUCCUCACCAAU GUCU	1096- 1116
AD- 68294.1	636	UUGCUIIUUGACUUUUC AAUGA	753	UCAUUGAAAAGUCAAAAGC AAUG	1293- 1314_G 21A
AD- 68302.1	637	CAUUUUGAGAGGUGAU GAUGA	754	UCAUCAUCACCUCUCAAUAU GCC	735- 756_C2 1A
AD- 68279.1	638	UUGACUUUUCAAUGGG UGUCA	755	UGACACCCAUUGAAAAGUC AAAA	1299- 1319_C 21A
AD- 68304.1	639	CGACUUCUGUUUUAGG ACAGA	756	UCUGUCCUAAAACAGAAGU CGAC	212-233
AD- 68286.1	640	CUCUGAGUGGGUGCCA GAAUA	757	UAUUCUGGCACCCACUCAG AGCC	1058- 1079_G 21A

- 175 -

AD- 68291.1	641	GGGUGCCAGAAUGUGA AAGUA	758	UACUUUCACAUUCUGGCAC CCAC	1066- 1087_C 21A
AD- 68283.1	642	UCAAUGGGUGUCCUAG GAACA	759	UGUUCCUAGGACACCCAUU GAAA	1307- 1327_C 21A
AD- 68280.1	643	AAAGUCAUCGACAAGA CAUUA	760	UAAUGUCUUGUCGAUGACU UUCA	1081- 1101_G 21A
AD- 68293.1	644	AUUUUGAGAGGUGAU GAUGCA	761	UGCAUCAUCACCUCUCAAAA UGC	736- 757_C2 1A
AD- 68276.1	645	AUCGACAAGACAUUGG UGAGA	762	UCUCACCAAUGUCUUGUCG AUGA	1087- 1107_G 21A
AD- 68308.1	646	GGUGCCAGAAUGUGAA AGUCA	763	UGACUUUCACAUUCUGGCA CCCA	1067- 1088
AD- 68278.1	647	GACAGUGCACAAUAUU UUCCA	764	UGGAAAAUAUUGUGCACUG UCAG	1136- 1156_C 21A
AD- 68307.1	648	ACAAAGAGACACUGUG CAGAA	765	UUCUGCACAGUGUCUCUUU GUCA	1191- 1212_G 21A
AD- 68284.1	649	UUUUCAAUGGGUGUCC UAGGA	766	UCCUAGGACACCCAUUGAA AAGU	1304- 1324

AD- 68301.1	650	CCGUUUCCAAGAUCUG ACAGU	767	ACUGUCAGAUCUUGGAAAC GGCC	1121- 1142
AD- 68281.1	651	AGGGGGAGAAAGGUGU UCAA	768	UUUGAACACCUUUCUCCCC UGG	995- 1015_G 21A
AD- 68305.1	652	AGUCAUCGACAAGACA UUGGU	769	ACCAAUGUCUUGUCGAUGA CUUU	1083- 1104

Ví dụ 2. Sàng lọc liều lượng đơn lẻ *in vitro* ở tế bào gan khi sơ cấp.

Các cặp đôi siARN HAO1 được cải biến và được liên hợp được đánh giá về hiệu lực bằng thử nghiệm chuyển nạp ở tế bào gan khi sơ cấp. siARN HAO1 được chuyển nạp ở hai liều lượng, 10 nM và 0,1 nM. Kết quả của các thử nghiệm này được thể hiện trên Bảng 3 và dữ liệu được biểu diễn dưới dạng phân số của thông tin còn lại trong tế bào được chuyển nhiễm bằng siARN hướng đích HAO1, với tế bào được chuyển nhiễm bằng siARN đối chứng âm, AD-1955 ± độ lệch chuẩn (SD).

Kết quả cũng được thể hiện trên Hình 3A. Hình 3B minh họa đáp ứng liều lượng với một trong số các thể liên hợp có hoạt tính nhất (#31) (AD-62933) từ sàng lọc hai liều lượng sơ cấp; IC50 bằng ~19 pM.

Bảng 3a. Sàng lọc liều lượng đơn lẻ HAO1 ở tế bào gan khi.

ID CẶP ĐÔI	Loài	10nM PCH	0,1nM PCH	SD 10nM PCH	SD 0,1nM PCH
AD-62974	Hs	5,3	29,8	1,87	11,11
AD-62975	Hs	7,6	31,3	0,34	1,99
AD-62976	Hs	4,7	35,5	0,34	13,90
AD-62977	Hs	29,2	66,9	8,32	43,88
AD-62978	Hs	3,8	8,9	0,15	4,29

- 177 -

AD-62979	Hs	27,5	80,7	1,35	19,58
AD-62980	Hs	7,4	32,2	1,26	1,42
AD-62981	Hs	18,7	49,9	3,46	12,83
AD-62982	Hs	2,2	8,5	0,10	7,71
AD-62983	Hs	19,4	41,0	11,19	6,60
AD-62984	Hs	6,7	13,3	1,05	2,60
AD-62985	Hs	2,3	8,3	0,24	2,68
AD-62986	Hs	39,0	57,2	3,82	16,31
AD-62987	Hs	11,5	17,8	14,62	15,39
AD-62989	Hs	10,6	34,2	2,23	2,68
AD-62990	Hs	12,0	18,4	9,11	5,23
AD-62991	Hs	7,2	14,2	1,30	2,96
AD-62992	Hs	3,9	16,0	1,15	1,80
AD-62993	Hs	22,3	58,4	9,91	6,28
AD-62994	Hs	3,2	10,8	1,21	1,69
AD-62995	Hs	5,5	17,6	4,58	3,25
AD-62996	Hs	3,4	20,7	2,16	3,73
AD-62997	Hs	4,5	24,2	0,67	3,32
AD-62998	Hs	4,3	14,7	0,49	0,29
AD-62999	Hs	11,4	15,5	1,23	2,50
AD-63000	Hs	45,5	90,6	13,41	43,49
AD-63001	Hs	13,3	31,0	0,20	2,13
AD-63002	Hs	6,6	22,0	0,26	5,75

- 178 -

AD-63003	Hs	36,8	5,1	47,09	0,60
AD-63004	Hs	12,7	35,4	1,55	9,42
AD-62933	Hs/Mm	5,8	13,4	0,71	0,13
AD-62934	Hs/Mm	52,2	35,9	6,64	5,08
AD-62935	Hs/Mm	7,7	22,7	1,53	4,97
AD-62939	Hs/Mm	25,1	49,0	9,48	2,88
AD-62940	Hs/Mm	11,9	50,4	4,12	13,91
AD-62941	Hs/Mm	9,6	30,3	7,28	3,11
AD-62944	Hs/Mm	8,0	18,5	1,40	5,63
AD-62945	Hs/Mm	22,9	36,5	17,16	13,81
AD-62946	Hs/Mm	19,3	29,5	15,29	1,74
AD-62949	Hs/Mm	34,1	84,2	18,11	18,42
AD-62950	Hs/Mm	12,7	36,2	5,69	6,54
AD-62954	Hs/Mm	46,0	53,2	37,57	10,61
AD-62955	Hs/Mm	24,6	36,0	0,97	16,36
AD-62959	Hs/Mm	32,3	37,4	12,49	12,08
AD-62960	Hs/Mm	18,1	37,5	2,12	3,12
AD-62964	Hs/Mm	16,2	52,4	5,59	22,40
AD-62965	Hs/Mm	18,5	34,5	3,77	22,38
AD-62969	Hs/Mm	11,7	34,0	0,17	12,55
AD-62970	Hs/Mm	13,6	21,2	1,13	5,85
AD-62936	Mm	91,3	55,6	16,03	0,27
AD-62937	Mm	45,8	77,7	22,77	47,01

- 179 -

AD-62938	Mm	78,3	55,1	8,81	2,70
AD-62942	Mm	18,8	21,7	7,34	8,00
AD-62943	Mm	6,7	31,0	0,79	7,22
AD-62947	Mm	27,9	82,0	14,01	2,01
AD-62948	Mm	21,9	52,5	6,56	21,01
AD-62951	Mm	40,1	77,4	8,76	3,03
AD-62952	Mm	33,7	69,9	17,76	1,71
AD-62953	Mm	79,9	65,1	96,61	22,79
AD-62956	Mm	7,6	16,4	1,01	12,39
AD-62957	Mm	6,7	21,3	0,99	3,02
AD-62958	Mm	38,9	54,4	21,66	29,39
AD-62961	Mm	35,3	66,0	0,35	24,65
AD-62962	Mm	70,7	63,7	21,17	26,36
AD-62963	Mm	35,1	66,5	35,49	9,42
AD-62966	Mm	69,0	100,3	17,07	3,44
AD-62967	Mm	90,7	116,7	22,01	47,77
AD-62968	Mm	46,3	72,2	28,37	67,08
AD-62971	Mm	17,9	46,3	1,23	23,41
AD-62972	Mm	75,6	122,9	24,75	18,00
AD-62973	Mm	102,8	73,9	22,49	14,39

- 180 -

Bảng 3b. Sàng lọc liều lượng đơn lẻ HAO1 khác ở tế bào gan khỉ sơ cấp.

ID CẶP ĐÔI	Loài	10nM PCH	0,1nM PCH	SD 10nM PCH	SD 0,1nM PCH
AD-62974.2	Hs	5,3	29,8	1,87	11,11
AD-62975.2	Hs	7,6	31,3	0,34	1,99
AD-62976.2	Hs	4,7	35,5	0,34	13,90
AD-62977.2	Hs	29,2	66,9	8,32	43,88
AD-62978.2	Hs	3,8	8,9	0,15	4,29
AD-62979.2	Hs	27,5	80,7	1,35	19,58
AD-62980.2	Hs	7,4	32,2	1,26	1,42
AD-62981.2	Hs	18,7	49,9	3,46	12,83
AD-62982.2	Hs	2,2	8,5	0,10	7,71
AD-62983.2	Hs	19,4	41,0	11,19	6,60
AD-62984.2	Hs	6,7	13,3	1,05	2,60
AD-62985.2	Hs	2,3	8,3	0,24	2,68
AD-62986.2	Hs	39,0	57,2	3,82	16,31
AD-62987.2	Hs	11,5	17,8	14,62	15,39
AD-62989.2	Hs	10,6	34,2	2,23	2,68
AD-62990.2	Hs	12,0	18,4	9,11	5,23
AD-62991.2	Hs	7,2	14,2	1,30	2,96
AD-62992.2	Hs	3,9	16,0	1,15	1,80
AD-62993.2	Hs	22,3	58,4	9,91	6,28

- 181 -

AD-62994.2	Hs	3,2	10,8	1,21	1,69
AD-62995.2	Hs	5,5	17,6	4,58	3,25
AD-62996.2	Hs	3,4	20,7	2,16	3,73
AD-62997.2	Hs	4,5	24,2	0,67	3,32
AD-62998.2	Hs	4,3	14,7	0,49	0,29
AD-62999.2	Hs	11,4	15,5	1,23	2,50
AD-63000.2	Hs	45,5	90,6	13,41	43,49
AD-63001.2	Hs	13,3	31,0	0,20	2,13
AD-63002.2	Hs	6,6	22,0	0,26	5,75
AD-63003.2	Hs	36,8	5,1	47,09	0,60
AD-63004.2	Hs	12,7	35,4	1,55	9,42
AD-62933.2	Hs/Mm	5,8	13,4	0,71	0,13
AD-62934.2	Hs/Mm	52,2	35,9	6,64	5,08
AD-62935.2	Hs/Mm	7,7	22,7	1,53	4,97
AD-62939.2	Hs/Mm	25,1	49,0	9,48	2,88
AD-62940.2	Hs/Mm	11,9	50,4	4,12	13,91
AD-62941.2	Hs/Mm	9,6	30,3	7,28	3,11
AD-62944.2	Hs/Mm	8,0	18,5	1,40	5,63
AD-62945.2	Hs/Mm	22,9	36,5	17,16	13,81
AD-62946.2	Hs/Mm	19,3	29,5	15,29	1,74
AD-62949.2	Hs/Mm	34,1	84,2	18,11	18,42
AD-62950.2	Hs/Mm	12,7	36,2	5,69	6,54
AD-62954.2	Hs/Mm	46,0	53,2	37,57	10,61

- 182 -

AD-62955.2	Hs/Mm	24,6	36,0	0,97	16,36
AD-62959.2	Hs/Mm	32,3	37,4	12,49	12,08
AD-62960.2	Hs/Mm	18,1	37,5	2,12	3,12
AD-62964.2	Hs/Mm	16,2	52,4	5,59	22,40
AD-62965.2	Hs/Mm	18,5	34,5	3,77	22,38
AD-62969.2	Hs/Mm	11,7	34,0	0,17	12,55
AD-62970.2	Hs/Mm	13,6	21,2	1,13	5,85
AD-62936.2	Mm	91,3	55,6	16,03	0,27
AD-62937.2	Mm	45,8	77,7	22,77	47,01
AD-62938.2	Mm	78,3	55,1	8,81	2,70
AD-62942.2	Mm	18,8	21,7	7,34	8,00
AD-62943.2	Mm	6,7	31,0	0,79	7,22
AD-62947.2	Mm	27,9	82,0	14,01	2,01
AD-62948.2	Mm	21,9	52,5	6,56	21,01
AD-62951.2	Mm	40,1	77,4	8,76	3,03
AD-62952.2	Mm	33,7	69,9	17,76	1,71
AD-62953.2	Mm	79,9	65,1	96,61	22,79
AD-62956.2	Mm	7,6	16,4	1,01	12,39
AD-62957.2	Mm	6,7	21,3	0,99	3,02
AD-62958.2	Mm	38,9	54,4	21,66	29,39
AD-62961.2	Mm	35,3	66,0	0,35	24,65
AD-62962.2	Mm	70,7	63,7	21,17	26,36
AD-62963.2	Mm	35,1	66,5	35,49	9,42

AD-62966.2	Mm	69,0	100,3	17,07	3,44
AD-62967.2	Mm	90,7	116,7	22,01	47,77
AD-62968.2	Mm	46,3	72,2	28,37	67,08
AD-62971.2	Mm	17,9	46,3	1,23	23,41
AD-62972.2	Mm	75,6	122,9	24,75	18,00
AD-62973.2	Mm	102,8	73,9	22,49	14,39

Ví dụ 3. Sàng lọc liều lượng đơn lẻ *in vitro* ở tế bào gan chuột sơ cấp.

Các cặp đôi siARN HAO1 được cải biến và được liên hợp được đánh giá về hiệu lực bằng thử nghiệm chuyển nạp ở tế bào gan chuột sơ cấp. siARN HAO1 được chuyển nạp ở hai liều lượng, 20 nM và 0,2 nM. Kết quả của các thử nghiệm này được thể hiện trên Bảng 4 và dữ liệu được biểu diễn dưới dạng phân số của thông tin còn lại trong tế bào được chuyển nhiễm bằng siARN hướng đích HAO1, với tế bào được chuyển nhiễm bằng siARN đối chứng âm, AD-1955 ± độ lệch chuẩn (SD).

Bảng 4a. Sàng lọc liều lượng đơn lẻ HAO1 ở tế bào gan chuột sơ cấp.

ID CẶP ĐÔI	Loài	20nM PMH	0,2nM PMH	SD 20nM PMH	SD 0,2nM PMH
AD-62974	Hs	1,5	11,5	0,3	8,5
AD-62975	Hs	6,2	24,5	1,9	19,4
AD-62976	Hs	8,3	60,0	3,9	7,9
AD-62977	Hs	69,1	106,9	44,8	18,3
AD-62978	Hs	30,0	46,3	26,0	27,3
AD-62979	Hs	50,7	59,5	45,6	43,4
AD-62980	Hs	65,4	89,5	68,9	29,3

- 184 -

AD-62981	Hs	65,8	83,3	31,9	23,7
AD-62982	Hs	86,6	67,0	92,1	65,5
AD-62983	Hs	81,5	103,6	61,3	68,0
AD-62984	Hs	13,5	51,8	1,2	37,7
AD-62985	Hs	53,8	37,7	38,1	26,3
AD-62986	Hs	138,5	153,4	140,7	119,6
AD-62987	Hs	39,0	99,6	44,9	110,7
AD-62989	Hs	17,1	2,2	23,1	1,6
AD-62990	Hs	4,3	46,3	4,6	46,4
AD-62991	Hs	125,2	102,6	111,9	92,9
AD-62992	Hs	64,7	65,6	67,8	55,8
AD-62993	Hs	83,8	79,0	63,0	22,2
AD-62994	Hs	1,9	5,4	1,5	0,2
AD-62995	Hs	2,9	17,4	1,8	13,8
AD-62996	Hs	49,3	61,4	43,6	49,9
AD-62997	Hs	60,2	83,4	19,1	45,7
AD-62998	Hs	73,5	86,7	71,5	69,4
AD-62999	Hs	38,7	50,0	29,5	22,7
AD-63000	Hs	27,3	56,6	26,1	41,4
AD-63001	Hs	56,6	83,8	52,9	13,5
AD-63002	Hs	81,6	74,2	67,4	70,5
AD-63003	Hs	46,4	47,7	42,4	21,4
AD-63004	Hs	28,6	64,5	17,0	44,5

- 185 -

AD-62933	Hs/Mm	1,1	4,6	0,5	4,0
AD-62934	Hs/Mm	7,6	43,4	0,6	32,6
AD-62935	Hs/Mm	1,3	7,0	0,3	3,4
AD-62939	Hs/Mm	6,1	21,4	2,2	14,5
AD-62940	Hs/Mm	6,0	16,9	1,4	3,8
AD-62941	Hs/Mm	5,6	8,5	3,9	6,3
AD-62944	Hs/Mm	3,3	4,3	2,9	4,5
AD-62945	Hs/Mm	6,4	7,0	1,0	7,2
AD-62946	Hs/Mm	18,3	21,4	19,2	21,1
AD-62949	Hs/Mm	11,4	43,7	8,9	38,3
AD-62950	Hs/Mm	9,9	21,9	4,7	20,8
AD-62954	Hs/Mm	9,4	65,5	0,2	64,3
AD-62955	Hs/Mm	5,8	21,8	5,5	5,8
AD-62959	Hs/Mm	4,2	9,6	1,8	5,3
AD-62960	Hs/Mm	5,4	10,1	3,8	2,5
AD-62964	Hs/Mm	3,7	21,2	0,9	12,7
AD-62965	Hs/Mm	8,0	20,8	5,3	23,5
AD-62969	Hs/Mm	6,4	4,7	3,8	5,1
AD-62970	Hs/Mm	19,6	5,2	14,6	6,1
AD-62936	Mm	7,0	17,5	0,1	9,9
AD-62937	Mm	4,0	16,9	0,8	10,2
AD-62938	Mm	4,0	49,1	0,7	42,4
AD-62942	Mm	3,4	4,9	1,2	5,3

- 186 -

AD-62943	Mm	3,8	14,9	2,2	10,6
AD-62947	Mm	10,9	6,4	9,6	1,6
AD-62948	Mm	6,7	18,7	6,9	15,8
AD-62951	Mm	8,1	11,8	8,6	14,5
AD-62952	Mm	9,4	23,2	10,1	29,2
AD-62953	Mm	11,3	10,3	13,7	12,1
AD-62956	Mm	2,2	3,9	1,8	1,6
AD-62957	Mm	3,2	22,5	3,1	20,0
AD-62958	Mm	7,5	16,0	5,8	13,2
AD-62961	Mm	4,3	6,9	2,8	5,6
AD-62962	Mm	17,1	42,4	14,2	49,5
AD-62963	Mm	2,3	10,8	0,6	8,3
AD-62966	Mm	5,7	11,6	5,8	5,6
AD-62967	Mm	3,8	21,7	2,0	23,0
AD-62968	Mm	3,5	9,4	0,3	9,0
AD-62971	Mm	4,6	3,1	5,0	2,7
AD-62972	Mm	13,8	22,7	17,0	24,9
AD-62973	Mm	19,3	51,9	19,7	21,9

- 187 -

Bảng 4b. Sàng lọc liều lượng đơn lẻ HAO1 khác ở tế bào gan chuột sơ cấp.

ID CẶP ĐÔI	Loài	Tên oligo có nghĩa	20nM PMH	0,2nM PMH	SD 20nM PMH	SD 0,2nM PMH
AD-62974.2	Hs	A-126176.1	1,5	11,5	0,3	8,5
AD-62975.2	Hs	A-126192.1	6,2	24,5	1,9	19,4
AD-62976.2	Hs	A-126208.1	8,3	60,0	3,9	7,9
AD-62977.2	Hs	A-126224.1	69,1	106,9	44,8	18,3
AD-62978.2	Hs	A-126178.1	30,0	46,3	26,0	27,3
AD-62979.2	Hs	A-126194.1	50,7	59,5	45,6	43,4
AD-62980.2	Hs	A-126210.1	65,4	89,5	68,9	29,3
AD-62981.2	Hs	A-126226.1	65,8	83,3	31,9	23,7
AD-62982.2	Hs	A-126180.1	86,6	67,0	92,1	65,5
AD-62983.2	Hs	A-126196.1	81,5	103,6	61,3	68,0
AD-62984.2	Hs	A-126212.1	13,5	51,8	1,2	37,7
AD-62985.2	Hs	A-126228.1	53,8	37,7	38,1	26,3
AD-62986.2	Hs	A-126182.1	138,5	153,4	140,7	119,6
AD-62987.2	Hs	A-126198.1	39,0	99,6	44,9	110,7
AD-62989.2	Hs	A-126230.1	17,1	2,2	23,1	1,6
AD-62990.2	Hs	A-126184.1	4,3	46,3	4,6	46,4
AD-62991.2	Hs	A-126200.1	125,2	102,6	111,9	92,9
AD-62992.2	Hs	A-126216.1	64,7	65,6	67,8	55,8
AD-62993.2	Hs	A-126232.1	83,8	79,0	63,0	22,2

- 188 -

AD-62994.2	Hs	A-126186.1	1,9	5,4	1,5	0,2
AD-62995.2	Hs	A-126202.1	2,9	17,4	1,8	13,8
AD-62996.2	Hs	A-126218.1	49,3	61,4	43,6	49,9
AD-62997.2	Hs	A-126234.1	60,2	83,4	19,1	45,7
AD-62998.2	Hs	A-126188.1	73,5	86,7	71,5	69,4
AD-62999.2	Hs	A-126204.1	38,7	50,0	29,5	22,7
AD-63000.2	Hs	A-126220.1	27,3	56,6	26,1	41,4
AD-63001.2	Hs	A-126236.1	56,6	83,8	52,9	13,5
AD-63002.2	Hs	A-126190.1	81,6	74,2	67,4	70,5
AD-63003.2	Hs	A-126206.1	46,4	47,7	42,4	21,4
AD-63004.2	Hs	A-126222.1	28,6	64,5	17,0	44,5
AD-62933.2	Hs/Mm	A-126094.1	1,1	4,6	0,5	4,0
AD-62934.2	Hs/Mm	A-126110.1	7,6	43,4	0,6	32,6
AD-62935.2	Hs/Mm	A-126126.1	1,3	7,0	0,3	3,4
AD-62939.2	Hs/Mm	A-126096.1	6,1	21,4	2,2	14,5
AD-62940.2	Hs/Mm	A-126112.1	6,0	16,9	1,4	3,8
AD-62941.2	Hs/Mm	A-126128.1	5,6	8,5	3,9	6,3
AD-62944.2	Hs/Mm	A-126098.1	3,3	4,3	2,9	4,5
AD-62945.2	Hs/Mm	A-126114.1	6,4	7,0	1,0	7,2
AD-62946.2	Hs/Mm	A-126130.1	18,3	21,4	19,2	21,1
AD-62949.2	Hs/Mm	A-126100.1	11,4	43,7	8,9	38,3
AD-62950.2	Hs/Mm	A-126116.1	9,9	21,9	4,7	20,8
AD-62954.2	Hs/Mm	A-126102.1	9,4	65,5	0,2	64,3

- 189 -

AD-62955.2	Hs/Mm	A-126118.1	5,8	21,8	5,5	5,8
AD-62959.2	Hs/Mm	A-126104.1	4,2	9,6	1,8	5,3
AD-62960.2	Hs/Mm	A-126120.1	5,4	10,1	3,8	2,5
AD-62964.2	Hs/Mm	A-126106.1	3,7	21,2	0,9	12,7
AD-62965.2	Hs/Mm	A-126122.1	8,0	20,8	5,3	23,5
AD-62969.2	Hs/Mm	A-126108.1	6,4	4,7	3,8	5,1
AD-62970.2	Hs/Mm	A-126124.1	19,6	5,2	14,6	6,1
AD-62936.2	Mm	A-126142.1	7,0	17,5	0,1	9,9
AD-62937.2	Mm	A-126158.1	4,0	16,9	0,8	10,2
AD-62938.2	Mm	A-126174.1	4,0	49,1	0,7	42,4
AD-62942.2	Mm	A-126144.1	3,4	4,9	1,2	5,3
AD-62943.2	Mm	A-126160.1	3,8	14,9	2,2	10,6
AD-62947.2	Mm	A-126146.1	10,9	6,4	9,6	1,6
AD-62948.2	Mm	A-126162.1	6,7	18,7	6,9	15,8
AD-62951.2	Mm	A-126132.1	8,1	11,8	8,6	14,5
AD-62952.2	Mm	A-126148.1	9,4	23,2	10,1	29,2
AD-62953.2	Mm	A-126164.1	11,3	10,3	13,7	12,1
AD-62956.2	Mm	A-126134.1	2,2	3,9	1,8	1,6
AD-62957.2	Mm	A-126150.1	3,2	22,5	3,1	20,0
AD-62958.2	Mm	A-126166.1	7,5	16,0	5,8	13,2
AD-62961.2	Mm	A-126136.1	4,3	6,9	2,8	5,6
AD-62962.2	Mm	A-126152.1	17,1	42,4	14,2	49,5
AD-62963.2	Mm	A-126168.1	2,3	10,8	0,6	8,3

- 190 -

AD-62966.2	Mm	A-126138.1	5,7	11,6	5,8	5,6
AD-62967.2	Mm	A-126154.1	3,8	21,7	2,0	23,0
AD-62968.2	Mm	A-126170.1	3,5	9,4	0,3	9,0
AD-62971.2	Mm	A-126140.1	4,6	3,1	5,0	2,7
AD-62972.2	Mm	A-126156.1	13,8	22,7	17,0	24,9
AD-62973.2	Mm	A-126172.1	19,3	51,9	19,7	21,9

Ví dụ 4. Sàng lọc đáp ứng liều lượng ở tế bào gan khỉ sơ cấp.

IC50 của các cặp đôi siARN HAO1 được cải biến và được liên hợp được xác định ở tế bào gan khỉ sơ cấp. siARN HAO1 được chuyển nạp trong khoảng liều lượng của nồng độ cặp đôi cuối cùng từ 10nM đến 36fM qua các dịch pha loãng 8, 6 lần. Kết quả của các thử nghiệm này được thể hiện trên Bảng 5.

Bảng 5a. Sàng lọc đáp ứng liều lượng HAO1 ở tế bào gan chuột sơ cấp.

ID CẶP ĐÔI	Loài	IC50 PCH (nM)
AD-62984	Hs	0,017
AD-62994	Hs	0,029
AD-62989	Hs	0,175
AD-62974	Hs	0,288
AD-62975	Hs	0,399
AD-62933	Hs/Mm	0,019
AD-62944	Hs/Mm	0,027
AD-62935	Hs/Mm	0,137
AD-62965	Hs/Mm	0,155
AD-62941	Hs/Mm	0,245

AD-62940	Hs/Mm	0,927
----------	-------	-------

Bảng 5b. Sàng lọc đáp ứng liều lượng HAO1 khác ở tế bào gan chuột sơ cấp.

ID CẶP ĐÔI	Loài	IC50 PCH (nM)
AD-62984.2	Hs	0,017
AD-62994.2	Hs	0,029
AD-62989.2	Hs	0,175
AD-62974.2	Hs	0,288
AD-62975.2	Hs	0,399
AD-62933.2	Hs/Mm	0,019
AD-62944.2	Hs/Mm	0,027
AD-62935.2	Hs/Mm	0,137
AD-62965.2	Hs/Mm	0,155
AD-62941.2	Hs/Mm	0,245
AD-62940.2	Hs/Mm	0,927

Ví dụ 5. Sàng lọc đáp ứng liều lượng ở tế bào gan chuột sơ cấp.

IC50 của các cặp đôi siARN HAO1 được cải biến và được liên hợp được xác định ở tế bào gan chuột sơ cấp. siARN HAO1 được chuyển nạp trong khoảng liều lượng của nồng độ cặp đôi cuối cùng từ 10nM đến 36fM qua các dịch pha loãng 8, 6 lần. Kết quả của các thử nghiệm này được thể hiện trên Bảng 6.

Bảng 6a. Sàng lọc đáp ứng liều lượng HAO1 ở tế bào gan chuột sơ cấp.

ID CẶP ĐÔI	Loài	IC50 PMH (nM)
AD-62989	Hs	0,003
AD-62994	Hs	0,006
AD-62975	Hs	0,059
AD-62974	Hs	0,122
AD-62984	Hs	0,264
AD-62944	Hs/Mm	0,002
AD-62935	Hs/Mm	0,007
AD-62965	Hs/Mm	0,008
AD-62933	Hs/Mm	0,008
AD-62941	Hs/Mm	0,087
AD-62940	Hs/Mm	0,090

Bảng 6b. Sàng lọc đáp ứng liều lượng HAO1 khác ở tế bào gan chuột sơ cấp.

ID CẶP ĐÔI	Loài	IC50 PMH (nM)
AD-62989.2	Hs	0,003
AD-62994.2	Hs	0,006
AD-62975.2	Hs	0,059
AD-62974.2	Hs	0,122
AD-62984.2	Hs	0,264

AD-62944.2	Hs/Mm	0,002
AD-62935.2	Hs/Mm	0,007
AD-62965.2	Hs/Mm	0,008
AD-62933.2	Hs/Mm	0,008
AD-62941.2	Hs/Mm	0,087
AD-62940.2	Hs/Mm	0,090

Bảng 7. Sàng lọc liều lượng đơn lẻ HAO1 khác tế bào gan Cyno và chuột sơ cấp

ID cặp đôi	10nM PCH	0,1nM PCH	SD 10nM PCH	SD 0,1nM PCH	10nM PMH	0,1nM PMH	SD 10nM PMH	SD 0,1nM PMH
AD-62933.1	26,1	22,8	17,0	6,0	9,0	26,3	6,0	7,6
AD-65584.1	12,9	28,0	5,1	6,0	3,8	12,3	0,7	7,3
AD-65585.1	9,8	21,0	4,1	1,0	6,8	11,6	4,5	5,7
AD-65586.1	24,3	24,2	10,9	2,7	16,7	19,0	5,1	1,8
AD-65587.1	24,7	31,7	10,2	21,9	13,6	27,1	5,7	10,3
AD-65588.1	39,2	33,0	35,6	5,6	27,1	33,5	11,0	8,3

- 194 -

AD-65590.1	5,6	15,4	0,4	6,6	4,2	8,7	1,1	0,5
AD-65591.1	13,9	20,4	5,0	4,9	7,6	18,4	0,1	2,9
AD-65592.1	15,6	24,3	7,4	3,7	10,1	24,5	3,1	1,0
AD-65593.1	30,8	37,5	4,4	8,7	38,4	41,3	5,2	10,4
AD-65594.1	18,0	21,8	5,6	2,6	24,7	25,3	0,5	7,6
AD-65595.1	19,9	31,9	0,1	11,3	9,1	12,2	5,0	5,7
AD-65596.1	12,3	19,2	0,6	1,6	10,0	19,9	1,0	1,9
AD-65597.1	10,2	34,8	2,8	10,1	22,8	32,0	6,2	5,7
AD-65598.1	14,4	21,2	3,2	8,6	10,8	22,0	2,6	8,8
AD-65599.1	15,0	28,3	2,5	21,3	18,0	25,4	1,7	8,3
AD-65600.1	11,8	13,7	5,6	0,3	6,4	14,5	5,7	6,8
AD-65601.1	15,4	20,5	0,5	1,6	5,5	17,2	0,3	3,9
AD-65602.1	12,9	23,3	0,8	12,0	11,0	25,4	2,6	2,6

- 195 -

AD- 65603.1	33,8	41,0	2,2	6,8	37,4	58,6	3,0	10,5
AD- 65604.1	10,4	18,7	1,3	2,3	12,9	24,5	0,9	9,2
AD- 65606.1	14,3	12,3	0,2	3,1	4,8	14,0	2,0	4,2
AD- 65607.1	9,2	18,5	2,1	3,6	14,4	32,8	1,9	1,6
AD- 65608.1	36,6	31,1	7,9	11,6	27,5	29,8	8,5	4,6
AD- 65609.1	14,2	19,8	5,1	0,8	14,6	23,6	5,3	1,5
AD- 65610.1	59,1	59,6	15,0	13,3	35,0	70,9	10,0	0,1
AD- 65611.1	12,9	14,2	5,4	1,8	4,5	17,3	0,6	2,2
AD- 65612.1	19,3	20,5	1,5	9,0	16,2	23,3	3,8	1,7
AD- 65613.1	20,0	19,3	5,7	0,7	11,0	23,9	1,0	5,4
AD- 65614.1	12,4	27,1	2,2	0,5	14,2	16,7	3,8	11,9
AD- 65615.1	53,1	60,3	1,4	7,7	48,2	80,9	9,9	39,4
AD- 65616.1	21,7	12,5	17,8	5,5	5,3	13,3	0,5	7,2

- 196 -

AD- 65618.1	19,4	67,6	3,4	35,9	16,7	21,6	4,2	4,8
AD- 65619.1	17,0	27,2	0,5	12,4	12,5	26,3	3,2	2,3
AD- 65620.1	58,0	70,5	21,8	2,8	37,9	54,8	0,4	12,7
AD- 65621.1	12,3	17,5	4,6	2,3	3,8	11,3	1,3	0,3
AD- 65622.1	17,7	20,4	6,1	0,9	10,8	13,9	6,3	3,1
AD- 65623.1	44,4	32,9	7,9	Không áp dụng	37,7	20,6	28,5	0,9
AD- 65624.1	13,0	23,3	5,0	9,8	9,2	7,9	2,8	0,4
AD- 65625.1	9,8	13,3	0,6	1,5	10,0	19,2	4,6	1,6
AD- 65626.1	7,7	15,0	1,1	4,9	8,6	14,7	3,6	2,4
AD- 65627.1	18,8	24,8	7,8	1,8	19,7	18,5	8,1	12,0
AD- 65628.1	27,3	31,7	4,9	3,9	29,7	43,4	6,4	19,6
AD- 65629.1	12,8	20,8	1,0	8,1	18,9	23,2	3,2	13,9
AD- 65630.1	7,2	14,0	0,3	5,3	6,1	8,5	1,3	2,1

- 197 -

AD- 65631.1	6,7	17,2	0,7	5,7	12,0	23,1	4,0	0,9
AD- 65633.1	13,8	28,6	3,4	5,4	17,0	26,2	1,2	3,9
AD- 65634.1	12,2	23,6	6,6	1,2	21,6	35,2	1,4	8,2
AD- 65635.1	11,7	27,7	5,7	4,7	18,5	38,4	2,5	6,5
AD- 65636.1	13,1	29,4	0,6	12,9	21,3	35,6	3,1	13,1
AD- 65637.1	16,0	22,8	5,1	9,6	8,3	18,5	0,6	0,4
AD- 65638.1	11,5	15,9	4,3	2,1	20,8	31,8	3,5	3,2
AD- 65639.1	14,6	28,3	7,4	5,5	18,6	35,2	0,2	0,3
AD- 65641.1	32,3	49,3	3,4	8,9	29,1	34,0	4,8	8,8
AD- 65642.1	10,4	23,0	0,1	4,7	10,1	21,3	1,0	6,5
AD- 65643.1	12,6	13,7	0,3	2,5	5,3	20,6	1,8	6,8
AD- 65644.1	8,1	13,5	0,1	0,3	16,4	24,1	3,4	4,2
AD- 65645.1	69,5	88,7	6,3	26,6	81,8	75,5	13,6	5,8

- 198 -

AD-65646.1	8,9	47,0	0,9	15,6	26,5	37,7	3,7	4,7
AD-65647.1	11,0	14,0	2,9	0,3	16,6	23,7	2,6	0,7
AD-65648.1	7,3	25,4	3,3	2,9	5,9	13,9	2,1	0,9
AD-65649.1	11,6	23,0	1,9	3,4	20,7	29,8	2,1	3,6
AD-65650.1	27,9	40,6	13,1	14,0	27,6	30,6	9,7	6,8
AD-65652.1	73,4	72,2	5,2	1,8	47,6	59,7	7,5	21,4
AD-65653.1	9,6	32,4	2,7	4,7	5,9	24,3	0,0	6,7
AD-65654.1	41,6	45,5	10,4	11,7	22,8	35,7	2,9	3,1
AD-65655.1	19,2	18,3	0,1	4,8	17,8	18,8	3,8	3,9
AD-65656.1	10,8	16,1	4,7	3,1	6,2	13,8	1,6	1,8
AD-65657.1	107,8	114,5	8,7	6,7	36,3	51,2	1,6	14,1
AD-65658.1	9,6	13,5	0,7	1,3	4,8	11,7	0,2	3,3
AD-65659.1	17,5	39,8	1,1	1,4	13,0	24,6	3,5	3,3

- 199 -

AD- 65660.1	21,5	33,1	5,4	1,6	14,6	29,0	0,5	4,1
AD- 65661.1	13,9	40,1	2,2	12,8	13,2	27,3	6,8	7,1
AD- 65662.1	111,2	242,2	29,9	179,6	42,5	47,9	4,6	1,6
AD- 65663.1	11,5	28,2	3,8	Không áp dụng	5,5	7,6	1,4	0,1
AD- 65665.1	104,8	141,7	13,0	26,9	39,4	44,2	13,1	5,3
AD- 65666.1	14,4	28,1	6,9	1,8	3,8	12,7	0,3	4,8

Bảng 8. Sàng lọc liều lượng đơn lẻ khác ở tế bào gan cyno sơ cấp.

Cặp đôi	10nM PCH	10nM PCH SD	0,1nM PCH	0,1nM {CH SD
AD- 65626.5	7,1	0,7	23,5	3,7
AD- 68272.1	10,1	1,9	39,5	10,3
AD- 68273.1	6,8	2,2	29,7	10,1
AD- 68274.1	15,7	4,7	49,4	12,1
AD- 68275.1	15,5	2,7	47,4	10,4

- 200 -

AD- 68276.1	22,3	8,1	83,0	21,7
AD- 68277.1	14,2	1,1	25,2	7,9
AD- 68278.1	18,6	3,2	97,5	25,4
AD- 68279.1	14,7	3,8	62,5	19,6
AD- 68280.1	24,9	2,6	54,7	8,1
AD- 68281.1	38,3	18,6	70,7	8,8
AD- 68282.1	11,3	3,1	35,9	3,6
AD- 68283.1	14,4	3,6	79,9	26,5
AD- 68284.1	25,1	4,7	82,3	8,2
AD- 68285.1	10,4	1,3	39,3	10,3
AD- 68286.1	14,7	4,5	71,9	18,3
AD- 68287.1	8,0	2,3	28,4	3,5

- 201 -

AD- 68288.1	14,8	3,5	31,7	6,3
AD- 68289.1	11,8	2,5	30,8	3,5
AD- 68290.1	11,5	4,9	40,3	8,4
AD- 68291.1	15,8	6,3	69,9	6,6
AD- 68292.1	9,8	3,0	37,3	20,7
AD- 68293.1	20,2	6,1	85,2	20,8
AD- 68294.1	12,9	5,0	68,7	21,6
AD- 68295.1	7,5	1,4	22,6	3,9
AD- 68296.1	8,5	1,1	51,3	7,0
AD- 68297.1	8,2	2,4	27,4	4,0
AD- 68298.1	10,1	2,8	35,6	10,4
AD- 68299.1	11,8	2,4	47,7	16,2

- 202 -

AD- 68300.1	7,2	1,7	33,8	4,6
AD- 68301.1	34,2	14,3	78,3	25,8
AD- 68302.1	15,6	5,8	57,1	10,0
AD- 68303.1	7,0	2,0	23,9	4,5
AD- 68304.1	14,8	2,4	64,2	12,1
AD- 68305.1	25,3	3,8	106,5	23,8
AD- 68306.1	12,4	2,0	19,8	1,8
AD- 68307.1	22,2	8,9	93,1	22,6
AD- 68308.1	22,2	4,0	79,6	7,8
AD- 68309.1	8,0	2,7	19,9	3,7

Ví dụ 6. Sự đánh giá in vivo của thể liên hợp GO-GalNAc ở chuột C57B6

Thể liên hợp GO-GalNAc được dùng liều lượng dưới da ở chuột C57B6 ở 10, 5, 2,5, hoặc 1,25 mg/kg và sự bất hoạt mARN ở gan được đánh giá sau 72 giờ sau khi dùng liều lượng bằng cách sử dụng qPCR. ED50 liều lượng đơn lẻ bằng xấp xỉ 1,25 và 2,5 mg/kg lần lượt đối với hợp chất A (AD-62994) và hợp chất B (AD-62933). Trong các nghiên cứu liều

- 203 -

lượng lặp lại thể liên hợp được dùng liều lượng dưới da hàng tuần (QW) trong thời gian 4 tuần và hàm lượng mARN GO ở gan được đánh giá vào 72 giờ sau liều thứ 4. ED50 liều lượng lặp lại bằng ~0,3 mg/kg đối với cả hai hợp chất. Kết quả được thể hiện trên Hình 4.

Ví dụ 7. Sự đánh giá in vivo của sự bất hoạt GO và ảnh hưởng lên hàm lượng oxalat ở chuột KO AGXT.

siARN GO (AD-40257) trong hạt nano lipit (LNP) được dùng liều lượng trong tĩnh mạch ở chuột KO AGXT (Salido et al (2006) PNAS 103:18249) ở liều lượng 1 mg/kg. Hàm lượng oxalat hoặc glycolat trong nước tiểu được đo vào ngày 15 bằng cách sử dụng sắc ký ion/quang phổ khối. Kết quả được thể hiện trên Hình 5. Dữ liệu được biểu hiện với các giá trị tiền liều lượng và được chuẩn hóa đối với creatinin (Cr) để kiểm soát độ loãng nước tiểu. N=4 con chuột trong mỗi nhóm và thanh sai số thể hiện độ lệch chuẩn.

Ví dụ 8. Sự đánh giá in vivo của thể liên hợp GO-GalNAc ở mẫu bất hoạt AGXT chuột nhắt.

Để tạo ra mẫu PH1 ở chuột nhắt, siARN AGXT (AD-63102) ở LNP (AF-011-63102) được dùng liều lượng 1 mg/kg trong tĩnh mạch cho chuột nhắt cái Sprague Dawley vào ngày 1 và ngày 7 để duy trì sự bất hoạt của AGXT ở gan chuột nhắt và 1% Etylen Glycol được bổ sung vào nước uống để kích thích thêm sự sản xuất oxalat. Vào ngày 0 và ngày 7 một số con chuột nhắt còn được cho dùng liều lượng thể liên hợp GO GalNAc-siARN (AD-62994) hoặc đối chứng PBS. Kết quả được thể hiện trên Hình 6. Hình 6A thể hiện sự định lượng của hàm lượng mARN AGXT ở gan 72 giờ sau liều lượng 1 mg/kg đơn lẻ của siARN AGXT trong LNP. Trên Hình 6B, hàm lượng của oxalat trong nước tiểu được định lượng từ nước tiểu 24 giờ thu được từ ngày -1 đến 0, từ ngày 3 đến 4, từ ngày 5 đến 6, và từ ngày 7 đến 8. Dữ liệu được chuẩn hóa đối với creatinin để kiểm soát đối với độ loãng của nước tiểu. N=3 đối với các nhóm AGXT và N=2 đối với nhóm đối chứng PBS. Trên Hình 6C, cùng các con chuột nhắt này (như trên Hình 6B) được theo dõi đến 49 ngày với việc dùng liều lượng hàng tuần liên tục vào ngày 14 và 21 của cả AF-011-63102 và AD-62994 và lấy nước tiểu 24 giờ như được thể hiện. Etylen glycol vẫn còn trong nước uống đến tận ngày 28. Trên Hình 6D, khoảng thời gian bất hoạt HAO1 ở chuột nhắt được thể hiện bằng cách đo hàm lượng mARN một tuần hoặc bốn tuần sau khi kết thúc 4 liều lượng (tương ứng với

ngày 28 và 49 trên Hình 6C) và được biểu diễn tương ứng với hàm lượng được nhìn thấy ở chuột nhất được điều trị bằng PBS. Thanh sai số thể hiện độ lệch chuẩn từ đầu đến cuối.

Tên cặp

đôi	đích	Tên Wks có nghĩa
AD-		NM_017545,2_1306-
40257.1	HAO1	1324_s
AD-		NM_017545,2_1306-
40257.2	HAO1	1324_s
AD-		NM_016702,3_1109-
63102.1	AGXT	1127_s
AD-		NM_016702,3_1109-
63102.2	AGXT	1127_s
AD-		NM_016702,3_1109-
63102.3	AGXT	1127_s

			SE
			Q
Tên cặp	Trình tự sợi có nghĩa được cải	Trình tự sợi có nghĩa không	ID
đôi	biến	được cải biến	NO:
			770
AD-	uucAAuGGGuGuccuAGGAdTsd	UUCAAUGGGUGUCCUAGG	&
40257.1	T	A	771
			770
AD-	uucAAuGGGuGuccuAGGAdTsd	UUCAAUGGGUGUCCUAGG	&
40257.2	T	A	771
			772
AD-	AcAAcuGGAGGGAcAucGudTsd	ACAACUGGAGGGACAUCG	&
63102.1	T	U	773

- 205 -

			772
AD-	AcAAcuGGAGGGAcAucGudTsd	ACAACUGGAGGGACAUCG	&
63102.2	T	U	773
			772
AD-	AcAAcuGGAGGGAcAucGudTsd	ACAACUGGAGGGACAUCG	&
63102.3	T	U	773
			SE
			Q
Tên cặp		Trình tự sợi đối nghĩa không	ID
đôi	Trình tự sợi đối nghĩa được cải biến	được cải biến	NO:
			774
AD-	UCCuAGGAcACCCaAUUGAAdTsd	UCCUAGGACACCCAUUGA	&
40257.1	T	A	775
			774
AD-	UCCuAGGAcACCCaAUUGAAdTsd	UCCUAGGACACCCAUUGA	&
40257.2	T	A	775
			776
AD-	ACGAUGUCCCUCcAGUUGUdTsd	ACGAUGUCCCUCCAGUUG	&
63102.1	dT	U	777
			776
AD-	ACGAUGUCCCUCcAGUUGUdTsd	ACGAUGUCCCUCCAGUUG	&
63102.2	dT	U	777
			776
AD-	ACGAUGUCCCUCcAGUUGUdTsd	ACGAUGUCCCUCCAGUUG	&
63102.3	dT	U	777

Ví dụ 9: Sự đánh giá in vivo của thể liên hợp GO-GalNAc

Chuột cái C57BL/6, 6-8 tuần tuổi, được dùng liều dưới da đơn lẻ của thể liên hợp GO siARN-GalNac trên Bảng 7. Các con chuột bị giết sau 72 giờ và gan được thử nghiệm về mARN HAO bằng phân tích bADN. Kết quả được thể hiện trên Hình 13.

Bảng 7: Thể liên hợp GO (HAO) siARN-GalNac.

Tên cặp đôi	Trình tự sợi có nghĩa được cải biến	SEQ ID NO:
AD-62989.2	UfscsCfuAfgGfaAfCfCfuUfuUfaGf aAfaUfL96	778
AD-62994.2	GfsasCfuUfuCfaUfCfCfuGfgAfaAf uAfuAfL96	779
AD-62933.2	GfsasAfuGfuGfaAfAfGfuCfaUfcGf aCfaAfL96	780
AD-62935.2	CfsasUfuGfgUfgAfGfGfaAfaAfaUf cCfuUfL96	781
AD-62940.2	AfsusCfgAfcAfaGfAfCfaUfuGfgUf gAfgAfL96	782
AD-62941.2	AfscsAfuUfgGfuGfAfGfgAfaAfaAf uCfcUfL96	783
AD-62944.2	GfsasAfaGfuCfaUfCfGfaCfaAfgAf cAfuUfL96	784
AD-62965.2	AfsasAfgUfcAfuCfGfAfcAfaGfaCf aUfuAfL96	785
Tên cặp đôi	Sợi đối nghĩa được cải biến	SEQ ID NO:
AD-62989.2	asUfsuUfcUfaAfaAfgguUfcCfuAfgGfascsa	786

- 207 -

AD-
62994.2 usAfsuAfuUfuCfcAfggaUfgAfaAfgUfcscsa787
AD-
62933.2 usUfsgUfcGfaUfgAfcuuUfcAfcAfuUfcsusg788
AD-
62935.2 asAfsgGfaUfuUfuUfccuCfaCfcAfaUfgsusc789
AD-
62940.2 usCfsuCfaCfcAfaUfgucUfuGfuCfgAfusgsa790
AD-
62941.2 asGfsgAfuUfuUfuCfcucAfcCfaAfuGfuscsu791
AD-
62944.2 asAfsuGfuCfuUfgUfcgaUfgAfcUfuUfcsasc792
AD-
62965.2 usAfsaUfgUfcUfuGfucgAfuGfaCfuUfuscsa793

		Chuột		
	Khả năng	đồng		
Tên cặp	phản ứng	Trung	MM cho	MM cho
đôi	chéo	Quốc?	chuột	GP
AD-				
62989.2	Hs	có	pos8	
AD-				pos2,12,
62994.2	Hs	không	pos16	16
AD-				
62933.2	Hs/Mm	có		
AD-				
62935.2	Hs/Mm	có		

- 208 -

AD-

62940.2 Hs/Mm có

AD-

62941.2 Hs/Mm có

AD-

62944.2 Hs/Mm có

AD-

62965.2 Hs/Mm có

Ví dụ 10: Sự đánh giá in vivo của thể liên hợp GO-GalNAc ở chuột

Con chuột cái C57 BL/6 được dùng liều lượng 3 mg/kg dưới da đơn lẻ của một số lượng các thể liên hợp GO siARN-GalNAc được mô tả trong bản mô tả này hoặc đối chứng PBS. Các con chuột bị giết sau 72 giờ và mARN bất hoạt HAO1 ở gan được đánh giá bằng cách sử dụng qPCR. Kết quả được thể hiện trên Hình 14, được biểu diễn tương ứng với đối chứng PBS.

Ví dụ 11: Sự đánh giá đáp ứng liều lượng của thể liên hợp GO-GalNAc ở chuột

Con chuột cái C57 BL/6 được dùng liều dưới da đơn lẻ bằng 1 hoặc 3 mg/kg của một trong số các thể liên hợp GO siARN-GalNAc hợp chất A (AD-62994), hợp chất B (AD-62933), hợp chất C (AD-65644), hợp chất D (AD-65626), hợp chất E (AD-65590), hợp chất F (AD-65585) hoặc đối chứng PBS. Mười ngày sau các con chuột bị giết chết và mARN bất hoạt HAO1 ở gan được đánh giá bằng cách sử dụng qPCR. Trong các nghiên cứu liều lượng lặp lại, các hợp chất C, D, F hoặc đối chứng PBS được dùng liều lượng dưới da hàng tuần (QW) trong thời gian 4 tuần và hàm lượng mARN HAO1 ở gan được đánh giá 10 ngày sau liều lượng cuối cùng. Kết quả của liều lượng đơn lẻ được thể hiện trên Hình 15 và thí nghiệm liều lượng lặp lại được thể hiện trên Hình 16, được biểu diễn tương ứng với đối chứng PBS. Các dữ liệu này cho thấy hiệu lực được cải thiện đối với các hợp chất AD-65644 và AD-65626 với AD-62933 và đối với các hợp chất AD-65590 và AD-65585 với AD-62994.

- 209 -

Ví dụ 12: Sự đánh giá đáp ứng liều lượng của hợp chất D ở chuột

Con chuột cái C57 BL/6 được dùng liều dưới da đơn lẻ bằng 0,1, 0,3, 1, 3, hoặc 10 mg/kg AD-65626 hoặc đối chứng PBS. Mười ngày sau con chuột bị giết chết và mARN bất hoạt HAO1 ở gan được đánh giá bằng cách sử dụng qPCR với kết quả được biểu diễn tương ứng với đối chứng PBS như được thể hiện trên Hình 17. Các kết quả này chứng tỏ sự cải thiện lớn hơn 3 lần về hiệu lực so với hợp chất AD-62933.

Ví dụ 13: Mối quan hệ của sự bất hoạt mARN với hàm lượng glycolat trong huyết thanh ở chuột

Con chuột cái C57 BL/6 được dùng liều dưới da đơn lẻ của 0,1, 0,3, 1, 3, hoặc 10 mg/kg AD-65585 hoặc đối chứng PBS. Mười ngày sau con chuột bị giết chết và mARN bất hoạt HAO1 ở gan được đánh giá bằng cách sử dụng qPCR, với kết quả được biểu diễn tương ứng với đối chứng PBS. Hàm lượng glycolat trong các mẫu huyết thanh từ cùng con chuột được định lượng bằng cách sử dụng sắc ký ion ghép đôi với quang phổ khối như đã mô tả từ trước (Knight và cộng sự., Anal. Biochem. ngày 1 tháng 2 năm 2012; 421(1): 121–124). Kết quả của các thí nghiệm này được thể hiện trên Hình 18.

Các kết quả này chứng tỏ rằng AD-65585 có hiệu lực bằng với AD-65626, cả hai đều có ED50 liều lượng đơn lẻ bằng ~0,3 mg/kg ở chuột WT. Ngoài ra, việc làm câm mARN HAO1 dẫn đến sự tăng glycolat trong huyết thanh đáp ứng liều lượng lên đến 4 lần (xấp xỉ 200uM) ở hai liều lượng cao nhất.

Ví dụ 14: Mối quan hệ của sự bất hoạt mARN với hàm lượng glycolat trong huyết thanh ở chuột nhắt

Chuột nhắt đực Sprague Dawley được dùng liều dưới da đơn lẻ của 1, 3, hoặc 10 mg/kg AD-65626 hoặc đối chứng PBS. Mười bốn ngày sau các con chuột nhắt bị giết chết và mARN bất hoạt HAO1 ở gan được đánh giá bằng cách sử dụng qPCR, với kết quả được biểu diễn tương ứng với đối chứng PBS. Hàm lượng glycolat trong các mẫu huyết thanh từ cùng các con chuột nhắt này thu được cả trước và vào ngày 14 được định lượng bằng cách sử dụng sắc ký ion ghép đôi với quang phổ khối, như đã được mô tả (Knight và cộng sự., Anal. Biochem. ngày 1 tháng 2 năm 2012; 421(1): 121–124). Kết quả của các thí nghiệm này được thể hiện trên Hình 19.

- 210 -

Như quan sát được ở chuột kiểu đại, các kết quả này chứng tỏ rằng việc làm câm mARN HAO1 ở chuột nhắt Sprague Dawley dẫn đến sự tăng glycolat trong huyết thanh đáp ứng liều lượng lên đến 12 lần (xấp xỉ 140 μ M) ở liều lượng cao nhất.

Ví dụ 15: Nghiên cứu dược lý với ALN-65585

Sự ức chế HAO1 ở tế bào gan.

Tế bào gan cyno sơ cấp được chuyển nạp bằng ARNimax (Invitrogen) với AD-65585 được pha loãng theo dãy (ALN-65585, "ALN-GO1") hoặc đối chứng mARN Luxiferaza không hướng đích (AD1955) ở 10 nM. Hàm lượng tương đối của mARN HAO1 được xác định bằng cách chuẩn hóa đối với hàm lượng mARN GAPDH như được định lượng bằng RT-PCR thời gian thực. Dữ liệu được dựng đồ thị để tính giá trị IC₅₀ của 10 pM. Kết quả được thể hiện Hình 20.

Sự chuyển nạp in vitro của AD-65585 chứng tỏ ED₅₀ bằng xấp xỉ 10pM ở tế bào gan cynomolgus sơ cấp.

Dược lý liều lượng đơn lẻ ở chuột

Dược lý ALN-GO1 được đánh giá ở chuột bằng cách định lượng hàm lượng mARN HAO1 trong gan và glycolat trong huyết thanh (Hình 21). Liều lượng SC đơn lẻ của ALN-GO1 dẫn đến sự triệt tiêu phụ thuộc liều lượng của mARN HAO1 với liều lượng của 10 mg/kg dẫn đến việc làm câm ED₉₀. Liều lượng ED₅₀ đối với việc làm câm GO1 ở chuột được ước tính là 0,3 mg/kg. Hàm lượng glycolat trong huyết thanh tăng lên trong phương thức đáp ứng liều lượng với mức độ lớn nhất xấp xỉ 4 lần trên hàm lượng đường cơ sở. Kết quả được thể hiện trên Hình 21, chứng tỏ hàm lượng của mARN HAO1 ở gan và glycolat trong huyết thanh 10 ngày sau liều dưới da đơn lẻ của ALN-65585 ở các con chuột C57BL/6. Các thanh thể hiện giá trị trung bình của 3 hoặc 4 con vật và thanh sai số minh họa độ lệch chuẩn.

Khoảng thời gian liều lượng đơn lẻ ở chuột

Việc làm câm GO1 là lâu dài và có thể đảo ngược sau liều lượng SC đơn lẻ (Hình 22). Liều lượng SC đơn lẻ của ALN-GO1 ở chuột ở 3 mg/kg dẫn đến việc làm câm mARN $\geq 70\%$ trong xấp xỉ 6 tuần, sau đó hàm lượng mARN phục hồi lên hàm lượng đường cơ sở trong 12 tuần sau khi dùng liều lượng. Kết quả được thể hiện trên Hình 22: Hàm lượng của

- 211 -

mARN HAO1 ở gan ở nhiều thời điểm sau khi dùng liều dưới da đơn lẻ của ALN-65585 ở các con chuột C57BL/6. Mỗi điểm dữ liệu thể hiện giá trị trung bình của 3 con vật và thanh sai số minh họa độ lệch chuẩn.

Dược lý liều lượng đơn lẻ ở chuột nhắt

Dược lý ALN-GO1 cũng được đánh giá ở chuột nhắt bằng cách định lượng hàm lượng mARN HAO1 ở gan (Hình 23). Việc dùng SC đơn lẻ của ALN-GO1 cho chuột nhắt đực Sprague Dawley dẫn đến sự triệt tiêu phụ thuộc liều lượng của mARN HAO1 với liều lượng ≥ 3 mg/kg dẫn đến việc làm câm ED90. Kết quả được thể hiện trên Hình 23: Hàm lượng của mARN HAO1 ở gan 10 ngày sau liều dưới da đơn lẻ của ALN-65585 ở chuột nhắt Sprague Dawley. Các thanh thể hiện giá trị trung bình của 3 con vật và thanh sai số minh họa độ lệch chuẩn. Liều lượng ED50 đối với việc làm câm GO1 trong chuột nhắt được ước tính là 0,3 mg/kg.

Dược lý liều lượng đơn lẻ ở chuột KO AGXT

Sự ảnh hưởng của ALN-GO1 lên hàm lượng oxalat được đánh giá ở mẫu chuột KO AGXT mắc PH1. Kết quả được thể hiện trên Hình 24: Sự bài tiết oxalat (trên) và glycolat (dưới) trong nước tiểu 24 giờ của con chuột KO AGXT sau liều dưới da đơn lẻ của ALN-65585. Các chữ cái khác nhau có nghĩa là sự khác biệt đáng kể giữa 3 nhóm liều lượng ở mỗi tuần cụ thể ($n=3$ trong mỗi liều lượng). Sự bài tiết nước tiểu theo thời gian không thay đổi đáng kể ở con vật đối chứng PBS ($n=1$).

Hàm lượng oxalat trong nước tiểu cho thấy sự giảm phụ thuộc liều lượng sau liều lượng đơn lẻ của ALN-GO1 với sự giảm lớn nhất là xấp xỉ 50% oxalat ở liều lượng 3 mg/kg mà kết thúc trong ≥ 3 tuần trước khi phục hồi lên hàm lượng tiền liều lượng. Hàm lượng glycolat trong nước tiểu cho thấy sự tăng phụ thuộc liều lượng sau liều lượng đơn lẻ của ALN-GO1 với sự tăng lớn nhất xấp xỉ 5 lần ở liều lượng 3 mg/kg mà kết thúc trong ≥ 4 tuần.

Dược lý liều lượng đơn lẻ ở mẫu chuột nhắt được cảm ứng PH1

ALN-GO1 được đánh giá ở mẫu động vật gặm nhấm PH1 thứ hai trong đó AGXT ở gan bị ức chế ở chuột nhắt sử dụng siARN và hàm lượng oxalat được kích thích bằng etylen glycol (Hình 25A và Hình 25B). mARN HAO1 ở gan và oxalat trong nước 24 giờ tiểu được định lượng để xác định mức độ của sự giảm HAO1 cần cho sự giảm oxalat lớn nhất. Kết

- 212 -

quả được thể hiện trên Hình 25A và Hình 25B: Hàm lượng của mARN HAO1 ở gan mẫu chuột nhất được cảm ứng của PH1 14 ngày sau liều dưới da đơn lẻ của ALN-65585 và liều hàng tuần của siARN AF-011-AGXT (2 liều lượng, bằng 1 mg/kg). Oxalat trong nước tiểu 24 giờ được chuẩn hóa đối với creatinin trong nước tiểu. Các thanh thể hiện giá trị trung bình của 3 con vật và thanh sai số minh họa độ lệch chuẩn. Đồ thị tương quan giảm mARN và oxalat thể hiện các con vật riêng lẻ từ nhiều thí nghiệm.

Liều lượng đơn lẻ của ALN-GO1 trong mẫu này chứng minh sự giảm mARN và oxalat trong nước tiểu đáp ứng liều lượng với sự giảm mARN lớn nhất xấp xỉ 85% và sự giảm oxalat trong nước tiểu lớn nhất xấp xỉ 90% quan sát được ở liều lượng cao nhất của ALN-GO1 (Hình 25A và Hình 25B). Trong mẫu chuột nhất được cảm ứng này của PH1, sự giảm mARN và oxalat trong nước tiểu dẫn đến sự tương quan 1:1.

Dược lý đa liều lượng ở mẫu chuột nhất cảm ứng PH1

Hiệu lực của ALN-GO1 được đánh giá trong các nghiên cứu ở các con chuột nhất bình thường có hoạt tính AGXT bị ức chế và etylen glycol (mẫu cảm ứng PH1) bằng cách định lượng mARN HAO1 ở gan và oxalat trong nước tiểu 24 giờ. Kết quả được thể hiện trên Hình 26: Hàm lượng của mARN HAO1 ở gan mẫu chuột nhất được cảm ứng PH1 28 ngày sau khi dùng liều dưới da lặp lại của ALN-65585 và dùng liều trong tĩnh mạch lặp lại của siARN AF-011-AGXT (4 liều lượng, bằng 1 mg/kg). Oxalat trong nước tiểu 24 giờ được chuẩn hóa đối với creatinin trong nước tiểu. Các thanh thể hiện giá trị trung bình của 2 hoặc 3 con vật và thanh sai số minh họa độ lệch chuẩn.

Sự điều trị bằng ALN-GO1 dẫn đến sự giảm oxalat trong nước tiểu được duy trì trong tất cả các nhóm điều trị trong thời gian xấp xỉ 3 tuần. Vào ngày 28 sau khi dùng liều lượng lặp lại của ALN-GO1 (và bốn liều lượng của AF-011-AGXT) tất cả các nhóm thể hiện sự giảm mARN >95% sự giảm oxalat trong nước tiểu >85%.

Dược lý đa liều lượng ở NHP

Dược lý ALN-GO1 được đánh giá ở khỉ cynomolgus (động vật linh trưởng không phải là người (NHP)) bằng cách định lượng mARN HAO1 ở mẫu sinh thiết gan, và hàm lượng glycolat trong huyết thanh. Bảng dưới đây thể hiện nghiên cứu dược lý NHP phác họa chi tiết mức độ liều lượng và chế độ liều lượng.

- 213 -

Nhóm #	Vật phẩm Thử nghiệm	Mức độ liều lượng (mg/kg)	Tần suất liều lượng
1	PBS	Na	QM x 6
2	AD-65585	0,25	QM x 8
3	AD-65585	1	QM x 8
4	AD-65585	1	QM x 6
5	AD-65585	2	QM x 6
6	AD-65585	4	QM x 6
7	AD-65585	2 -> 1	QM x 4 -> QM x 5

Kết quả được thể hiện trên hình 27. Hàm lượng glycolat trong huyết thanh NHP đối với tất cả các nhóm ngoài ngày 85, dữ liệu thể hiện giá trị trung bình nhóm của 3 con vật trong mỗi nhóm, các đường thể hiện độ lệch chuẩn. mARN HAO1 mẫu sinh thiết gan vào ngày 29, các đường thể hiện giá trị trung bình nhóm, các ký hiệu thể hiện hàm lượng mARN của con vật đơn lẻ với đối chứng PBS vào ngày 29.

Sau tháng dùng liều lượng đầu tiên (ngày 29), việc làm càm mARN đáp ứng liều lượng được quan sát thấy ở tất cả các nhóm, với lên tới 99% việc làm càm mARN ở các nhóm 6 và 7 được dùng liều lượng 4 mg/kg hàng tháng hoặc 2 mg/kg hàng tuần. Hàm lượng glycolat trong huyết thanh được tăng lên lớn nhất bằng xấp xỉ 70 μ M được duy trì trong ít nhất 3 tuần ở nhóm 6 được dùng liều lượng 4 mg/kg hàng tháng. Glycolat trong huyết thanh trung gian

Ví dụ 16: Các trình tự siARN khác.

Thiết kế siARN khác được thực hiện để nhận dạng siARN hướng đích HAO1 NM_017545.2.

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
AUGUAUGUUACUU CUUAGAGA	794	asusguauGfuUfAfCf uucuuagagaL96	1890	có nghĩ a	21
UCUCUAAGAAGUA ACAUACAUC	795	usCfsucuAfaGfAfag uaAfcAfuacauscsc	1891	đổi nghĩ a	23
UGUAUGUUACUUC UUAGAGAG	796	usgsuaugUfuAfCfUf ucuuagagagL96	1892	có nghĩ a	21
CUCUCUAAGAAGU AACAUACAUC	797	csUfscucUfaAfGfaa guAfaCfauacasusc	1893	đổi nghĩ a	23
UAGGAUGUAUGUU ACUUCUUA	798	usasggauGfuAfUfGf uuacuucuaL96	1894	có nghĩ a	21
UAAGAAGUAACAU ACAUCCUAAA	799	usAfsagaAfgUfAfac auAfcAfuccuasasa	1895	đổi nghĩ a	23
UUAGGAUGUAUGU UACUUCUU	800	ususaggaUfgUfAfUf guacuucuuL96	1896	có nghĩ a	21

- 215 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
AAGAAGUAACAUA CAUCCUAAAA	801	asAfsgaaGfuAfAfca uaCfaUfccuaasasa	1897	đổi nghĩ a	23
AGAAAGGUGUUCA AGAUGUCC	802	asgsaaagGfuGfUfUf caagauguccL96	1898	có nghĩ a	21
GGACAUCUUGAAC ACCUUUCUCC	803	gsGfsacaUfcUfUfga acAfcCfuuucuscsc	1899	đổi nghĩ a	23
GAAAGGUGUUCAA GAUGUCCU	804	gsasaaggUfgUfUfCf aagauguccuL96	1900	có nghĩ a	21
AGGACAUCUUGAA CACCUUUCUC	805	asGfsgacAfuCfUfug aaCfaCfcuuucsusc	1901	đổi nghĩ a	23
GGGGAGAAAGGUG UUCAAGAU	806	gsgsggagAfaAfGfGf uguucaagauL96	1902	có nghĩ a	21
AUCUUGAACACCU UUCUCCCCCU	807	asUfscuuGfaAfCfac cuUfuCfucscscsu	1903	đổi nghĩ a	23
GGGGGAGAAAGGU GUUCAAGA	808	gsgsgggaGfaAfAfGf guguucaagaL96	1904	có nghĩ a	21

- 216 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
UCUUGAACACCUU UCUCCCCUG	809	usCfsuugAfaCfAfcc uuUfcUfcccccsusg	1905	đổi nghĩ a	23
AGAAACUUUGGCU GAUAAUUAU	810	asgsaaacUfuUfGfGf cugauaauauL96	1906	có nghĩ a	21
AUAUUAUCAGCCA AAGUUUCUUC	811	asUfsauuAfuCfAfgc caAfaGfuucusc	1907	đổi nghĩ a	23
GAAACUUUGGCUG AUAAUUAU	812	gsasaacuUfuGfGfCf ugauaauauL96	1908	có nghĩ a	21
AAUAUUAUCAGCC AAAGUUUCUU	813	asAfsuauUfaUfCfag ccAfaAfguuucsusu	1909	đổi nghĩ a	23
AUGAAGAAACUUU GGCUGAUA	814	asusgaagAfaAfCfUf uuggcugauaL96	1910	có nghĩ a	21
UAUCAGCCAAAGU UUCUUCAUCA	815	usAfsucaGfcCfAfaa guUfuCfuucauscsa	1911	đổi nghĩ a	23
GAUGAAGAAACUU UGGCUGAU	816	gsasugaaGfaAfAfCf uuuggcugauL96	1912	có nghĩ a	21

- 217 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
AUCAGCCAAAGUU UCUUCAUCAU	817	asUfscagCfcAfAfag uuUfcUfucaucsasu	1913	đổi nghĩ a	23
AAGGCACUGAUGU UCUGAAAG	818	asasggcaCfuGfAfUf guucugaaagL96	1914	có nghĩ a	21
CUUUCAGAACAUC AGUGCCUUUC	819	csUfsuucAfgAfAfca ucAfgUfgccuususc	1915	đổi nghĩ a	23
AGGCACUGAUGUU CUGAAAGC	820	asgsgcacUfgAfUfGf uucugaaagcL96	1916	có nghĩ a	21
GCUUUCAGAACAUC CAGUGCCUUU	821	gsCfsuuuCfaGfAfac auCfaGfugccususu	1917	đổi nghĩ a	23
CGGAAAGGCACUG AUGUUCUG	822	csgsgaaaGfgCfAfCf ugauguucugL96	1918	có nghĩ a	21
CAGAACAUCAGUG CCUUUCCGCA	823	csAfsgaaCfaUfCfag ugCfcUfuuccgscsa	1919	đổi nghĩ a	23
GCGGAAAGGCACU GAUGUUCU	824	gscsggaaAfgGfCfAf cugauguucuL96	1920	có nghĩ a	21

- 218 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
AGAACAUCAGUGC CUUUCCGCAC	825	asGfsaacAfuCfAfgu gcCfuUfuccgcsasc	1921	đổi nghĩ a	23
AGAAGACUGACAU CAUUGCCA	826	asgsaagaCfuGfAfCf aucauugccaL96	1922	có nghĩ a	21
UGGCAAUGAUGUC AGUCUUCUCA	827	usGfsgcaAfuGfAfug ucAfgUfcuucuscscsa	1923	đổi nghĩ a	23
GAAGACUGACAUC AUUGCCAA	828	gsasagacUfgAfCfAf ucauugccaaL96	1924	có nghĩ a	21
UUGGCAAUGAUGU CAGUCUUCUC	829	usUfsggcAfaUfGfau guCfaGfucuucsusc	1925	đổi nghĩ a	23
GCUGAGAAGACUG ACAUCAUU	830	gscsugagAfaGfAfCf ugacaucauuL96	1926	có nghĩ a	21
AAUGAUGUCAGUC UUCUCAGCCA	831	asAfsugaUfgUfCfag ucUfuCfucagcscsa	1927	đổi nghĩ a	23
GGCUGAGAAGACU GACAUCAU	832	gsgscugaGfaAfGfAf cugacaucauL96	1928	có nghĩ a	21

- 219 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:		Chiề u dài
AUGAUGUCAGUCU UCUCAGCCAU	833	asUfsgauGfuCfAfgu cuUfcUfcagccsas	1929	đổi nghĩ a	23
UAAUGCCUGAUUC ACAACUUU	834	usasaugcCfuGfAfUf ucacaacuuuL96	1930	có nghĩ a	21
AAAGUUGUGAAUC AGGCAUUACC	835	asAfsaguUfgUfGfaa ucAfgGfcuuascsc	1931	đổi nghĩ a	23
AAUGCCUGAUUCA CAACUUUG	836	asasugccUfgAfUfUf cacaacuuugL96	1932	có nghĩ a	21
CAAAGUUGUGAAU CAGGCAUUAC	837	csAfsaagUfuGfUfga auCfaGfgcauuscsc	1933	đổi nghĩ a	23
UUGGUAAUGCCUG AUUCACAA	838	ususgguaAfuGfCfCf ugauucacaaL96	1934	có nghĩ a	21
UUGUGAAUCAGGC AUUACCAACA	839	usUfsgugAfaUfCfag gcAfuUfaccaascsa	1935	đổi nghĩ a	23
GUUGGUAAUGCCU GAUUCACA	840	gsusugguAfaUfGfCf cugauucacaL96	1936	có nghĩ a	21

- 220 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
UGUGAAUCAGGCA UUACCAACAC	841	usGfsugaAfuCfAfgg caUfuAfccaacsasc	1937	đổi nghĩ a	23
UAUCAAUGGCUG AGAAGACU	842	usasucAAfuGfGfCf ugagaagacuL96	1938	có nghĩ a	21
AGUCUUCUCAGCC AUUUGAUAUC	843	asGfsucuUfcUfCfag ccAfuUfugauasusc	1939	đổi nghĩ a	23
AUCAAUGGCUGA GAAGACUG	844	asuscaaaaUfgGfCfUf gagaagacugL96	1940	có nghĩ a	21
CAGUCUUCUCAGC CAUUUGAUAU	845	csAfsgucUfuCfUfca gcCfaUfuugausasu	1941	đổi nghĩ a	23
AAGAUAUCAAUG GCUGAGAA	846	asasgauaUfcAfAfAf uggcugagaaL96	1942	có nghĩ a	21
UUCUCAGCCAUUU GAUAUCUCC	847	usUfscucAfgCfCfau uuGfaUfaucuuuscsc	1943	đổi nghĩ a	23
GAAGAUAUCAAU GGCUGAGA	848	gsasagauAfuCfAfAf auggcugagaL96	1944	có nghĩ a	21

- 221 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
UCUCAGCCAUUUG AUAUCUUCCC	849	usCfsucaGfcCfAfu ugAfuAfucuucscsc	1945	đổi nghĩ a	23
UCUGACAGUGCAC AAUAUUUU	850	uscsugacAfgUfGfCf acaauauuuuL96	1946	có nghĩ a	21
AAAAUAUUGUGCA CUGUCAGAUC	851	asAfsaauAfuUfGfug caCfuGfucagasusc	1947	đổi nghĩ a	23
CUGACAGUGCACA AUUUUUUC	852	csusgacaGfuGfCfAf caauauuuuucL96	1948	có nghĩ a	21
GAAAAUAUUGUGC ACUGUCAGAU	853	gsAfsaaaUfaUfUfgu gcAfcUfgucagsasu	1949	đổi nghĩ a	23
AAGAUCUGACAGU GCACAAUA	854	asasgaucUfgAfCfAf gugcacaauaL96	1950	có nghĩ a	21
UAUUGUGCACUGU CAGAUCUUGG	855	usAfsuugUfgCfAfcu guCfaGfaucuusgsg	1951	đổi nghĩ a	23
CAAGAUCUGACAG UGCACAAU	856	csasagauCfuGfAfCf agugcacaauL96	1952	có nghĩ a	21

- 222 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
AUUGUGCACUGUC AGAUCUUGGA	857	asUfsuguGfcAfCfug ucAfgAfucuuugsgsa	1953	đổi nghĩ a	23
ACUGAUGUUCUGA AAGCUCUG	858	ascsugauGfuUfCfUf gaaagcucugL96	1954	có nghĩ a	21
CAGAGCUUUCAGA ACAUCAGUGC	859	csAfsgagCfuUfUfca gaAfcAfucagusgsc	1955	đổi nghĩ a	23
CUGAUGUUCUGAA AGCUCUGG	860	csusgaugUfuCfUfGf aaagcucuggL96	1956	có nghĩ a	21
CCAGAGCUUUCAG AACAUCAUG	861	csCfsagaGfcUfUfuc agAfaCfaucagsusg	1957	đổi nghĩ a	23
AGGCACUGAUGUU CUGAAAGC	862	asgsgcacUfgAfUfGf uucugaaagcL96	1958	có nghĩ a	21
GCUUUCAGAACAU CAGUGCCUUU	863	gsCfsuuuCfaGfAfac auCfaGfugccususu	1959	đổi nghĩ a	23
AAGGCACUGAUGU UCUGAAAG	864	asasggcaCfuGfAfUf guucugaaagL96	1960	có nghĩ a	21

- 223 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
CUUUCAGAACAU AGUGCCUUUC	865	csUfsuucAfgAfAfca ucAfgUfgccuususc	1961	đổi nghĩ a	23
AACAACAUGC UAA AUCAGUAC	866	asascaacAfuGfCfUf aaaucaguacL96	1962	có nghĩ a	21
GUACUGAUUUAGC AUGUUGUUCA	867	gsUfsacuGfaUfUfua gcAfuGfuuguuscsa	1963	đổi nghĩ a	23
ACAACAUGC UAAA UCAGUACU	868	ascsaacaUfgCfUfAf aaucaguacuL96	1964	có nghĩ a	21
AGUACUGAUUUAG CAUGUUGUUC	869	asGfsuacUfgAfUfuu agCfaUfguugususc	1965	đổi nghĩ a	23
UAUGAACACAUG CUAAAUCA	870	usasugaaCfaAfCfAf ugcuaaaaucaL96	1966	có nghĩ a	21
UGAUUUAGCAUGU UGUUCAUAAU	871	usGfsauuUfaGfCfau guUfgUfucauasasu	1967	đổi nghĩ a	23
UUAUGAACACA U GCUAAAUC	872	ususaugaAfcAfAfCf augcuaaaucL96	1968	có nghĩ a	21

- 224 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
GAUUUAGCAUGUU GUUCAUAAUC	873	gsAfsuuuAfgCfAfug uuGfuUfcauaasusc	1969	đổi nghĩ a	23
UCUUUAGUGUCUG AAUAUAUC	874	uscsuuuaGfuGfUfCf ugaauauaucL96	1970	có nghĩ a	21
GAUAUAUUCAGAC ACUAAAGAUG	875	gsAfsuauAfuUfCfag acAfcUfaaagasusg	1971	đổi nghĩ a	23
CUUUAGUGUCUGA AUUAUACC	876	csusuuagUfgUfCfUf gaauauauuccL96	1972	có nghĩ a	21
GGAUAUAUUCAGA CACUAAAGAU	877	gsGfsauaUfaUfUfca gaCfaCfuaaagsasu	1973	đổi nghĩ a	23
CACAUCUUUAGUG UCUGAAUA	878	csascaucUfuUfAfGf ugucugaauaL96	1974	có nghĩ a	21
UAUUCAGACACUA AAGAUGUGAU	879	usAfsuucAfgAfCfac uaAfaGfaugugsasu	1975	đổi nghĩ a	23
UCACAUCUUUAGU GUCUGAAU	880	uscsacauCfuUfUfAf gugucugaauL96	1976	có nghĩ a	21

- 225 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
AUUCAGACACUAA AGAUGUGAUU	881	asUfsucaGfaCfAfcu aaAfgAfugugasusu	1977	đổi nghĩ a	23
UGAUACUUCUUUG AAUGUAGA	882	usgsauacUfuCfUfUf ugaanguagaL96	1978	có nghĩ a	21
UCUACAUUCAAG AAGUAUCACC	883	usCfsuacAfuUfCfaa agAfaGfuaucascsc	1979	đổi nghĩ a	23
GAUACUUCUUUGA AUGUAGAU	884	gsasuacuUfcUfUfUf gaauguagauL96	1980	có nghĩ a	21
AUCUACAUUCAA GAAGUAUCAC	885	asUfscuaCfaUfUfca aaGfaAfguaucsasc	1981	đổi nghĩ a	23
UUGGUGAUACUUC UUUGAAUG	886	ususggugAfuAfCfUf ucuuugaaugL96	1982	có nghĩ a	21
CAUUCAAAGAAGU AUCACCAAUU	887	csAfsuucAfaAfGfaa guAfuCfaccaasusu	1983	đổi nghĩ a	23
AUUGGUGAUACUU CUUUGAAU	888	asusugguGfaUfAfCf uucuuugaauL96	1984	có nghĩ a	21

- 226 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
AUUCAAAGAAGUA UCACCAAUUA	889	asUfsucaAfaGfAfag uaUfcAfccaaususa	1985	đổi nghĩ a	23
AAUAACCUGUGAA AAUGCUC	890	asasuaacCfuGfUfGf aaaaugcuccL96	1986	có nghĩ a	21
GGAGCAUUUUCAC AGGUUAUUGC	891	gsGfsagcAfuUfUfuc acAfgGfuauusgsc	1987	đổi nghĩ a	23
AUAACCUGUGAAA AUGCUC	892	asusaaccUfgUfGfAf aaaugcuccL96	1988	có nghĩ a	21
GGGAGCAUUUUCA CAGGUUAUUG	893	gsGfsgagCfaUfUfu caCfaGfguuausug	1989	đổi nghĩ a	23
UAGCAAUAACCUG UGAAAAUG	894	usasgcaaUfaAfCfCf ugugaaaaugL96	1990	có nghĩ a	21
CAUUUUCACAGGU UAUUGCUAUC	895	csAfsuuuUfcAfCfag guUfaUfugcuasusc	1991	đổi nghĩ a	23
AUAGCAAUAACCU GUGAAAAU	896	asusagcaAfuAfAfCf cugugaaaauL96	1992	có nghĩ a	21

- 227 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
AUUUUCACAGGUU AUUGCUAUCC	897	asUfsuuuCfaCfAfgg uuAfuUfgcuauscsc	1993	đổi nghĩ a	23
AAUCACAUCUUUA GUGUCUGA	898	asasucacAfuCfUfUf uagugucugaL96	1994	có nghĩ a	21
UCAGACACUAAAG AUGUGAUUGG	899	usCfsagaCfaCfUfaa agAfuGfugauusgsg	1995	đổi nghĩ a	23
AUCACAUCUUUAG UGUCUGAA	900	asuscacaUfcUfUfUf agugucugaaL96	1996	có nghĩ a	21
UUCAGACACUAAA GAUGUGAUUG	901	usUfscagAfcAfCfua aaGfaUfgugaususg	1997	đổi nghĩ a	23
UUCCAAUCACAUC UUUAGUGU	902	ususccaaUfcAfCfAf ucuuuaguguL96	1998	có nghĩ a	21
ACACUAAAGAUGU GAUUGGAAAU	903	asCfsacuAfaAfGfau guGfaUfuggaasasu	1999	đổi nghĩ a	23
UUUCCAAUCACAU CUUUAGUG	904	ususuccaAfuCfAfCf aucuuuagugL96	2000	có nghĩ a	21

- 228 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
CACUAAAGAUGUG AUUGGAAAUC	905	csAfscuaAfaGfAfug ugAfuUfggaaasusc	2001	đổi nghĩ a	23
ACGGGCAUGAUGU UGAGUUCC	906	ascsgggcAfuGfAfUf guugaguuccL96	2002	có nghĩ a	21
GGAACUCAACAUC AUGCCCGUUC	907	gsGfsaacUfcAfAfca ucAfuGfccccgususc	2003	đổi nghĩ a	23
CGGGCAUGAUGUU GAGUUCCU	908	csgsggcaUfgAfUfGf uugaguuccuL96	2004	có nghĩ a	21
AGGAACUCAACAU CAUGCCCGUU	909	asGfsgaaCfuCfAfac auCfaUfgccccgsusu	2005	đổi nghĩ a	23
GGGAACGGGCAUG AUGUUGAG	910	gsgsgaacGfgGfCfAf ugauguugagL96	2006	có nghĩ a	21
CUCAACAUCAUGC CCGUUCCCAG	911	csUfscaaCfaUfCfau gcCfcGfuucccsasg	2007	đổi nghĩ a	23
UGGGAACGGGCAU GAUGUUGA	912	usgsggaaCfgGfGfCf augauguugaL96	2008	có nghĩ a	21

- 229 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
UCAACAUCAUGCC CGUUCCCAGG	913	usCfsaacAfuCfAfug ccCfgUfucccasgsg	2009	đổi nghĩ a	23
ACUAAGGUGAAAA GAUAAUGA	914	ascsuaagGfuGfAfAf aagauaaugaL96	2010	có nghĩ a	21
UCAUUAUCUUUUC ACCUUAGUGU	915	usCfsauuAfuCfUfuu ucAfcCfuuagusgsu	2011	đổi nghĩ a	23
CUAAGGUGAAAAG AUAAUGAU	916	csusaaggUfgAfAfAf agauaaugaL96	2012	có nghĩ a	21
AUCAUUAUCUUUU CACCUUAGUG	917	asUfscAUfaUfCfu uuCfaCfcuuagsusg	2013	đổi nghĩ a	23
AAACACUAAGGUG AAAAGAU	918	asasacacUfaAfGfGf ugaaaagauaL96	2014	có nghĩ a	21
UAUCUUUUCACCU UAGUGUUUGC	919	usAfsucuUfuUfCfac cuUfaGfuguuusgsc	2015	đổi nghĩ a	23
CAAACACUAAGGU GAAAAGAU	920	csasaacaCfuAfAfGf gugaaaagauL96	2016	có nghĩ a	21

- 230 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:		Chiề u dài
AUCUUUUCACCUU AGUGUUUGCU	921	asUfscuuUfuCfAfcc uuAfgUfguuugscsu	2017	đổi nghĩ a	23
AGGUAGCACUGGA GAGAAUUG	922	asgsguagCfaCfUfGf gagagaauugL96	2018	có nghĩ a	21
CAAUUCUCUCCAG UGCUACCUUC	923	csAfsauuCfuCfUfcc agUfgCfuaccususc	2019	đổi nghĩ a	23
GGUAGCACUGGAG AGAAUUGG	924	gsgsuagcAfcUfGfGf agagaauuggL96	2020	có nghĩ a	21
CCAAUUCUCUCCA GUGCUACCUU	925	csCfsaauUfcUfCfuc caGfuGfcuaccsusu	2021	đổi nghĩ a	23
GAGAAGGUAGCAC UGGAGAGA	926	gsasgaagGfuAfGfCf acuggagagaL96	2022	có nghĩ a	21
UCUCUCCAGUGCU ACCUUCUCAA	927	usCfsucuCfcAfGfug cuAfcCfuucucsasa	2023	đổi nghĩ a	23
UGAGAAGGUAGCA CUGGAGAG	928	usgsagaaGfgUfAfGf cacuggagagL96	2024	có nghĩ a	21

- 231 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
CUCUCCAGUGCUA CCUUCUCAA	929	csUfscucCfaGfUfgc uaCfcUfucucasasa	2025	đổi nghĩ a	23
AGUGGACUUGCUG CAUAUGUG	930	asgsuggaCfuUfGfCf ugcauaugugL96	2026	có nghĩ a	21
CACAU AUGCAGCA AGUCCACUGU	931	csAfscauAfuGfCfag caAfgUfccacusgsu	2027	đổi nghĩ a	23
GUGGACUUGCUGC AUAUGUGG	932	gsusggacUfuGfCfUf gcauauguggL96	2028	có nghĩ a	21
CCACAU AUGCAGC AAGUCCACUG	933	csCfsacaUfaUfGfca gcAfaGfuccacsusg	2029	đổi nghĩ a	23
CGACAGUGGACUU GCUGCAUA	934	csgsacagUfgGfAfCf uugcugcauaL96	2030	có nghĩ a	21
UAUGCAGCAAGUC CACUGUCGUC	935	usAfsugcAfgCfAfag ucCfaCfugucgsusc	2031	đổi nghĩ a	23
ACGACAGUGGACU UGCUGCAU	936	ascsgacaGfuGfGfAf cuugcugcauL96	2032	có nghĩ a	21

- 232 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
AUGCAGCAAGUCC ACUGUCGUCU	937	asUfsgcaGfcAfAfgu ccAfcUfgucguscsu	2033	đổi nghĩ a	23
AAGGUGUUCAAGA UGUCCUCG	938	asasggugUfuCfAfAf gauguccucgL96	2034	có nghĩ a	21
CGAGGACAUCUUG AACACCUUUC	939	csGfsaggAfcAfUfcu ugAfaCfaccuususc	2035	đổi nghĩ a	23
AGGUGUUCAAGAU GUCCUCGA	940	asgsguguUfcAfAfGf auguccucgaL96	2036	có nghĩ a	21
UCGAGGACAUCUU GAACACCUUU	941	usCfsgagGfaCfAfuc uuGfaAfcaccususu	2037	đổi nghĩ a	23
GAGAAAGGUGUUC AAGAUGUC	942	gsasgaaaGfgUfGfUf ucaagaugucL96	2038	có nghĩ a	21
GACAUCUUGAACA CCUUUCUCCC	943	gsAfscauCfuUfGfaa caCfcUfuucucscsc	2039	đổi nghĩ a	23
GGAGAAAGGUGUU CAAGAUGU	944	gsgsagaaAfgGfUfGf uucaagauguL96	2040	có nghĩ a	21

- 233 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
ACAUCUUGAACAC CUUUCUCCCC	945	asCfsaucUfuGfAfac acCfuUfucuccscsc	2041	đổi nghĩ a	23
AACCGUCUGGAUG AUGUGCGU	946	asasccguCfuGfGfAf ugaugugcguaL96	2042	có nghĩ a	21
ACGCACAUCAUCC AGACGGUUGC	947	asCfsgcaCfaUfCfau ccAfgAfcgguusgsc	2043	đổi nghĩ a	23
ACCGUCUGGAUGA UGUGCGUA	948	ascscgucUfgGfAfUf gaugugcguaL96	2044	có nghĩ a	21
UACGCACAUCAUC CAGACGGUUG	949	usAfscgcAfcAfUfca ucCfaGfacggususg	2045	đổi nghĩ a	23
GGGCAACCGUCUG GAUGAUGU	950	gsgsgcaaCfcGfUfCf uggaugauguL96	2046	có nghĩ a	21
ACAUCAUCCAGAC GGUUGCCCAG	951	asCfsaucAfuCfCfag acGfgUfugcccsasg	2047	đổi nghĩ a	23
UGGGCAACCGUCU GGAUGAUG	952	usgsggcaAfcCfGfUf cuggaugaugL96	2048	có nghĩ a	21

- 234 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:		Chiề u dài
CAUCAUCCAGACG GUUGCCCAGG	953	csAfsucaUfcCfAfga cgGfuUfgcccasgsg	2049	đổi nghĩ a	23
GAAACUUUGGCUG AUAAUAUU	954	gsasaacuUfuGfGfCf ugauaauauuL96	2050	có nghĩ a	21
AAUAUUAUCAGCC AAAGUUUCUU	955	asAfsuauUfaUfCfag ccAfaAfguuucsusu	2051	đổi nghĩ a	23
AAACUUUGGCUGA UAAUAUUG	956	asasacuuUfgGfCfUf gauaauauugL96	2052	có nghĩ a	21
CAAUAUUAUCAGC CAAAGUUUCU	957	csAfsauaUfuAfUfca gcCfaAfaguuuscsu	2053	đổi nghĩ a	23
UGAAGAAACUUUG GCUGAUAA	958	usgsaagaAfaCfUfUf uggcugauaaL96	2054	có nghĩ a	21
UUAUCAGCCAAAG UUUCUUCAUC	959	usUfsaucAfgCfCfaa agUfuUfcuucasusc	2055	đổi nghĩ a	23
AUGAAGAAACUUU GGCUGAUA	960	asusgaagAfaAfCfUf uuggcugauaL96	2056	có nghĩ a	21

- 235 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:		Chiề u dài
UAUCAGCCAAAGU UUCUUCAUCA	961	usAfsucaGfcCfAfaa guUfuCfuucauscsa	2057	đổi nghĩ a	23
AAAGGUGUUCAAG AUGUCCUC	962	asasagguGfuUfCfAf agauguccucL96	2058	có nghĩ a	21
GAGGACAUCUUGA ACACCUUUCU	963	gsAfsग्gaCfaUfCfuu gaAfcAfccuuuscsu	2059	đổi nghĩ a	23
AAGGUGUUCAAGA UGUCCUCG	964	asasggugUfuCfAfAf gauguccucgL96	2060	có nghĩ a	21
CGAGGACAUCUUG AACACCUUUC	965	csGfsaggAfcAfUfcu ugAfaCfaccuususc	2061	đổi nghĩ a	23
GGAGAAAGGUGUU CAAGAUGU	966	gsgsagaaAfgGfUfGf uucaagauguL96	2062	có nghĩ a	21
ACAUCUUGAACAC CUUUCUCCCC	967	asCfsaucUfuGfAfac acCfuUfucuccscsc	2063	đổi nghĩ a	23
GGGAGAAAGGUGU UCAAGAUG	968	gsgsgagaAfaGfGfUf guucaagaugL96	2064	có nghĩ a	21

- 236 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
CAUCUUGAACACC UUUCUCCCCC	969	csAfsucuUfgAfAfca ccUfuUfcuccccscsc	2065	đổi nghĩ a	23
AAAUCAGUACUUC CAAAGUCU	970	asasaucaGfuAfCfUf uccaaagucul96	2066	có nghĩ a	21
AGACUUUGGAAGU ACUGAUUUAG	971	asGfsacuUfuGfGfaa guAfcUfgauuusasg	2067	đổi nghĩ a	23
AAUCAGUACUUCC AAAGUCUA	972	asasucagUfaCfUfUf ccaaagucuaL96	2068	có nghĩ a	21
UAGACUUUGGAAG UACUGAUUUA	973	usAfsagacUfuUfGfga agUfaCfugauususa	2069	đổi nghĩ a	23
UGCUAAAUCAGUA CUUCCAAA	974	usgscuaaAfuCfAfGf uacuuccaaaL96	2070	có nghĩ a	21
UUUGGAAGUACUG AUUUAGCAUG	975	usUfsuggAfaGfUfac ugAfuUfuagcasusg	2071	đổi nghĩ a	23
AUGC AAAUCAGU ACUUCCAA	976	asusgcuaAfaUfCfAf guacuuccaaL96	2072	có nghĩ a	21

- 237 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
UUGGAAGUACUGA UUUAGCAUGU	977	usUfsggaAfgUfAfcu gaUfuUfagcausgsu	2073	đổi nghĩ a	23
ACAUCUUUAGUGU CUGAAUAU	978	ascsaucuUfuAfGfUf gucugaaauauL96	2074	có nghĩ a	21
AUAUUCAGACACU AAAGAUGUGA	979	asUfsauuCfaGfAfca cuAfaAfgaugusgsa	2075	đổi nghĩ a	23
CAUCUUUAGUGUC UGAAUAUA	980	csasucuuUfaGfUfGf ucugaaauauaL96	2076	có nghĩ a	21
UAUAUUCAGACAC UAAAGAUGUG	981	usAfsuauUfcAfGfac acUfaAfagaugsusg	2077	đổi nghĩ a	23
AAUCACAUCUUUA GUGUCUGA	982	asasucacAfuCfUfUf uagugucugaL96	2078	có nghĩ a	21
UCAGACACUAAAG AUGUGAUUGG	983	usCfsagaCfaCfUfaa agAfuGfugauusgsg	2079	đổi nghĩ a	23
CAAUCACAUCUUU AGUGUCUG	984	csasaucacfaUfCfUf uuagugucugL96	2080	có nghĩ a	21

- 238 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
CAGACACUAAAGA UGUGAUUGGA	985	csAfsgacAfcUfAfaa gaUfgUfgauugsgsa	2081	đổi nghĩ a	23
GCAUGUAUUACUU GACAAAGA	986	gscsauguAfuUfAfCf uugacaaagaL96	2082	có nghĩ a	21
UCUUUGUCAAGUA AUACAUGCUG	987	usCfsuuuGfuCfAfag uaAfuAfcaugcsusg	2083	đổi nghĩ a	23
CAUGUAUUACUUG ACAAAGAG	988	csasuguaUfuAfCfUf ugacaaagagL96	2084	có nghĩ a	21
CUCUUUGUCAAGU AAUACAUGCUG	989	csUfscuuUfgUfCfaa guAfaUfacaugscsu	2085	đổi nghĩ a	23
UUCAGCAUGUAUU ACUUGACA	990	ususcagcAfuGfUfAf uuacuugacaL96	2086	có nghĩ a	21
UGUCAAGUAAUAC AUGCUGAAAA	991	usGfsucaAfgUfAfau acAfuGfcugaasasa	2087	đổi nghĩ a	23
UUUCAGCAUGUAU UACUUGAC	992	ususucagCfaUfGfUf auuacuugacL96	2088	có nghĩ a	21

- 239 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
GUCAAGUAAUACA UGCUGAAAAA	993	gsUfscaaGfuAfAfua caUfgCfugaaasasa	2089	đổi nghĩ a	23
AUGUUACUUCUUA GAGAGAAA	994	asusguuaCfuUfCfUf uagagagaaaaL96	2090	có nghĩ a	21
UUUCUCUCUAAGA AGUAACAUAAC	995	usUfsucuCfuCfUfaa gaAfgUfaacausasc	2091	đổi nghĩ a	23
UGUUACUUCUUAG AGAGAAAU	996	usgsuuacUfuCfUfUf agagagaaaauL96	2092	có nghĩ a	21
AUUUCUCUCUAAG AAGUAACAUA	997	asUfsuucUfcUfCfua agAfaGfuaacasusa	2093	đổi nghĩ a	23
AUGUAUGUUACUU CUUAGAGA	998	asusguauGfuUfAfCf uucuuagagaL96	2094	có nghĩ a	21
UCUCUAAGAAGUA ACAUACAUCC	999	usCfsucuAfaGfAfag uaAfcAfuacauscsc	2095	đổi nghĩ a	23
GAUGUAUGUUACU UCUUAGAG	1000	gsasuguaUfgUfUfAf cuucuuagagL96	2096	có nghĩ a	21

- 240 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
CUCUAAGAAGUAA CAUACAUCU	1001	csUfscuaAfgAfAfgu aaCfaUfacaucscsu	2097	đổi nghĩ a	23
ACAACUUUGAGAA GGUAGCAC	1002	ascsaacuUfuGfAfGf aagguagcacL96	2098	có nghĩ a	21
GUGCUACCUUCUC AAAGUUGUGA	1003	gsUfsgcuAfcCfUfuc ucAfaAfguugusgsa	2099	đổi nghĩ a	23
CAACUUUGAGAAG GUAGCACU	1004	csasacuuUfgAfGfAf agguagcacuL96	2100	có nghĩ a	21
AGUGCUACCUUCU CAAAGUUGUG	1005	asGfsugcUfaCfCfu cuCfaAfaguugsusg	2101	đổi nghĩ a	23
AUUCACAACUUUG AGAAGGUA	1006	asusucacAfaCfUfUf ugagaagguaL96	2102	có nghĩ a	21
UACCUUCUCAAG UUGUGAAUCA	1007	usAfscuUfcUfCfaa agUfuGfugaauscsa	2103	đổi nghĩ a	23
GAUUCACAACUUU GAGAAGGU	1008	gsasuucaCfaAfCfUf uugagaagguL96	2104	có nghĩ a	21

- 241 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
ACCUUCUCAAAGU UGUGAAUCAG	1009	asCfscuuCfuCfAfaa guUfgUfgaaucsasg	2105	đổi nghĩ a	23
AACAUGCUGAAAUC AGUACUUC	1010	asascaugCfuAfAfAf ucaguacuucL96	2106	có nghĩ a	21
GAAGUACUGAUUU AGCAUGUUGU	1011	gsAfsaguAfcUfGfau uuAfgCfauguusgsu	2107	đổi nghĩ a	23
ACAUGCUGAAAUCA GUACUUC	1012	ascsaugcUfaAfAfUf caguacuuccL96	2108	có nghĩ a	21
GGAAGUACUGAUU UAGCAUGUUG	1013	gsGfsaagUfaCfUfga uuUfaGfcaugusug	2109	đổi nghĩ a	23
GAACAACAUGCUA AAUCAGUA	1014	gsasacaaCfaUfGfCf uaaaucaguaL96	2110	có nghĩ a	21
UACUGAUUUAGCA UGUUGUUCAU	1015	usAfscugAfuUfUfag caUfgUfuguucsasu	2111	đổi nghĩ a	23
UGAACAACAUGCU AAAUCAGU	1016	usgsaacaAfcAfUfGf cuaaaucaguL96	2112	có nghĩ a	21

- 242 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
ACUGAUUUAGCAU GUUGUUCAUA	1017	asCfsugaUfuUfAfgc auGfuUfguucasusa	2113	đổi nghĩ a	23
AAACCAGUACUUU AUCAUUUU	1018	asasaccaGfuAfCfUf uuaucauuuuL96	2114	có nghĩ a	21
AAAAUGAUAAAGU ACUGGUUUCA	1019	asAfsaauGfaUfAfaa guAfcUfgguuuscsa	2115	đổi nghĩ a	23
AACCAGUACUUUA UCAUUUUC	1020	asasccagUfaCfUfUf uaucauuuucL96	2116	có nghĩ a	21
GAAAAUGAUAAAG UACUGGUUUC	1021	gsAfsaaaUfgAfUfaa agUfaCfugguususc	2117	đổi nghĩ a	23
UUUGAAACCAGUA CUUUAUCA	1022	ususugaaAfcCfAfGf uacuuuaucaL96	2118	có nghĩ a	21
UGAUAAAGUACUG GUUUCAAAAU	1023	usGfsauaAfaGfUfac ugGfuUfucaaasasu	2119	đổi nghĩ a	23
UUUUGAAACCAGU ACUUUAUC	1024	ususuugaAfaCfCfAf guacuuuaucaL96	2120	có nghĩ a	21

- 243 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
GAUAAAGUACUGG UUUCAAAAUU	1025	gsAfsuaaAfgUfAfcu ggUfuUfcaaaaasusu	2121	đổi nghĩ a	23
GAGAAGAUGGGCU ACAAGGCC	1026	gsasgaagAfuGfGfGf cuacaaggccL96	2122	có nghĩ a	21
GGCCUUGUAGCCC AUCUUCUCUG	1027	gsGfscceuUfgUfAfgc ccAfuCfuucucsusg	2123	đổi nghĩ a	23
AGAAGAUGGGCUA CAAGGCCA	1028	asgsaagaUfgGfGfCf uacaaggccaL96	2124	có nghĩ a	21
UGGCCUUGUAGCC CAUCUUCUCU	1029	usGfsgccUfuGfUfag ccCfaUfcuucuscsu	2125	đổi nghĩ a	23
GGCAGAGAAGAUG GGCUACAA	1030	gsgscagaGfaAfGfAf ugggcuacaaL96	2126	có nghĩ a	21
UUGUAGCCCAUCU UCUCUGCCUG	1031	usUfsguaGfcCfCfau cuUfcUfcugccsusg	2127	đổi nghĩ a	23
AGGCAGAGAAGAU GGGCUACA	1032	asgsgcagAfgAfAfGf augggcuacaL96	2128	có nghĩ a	21

- 244 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
UGUAGCCCAUCUU CUCUGCCUGC	1033	usGfsuagCfcCfAfuc uuCfuCfugccusgsc	2129	đổi nghĩ a	23
AACGGGCAUGAUG UUGAGUUC	1034	asascgggCfaUfGfAf uguugaguucL96	2130	có nghĩ a	21
GAACUCAACAUC UGCCCGUUC	1035	gsAfsacuCfaAfCfau caUfgCfccguuscsc	2131	đổi nghĩ a	23
ACGGGCAUGAUGU UGAGUUC	1036	ascsgggcAfuGfAfUf guugaguuccL96	2132	có nghĩ a	21
GGAACUCAACAUC AUGCCCGUUC	1037	gsGfsaacUfcAfAfca ucAfuGfcccgususc	2133	đổi nghĩ a	23
UGGGAACGGGCAU GAUGUUGA	1038	usgsggaaCfgGfGfCf augauguugaL96	2134	có nghĩ a	21
UCAACAUCAUGCC CGUUCCCAGG	1039	usCfsaacAfuCfAfug ccCfgUfucccasgsg	2135	đổi nghĩ a	23
CUGGGAACGGGCA UGAUGUUG	1040	csusgggaAfcGfGfGf caugauguugL96	2136	có nghĩ a	21

- 245 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
CAACAUCAUGCCC GUUCCCAGGG	1041	csAfsacaUfcAfUfgc ccGfuUfcccagsgsg	2137	đổi nghĩ a	23
AUGUGGCUAAAGC AAUAGACC	1042	asusguggCfuAfAfAf gcaauagaccL96	2138	có nghĩ a	21
GGUCUAUUGCUUU AGCCACAUAU	1043	gsGfsucuAfuUfGfCu uuAfgCfcacausasu	2139	đổi nghĩ a	23
UGUGGCUAAAGCA AUAGACCC	1044	usgsuggcUfaAfAfGf caauagacccL96	2140	có nghĩ a	21
GGGUCUAUUGCUU UAGCCACAUA	1045	gsGfsgucUfaUfUfgc uuUfaGfccacasusa	2141	đổi nghĩ a	23
GCAUAUGUGGCUA AAGCAAUA	1046	gscsauauGfuGfGfCf uaaagcaauaL96	2142	có nghĩ a	21
UAUUGCUUUAGCC ACAUAUGCAG	1047	usAfsuugCfuUfUfag ccAfcAfuaugcsasg	2143	đổi nghĩ a	23
UGCAUAUGUGGCU AAAGCAAU	1048	usgscauaUfgUfGfGf cuaaagcaauL96	2144	có nghĩ a	21

- 246 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
AUUGCUIIUAGCCA CAUAUGCAGC	1049	asUfsugcUfuUfAfgc caCfaUfaugcasgsc	2145	đổi nghĩ a	23
AGGAUGCUCGGGA AUGUUGCU	1050	asgsgaugCfuCfCfGf gaauguugcuL96	2146	có nghĩ a	21
AGCAACAUIUCGG AGCAUCCUUG	1051	asGfscaaCfaUfUfcc ggAfgCfauccususg	2147	đổi nghĩ a	23
GGAUGCUCGGGAA UGUUGCUG	1052	gsgsaugcUfcCfGfGf aauguugcugL96	2148	có nghĩ a	21
CAGCAACAUIUCGG GAGCAUCCUU	1053	csAfsgcaAfcAfUfuc cgGfaGfcauccsusu	2149	đổi nghĩ a	23
UCCAAGGAUGCUC CGGAAUGU	1054	uscscaagGfaUfGfCf uccggaauguL96	2150	có nghĩ a	21
ACAUUCCGGAGCA UCCUUGGAUA	1055	asCfsauuCfCfGfGfag caUfcCfuuggasusa	2151	đổi nghĩ a	23
AUCCAAGGAUGCU CCGGAUG	1056	asusccaaGfgAfUfGf cuccggaugL96	2152	có nghĩ a	21

- 247 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
CAUCCGGAGCAU CCUUGGAUAC	1057	csAfsuucCfgGfAfgc auCfcUfuggausasc	2153	đổi nghĩ a	23
UCACAUCUUUAGU GUCUGAAU	1058	uscsacauCfuUfUfAf gugucugaauL96	2154	có nghĩ a	21
AUUCAGACACUAA AGAUGUGAUU	1059	asUfsucaGfaCfAfcu aaAfgAfugugasusu	2155	đổi nghĩ a	23
CACAUCUUUAGUG UCUGAAUA	1060	csascaucUfuUfAfGf ugucugaauaL96	2156	có nghĩ a	21
UAUUCAGACACUA AAGAUGUGAU	1061	usAfsuucAfgAfCfac uaAfaGfaugugsasu	2157	đổi nghĩ a	23
CCAAUCACAUCUU UAGUGUCU	1062	cscsaauCfCfUfCf uuuagugucuL96	2158	có nghĩ a	21
AGACACUAAAGAU GUGAUUGGAA	1063	asGfsacaCfuAfAfag auGfuGfauuggsasa	2159	đổi nghĩ a	23
UCCAAUCACAUCU UUAGUGUC	1064	uscscaauCfaCfAfUf cuuuagugucL96	2160	có nghĩ a	21

- 248 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
GACACUAAAGAUG UGAUUGGAAA	1065	gsAfscacUfaAfAfga ugUfgAfuuggasasa	2161	đổi nghĩ a	23
AAAUGUGUUUAGA CAACGUCA	1066	asasauguGfuUfUfAf gacaacgucaL96	2162	có nghĩ a	21
UGACGUUGUCUAA ACACAUUUUC	1067	usGfsacgUfuGfUfcu aaAfcAfcauuususc	2163	đổi nghĩ a	23
AAUGUGUUUAGAC AACGUCAU	1068	asasugugUfuUfAfGf acaacgucauL96	2164	có nghĩ a	21
AUGACGUUGUCUA AACACAUUUU	1069	asUfsgacGfuUfGfuc uaAfaCfacauususu	2165	đổi nghĩ a	23
UUGAAAAUGUGUU UAGACAAC	1070	ususgaaaAfuGfUfGf uuuagacaacL96	2166	có nghĩ a	21
GUUGUCUAAACAC AUUUUCAUG	1071	gsUfsuguCfuAfAfac acAfuUfuucaasusg	2167	đổi nghĩ a	23
AUUGAAAAUGUGU UUAGACAA	1072	asusugaaAfaUfGfUf guuuagacaaL96	2168	có nghĩ a	21

- 249 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
UUGUCUAAACACA UUUUCA AUGU	1073	usUfsgucUfaAfAfca caUfuUfucaausgsu	2169	đổi nghĩ a	23
UACUAAAGGAAGA AUUCCGGU	1074	usascuaaAfgGfAfAf gaauuccgguL96	2170	có nghĩ a	21
ACCGGAUUCUUC CUUUAGUAUC	1075	asCfscggAfaUfUfcu ucCfuUfuaguasusc	2171	đổi nghĩ a	23
ACUAAAGGAAGAA UUCCGGUU	1076	ascsuaaaaGfgAfAfGf aauuccgguuL96	2172	có nghĩ a	21
AACCGGAUUCUU CCUUAGUAU	1077	asAfsccgGfaAfUfuc uuCfcUfuuagusasu	2173	đổi nghĩ a	23
GAGAUACUAAAGG AAGAAUUC	1078	gsasgauaCfuAfAfAf ggaagaauucL96	2174	có nghĩ a	21
GAAUUCUCCUUU AGUAUCUCGA	1079	gsAfsauuCfuUfCfcu uuAfgUfaucucsgsa	2175	đổi nghĩ a	23
CGAGAUACUAAAG GAAGAAUU	1080	csgsagauAfcUfAfAf aggaagaauuL96	2176	có nghĩ a	21

- 250 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
AAUUCUCCUUUA GUAUCUCGAG	1081	asAfsuucUfuCfCfu uaGfuAfucucgsasg	2177	đổi nghĩ a	23
AACUUUGGCUGAU AAUAUUGC	1082	asascuuuGfgCfUfGf aauauauugcL96	2178	có nghĩ a	21
GCAAUAUUAUCAG CCAAAGUUUC	1083	gsCfsaauAfuUfAfuc agCfcAfaaguususc	2179	đổi nghĩ a	23
ACUUUGGCUGAUA AUAUUGCA	1084	ascsuuugGfcUfGfAf uaauauugcaL96	2180	có nghĩ a	21
UGCAAUAUUAUCA GCCAAAGUUU	1085	usGfscaaUfaUfUfau caGfcCfaaagususu	2181	đổi nghĩ a	23
AAGAAACUUUGGC UGAUAAUA	1086	asasgaaaCfuUfUfGf gcugauaauaL96	2182	có nghĩ a	21
UAUUAUCAGCCAA AGUUUCUUCA	1087	usAfsuuaUfcAfGfcc aaAfgUfuucuuscsa	2183	đổi nghĩ a	23
GAAGAAACUUUGG CUGAUAAU	1088	gsasagaaAfcUfUfUf ggcugauaauL96	2184	có nghĩ a	21

- 251 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:		Chiề u dài
AUUAUCAGCCAAA GUUUCUUCAU	1089	asUfsuauCfaGfCfca aaGfuUfucuucsasu	2185	đổi nghĩ a	23
AAAUGGCUGAGAA GACUGACA	1090	asasauggCfuGfAfGf aagacugacaL96	2186	có nghĩ a	21
UGUCAGUCUUCUC AGCCAUUUGA	1091	usGfsucaGfuCfUfuc ucAfgCfcatauusgsa	2187	đổi nghĩ a	23
AAUGGCUGAGAAG ACUGACAU	1092	asasuggcUfgAfGfAf agacugacauL96	2188	có nghĩ a	21
AUGUCAGUCUUCU CAGCCAUUUG	1093	asUfsgucAfgUfCfuu cuCfaGfccauususg	2189	đổi nghĩ a	23
UAUCAAAUGGCUG AGAAGACU	1094	usasucaaAfuGfGfCf ugagaagacuL96	2190	có nghĩ a	21
AGUCUUCUCAGCC AUUUGAUAUC	1095	asGfsucuUfcUfCfag ccAfuUfugauasusc	2191	đổi nghĩ a	23
AUAUCAAAUGGCU GAGAAGAC	1096	asusaucaAfaUfGfGf cugagaagacL96	2192	có nghĩ a	21

- 252 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
GUCUUCUCAGCCA UUUGAUAUCU	1097	gsUfscuuCfuCfAfgc caUfuUfgauauscsu	2193	đổi nghĩ a	23
GUGGUUCUAAAAU UGUAAGCU	1098	gsusgguuCfuUfAfAf auuguaagcuL96	2194	có nghĩ a	21
AGCUUACAAUUUA AGAACCACUG	1099	asGfscuuAfcAfAfuu uaAfgAfaccacsusg	2195	đổi nghĩ a	23
UGGUUCUAAAAUU GUAAGCUC	1100	usgsguucUfuAfAfAf uuguaagcucL96	2196	có nghĩ a	21
GAGCUUACAAUUU AAGAACCACU	1101	gsAfsgcuUfaCfAfau uuAfaGfaaccascsu	2197	đổi nghĩ a	23
AACAGUGGUUCUU AAAUUGUA	1102	asascaguGfgUfUfCf uuaaaauuguaL96	2198	có nghĩ a	21
UACAAUUUAAGAA CCACUGUUUU	1103	usAfscaaUfuUfAfag aaCfcAfcuguususu	2199	đổi nghĩ a	23
AAACAGUGGUUCU UAAAUUGU	1104	asasacagUfgGfUfUf cuuaaaauuguL96	2200	có nghĩ a	21

- 253 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
ACAAUUUAAGAAC CACUGUUUUA	1105	asCfsaauUfuAfAfga acCfaCfuguuususa	2201	đổi nghĩ a	23
AAGUCAUCGACAA GACAUUGG	1106	asasgucaUfcGfAfCf aagacauuggL96	2202	có nghĩ a	21
CCAAUGUCUUGUC GAUGACUUUC	1107	csCfsaauGfuCfUfug ucGfaUfgacuuusc	2203	đổi nghĩ a	23
AGUCAUCGACAAG ACAUUGGU	1108	asgsucauCfgAfCfAf agacauugguL96	2204	có nghĩ a	21
ACCAAUGUCUUGU CGAUGACUUU	1109	asCfscaaUfgUfCfu guCfgAfugacususu	2205	đổi nghĩ a	23
GUGAAAGUCAUCG ACAAGACA	1110	gsusgaaaGfuCfAfUf cgacaagacaL96	2206	có nghĩ a	21
UGUCUUGUCGAUG ACUUUCACAU	1111	usGfsucuUfgUfCfga ugAfcUfuucacsasu	2207	đổi nghĩ a	23
UGUGAAAGUCAUC GACAAGAC	1112	usgsugaaAfgUfCfAf ucgacaagacL96	2208	có nghĩ a	21

- 254 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
GUCUUGUCGAUGA CUUUCACAUU	1113	gsUfscuuGfuCfGfau gaCfuUfucacasusu	2209	đổi nghĩ a	23
GAUAAUAUUGCAG CAUUUUC	1114	gsasuaauAfuUfGfCf agcauuuuccL96	2210	có nghĩ a	21
GGAAAUGCUGCA AUAUUAUCAG	1115	gsGfsaaaAfuGfCfug caAfuAfuuaucsasg	2211	đổi nghĩ a	23
AUAAUAUUGCAGC AUUUUCCA	1116	asusaauaUfuGfCfAf gcauuuuccaL96	2212	có nghĩ a	21
UGGAAAUGCUGC AAUAUUAUCA	1117	usGfsgaaAfaUfGfcu gcAfaUfauuauscsa	2213	đổi nghĩ a	23
GGCUGAUAAUAUU GCAGCAUU	1118	gsgscugaUfaAfUfAf uugcagcauuL96	2214	có nghĩ a	21
AAUGCUGCAAUAU UAUCAGCCAA	1119	asAfsugcUfgCfAfau auUfaUfcagccsasa	2215	đổi nghĩ a	23
UGGCUGAUAAUAU UGCAGCAU	1120	usgsgcugAfuAfAfUf auugcagcauL96	2216	có nghĩ a	21

- 255 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
AUGCUGCAAUAU AUCAGCCAAA	1121	asUfsgcuGfcAfAfua uuAfuCfagccasasa	2217	đổi nghĩ a	23
GCUAAUUUGUAUC AAUGAUUA	1122	gsclsuaauUfuGfUfAf ucaaugauuaL96	2218	có nghĩ a	21
UAAUCAUUGAUAC AAAUUAGCCG	1123	usAfsaucAfuUfGfau acAfaAfuuagcscsg	2219	đổi nghĩ a	23
CUAAUUUGUAUCA AUGAUUAU	1124	csusaauUfgUfAfUf caaugauuaL96	2220	có nghĩ a	21
AUAAUCAUUGAUA CAAUUAGCC	1125	asUfsaauCfaUfUfga uaCfaAfauuagscsc	2221	đổi nghĩ a	23
CCCGGCUAAUUUG UAUCA AUG	1126	cscscggcUfaAfUfUf uguaucaaugL96	2222	có nghĩ a	21
CAUUGAUACAAAU UAGCCGGGGG	1127	csAfsuugAfuAfCfaa auUfaGfccgggsgsg	2223	đổi nghĩ a	23
CCCCGGCUAAUUU GUAUCAAU	1128	cscscggCfuAfAfUf uuguaucaauL96	2224	có nghĩ a	21

- 256 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
AUUGAUACAAUU AGCCGGGGGA	1129	asUfsugaUfaCfAfaa uuAfgCfcggggsgsa	2225	đổi nghĩ a	23
UAAUUGGUGAUAC UUCUUUGA	1130	usasauugGfuGfAfUf acuucuugaL96	2226	có nghĩ a	21
UCAAAGAAGUAUC ACCAAUUACC	1131	usCfsaaaGfaAfGfua ucAfcCfaauuascsc	2227	đổi nghĩ a	23
AAUUGGUGAUACU UCUUUGAA	1132	asasuuggUfgAfUfAf cuucuugaL96	2228	có nghĩ a	21
UUCAAGAAGUAU CACCAAUUAC	1133	usUfscaaAfgAfAfgu auCfaCfcauusasc	2229	đổi nghĩ a	23
GCGGUAAUUGGUG AUACUUCU	1134	gscsgguaAfuUfGfGf ugauacuucuL96	2230	có nghĩ a	21
AGAAGUAUCACCA AUUACCGCCA	1135	asGfsaagUfaUfCfac caAfuUfaccgcscsa	2231	đổi nghĩ a	23
GGCGGUAAUUGGU GAUACUUC	1136	gsgscgguAfaUfUfGf gugauacuucL96	2232	có nghĩ a	21

- 257 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:		Chiề u dài
GAAGUAUCACCAA UUACCGCCAC	1137	gsAfsaguAfuCfAfcc aaUfuAfccgccsasc	2233	đổi nghĩ a	23
CAGUGGUUCUUA AUUGUAAG	1138	csasguggUfuCfUfUf aaauuguaagL96	2234	có nghĩ a	21
CUUACAAUUUAAG AACCACUGUU	1139	csUfsuacAfaUfUfua agAfaCfcacugsusu	2235	đổi nghĩ a	23
AGUGGUUCUUA UUGUAAGC	1140	asgsugguUfcUfUfAf aaauguaagcL96	2236	có nghĩ a	21
GCUUACAAUUUA GAACCACUGU	1141	gsCfsuuaCfaAfUfuu aaGfaAfccacusgsu	2237	đổi nghĩ a	23
AAAACAGUGGUUC UUAAAUUG	1142	asasaacaGfuGfGfUf ucuuaaaauugL96	2238	có nghĩ a	21
CAAUUUAAGAACC ACUGUUUUUA	1143	csAfsauuUfaAfGfaa ccAfcUfguuuusasa	2239	đổi nghĩ a	23
UAAAACAGUGGUU CUUAAAUU	1144	usasaaacAfgUfGfGf uucuuaaaauuL96	2240	có nghĩ a	21

- 258 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
AAUUUAAGAACCA CUGUUUAAA	1145	asAfsuuuAfaGfAfac caCfuGfuuuuasasa	2241	đổi nghĩ a	23
ACCUGUAUUCUGU UUACAUGU	1146	ascscuguAfuUfCfUf guuuacauguL96	2242	có nghĩ a	21
ACAUGUAAACAGA AUACAGGUUA	1147	asCfsaugUfaAfAfca gaAfuAfcaggususa	2243	đổi nghĩ a	23
CCUGUAUUCUGUU UACAUGUC	1148	cscsuguaUfuCfUfGf uuuacaugucL96	2244	có nghĩ a	21
GACAUGUAAACAG AAUACAGGUU	1149	gsAfscauGfuAfAfac agAfaUfacaggsusu	2245	đổi nghĩ a	23
AUUAACCUGUAUU CUGUUUAC	1150	asusuaacCfuGfUfAf uucuguuuacL96	2246	có nghĩ a	21
GUAAACAGAAUAC AGGUUAAUAA	1151	gsUfsaaaCfaGfAfau acAfgGfuuaausasa	2247	đổi nghĩ a	23
UAUUAACCUGUAU UCUGUUUA	1152	usasuuaaCfcUfGfUf auucuguuuaL96	2248	có nghĩ a	21

- 259 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
UAAACAGAAUACA GGUUAUAUAAA	1153	usAfsaacAfgAfAfua caGfgUfuaauasasa	2249	đổi nghĩ a	23
AAGAAACUUUGGC UGAUAAUA	1154	asasgaaaCfuUfUfGf gcugauaauaL96	2250	có nghĩ a	21
UAUUAUCAGCCAA AGUUUCUUCA	1155	usAfsuuaUfcAfGfcc aaAfgUfuucuuscsa	2251	đổi nghĩ a	23
AGAAACUUUGGCU GAUAAUAU	1156	asgsaaacUfuUfGfGf cugauaauauL96	2252	có nghĩ a	21
AUAUUAUCAGCCA AAGUUUCUUC	1157	asUfsauuAfuCfAfgc caAfaGfuuucususc	2253	đổi nghĩ a	23
GAUGAAGAAACUU UGGCUGAU	1158	gsasugaaGfaAfAfCf uuuggcugauL96	2254	có nghĩ a	21
AUCAGCCAAAGUU UCUUCAUCAU	1159	asUfscagCfcAfAfag uuUfcUfucaucsasu	2255	đổi nghĩ a	23
UGAUGAAGAAACU UUGGCUGA	1160	usgsaugaAfgAfAfAf cuuuggcugaL96	2256	có nghĩ a	21

- 260 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
UCAGCCAAAGUUU CUUCAUCAUU	1161	usCfsagcCfaAfAfgu uuCfuUfcaucasusu	2257	đổi nghĩ a	23
GAAAGGUGUUCAA GAUGUCCU	1162	gsasaaggUfgUfUfCf aagauguccuL96	2258	có nghĩ a	21
AGGACAUCUUGAA CACCUUUCUC	1163	asGfsgacAfuCfUfug aaCfaCfcuuucsusc	2259	đổi nghĩ a	23
AAAGGUGUUCAAG AUGUCCUC	1164	asasagguGfuUfCfAf agauguccucL96	2260	có nghĩ a	21
GAGGACAUCUUGA ACACCUUUCU	1165	gsAfsggaCfaUfCfu gaAfcAfccuuuscsu	2261	đổi nghĩ a	23
GGGAGAAAGGUGU UCAAGAUG	1166	gsgsgagaAfaGfGfUf guucaagaugL96	2262	có nghĩ a	21
CAUCUUGAACACC UUUCUCCCCC	1167	csAfsucuUfgAfAfca ccUfuUfcuccscsc	2263	đổi nghĩ a	23
GGGGAGAAAGGUG UUCAAGAU	1168	gsgsggagAfaAfGfGf uguucaagauL96	2264	có nghĩ a	21

- 261 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
AUCUUGAACACCU UUCUCCCCCU	1169	asUfscuuGfaAfCfac cuUfuCfucscscsu	2265	đổi nghĩ a	23
AUCUUGGUGUCGA AUCAUGGG	1170	asuscuugGfuGfUfCf gaaucaugggL96	2266	có nghĩ a	21
CCCAUGAUUCGAC ACCAAGAUC	1171	csCfscauGfaUfUfcg acAfcCfaagauscsc	2267	đổi nghĩ a	23
UCUUGGUGUCGAA UCAUGGGG	1172	uscsuuggUfgUfCfGf aaaucauggggL96	2268	có nghĩ a	21
CCCCAUGAUUCGA CACCAAGAUC	1173	csCfsccaUfgAfUfuc gaCfaCfcaagasusc	2269	đổi nghĩ a	23
UGGGAUCUUGGUG UCGAAUCA	1174	usgsggauCfuUfGfGf ugucgaaucaL96	2270	có nghĩ a	21
UGAUUCGACACCA AGAUCCEAUU	1175	usGfsauuCfGfAfCfac caAfgAfucscasusu	2271	đổi nghĩ a	23
AUGGGAUCUUGGU GUCGAAUC	1176	asusgggaUfcUfUfGf gugucgaaucaL96	2272	có nghĩ a	21

- 262 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
GAUUCGACACCAA GAUCCCAUUC	1177	gsAfsuucGfaCfAfcc aaGfaUfcccoususc	2273	đổi nghĩ a	23
GCUACAAGGCCAU AUUUGUGA	1178	gscsuacaAfgGfCfCf auauuugugaL96	2274	có nghĩ a	21
UCACAAUAUGGC CUUGUAGCCC	1179	usCfsacaAfaUfAfug gcCfuUfguagcscsc	2275	đổi nghĩ a	23
CUACAAGGCCAUA UUUGUGAC	1180	csusacaaGfgCfCfAf uauuugugacL96	2276	có nghĩ a	21
GUCACAAUAUGG CCUUGUAGCC	1181	gsUfscacAfaAfUfau ggCfcUfuguagcscsc	2277	đổi nghĩ a	23
AUGGGCUACAAGG CCAUAUUU	1182	asusgggcUfaCfAfAf ggccauauuuL96	2278	có nghĩ a	21
AAUAUGGCCUUG UAGCCCAUCU	1183	asAfsauaUfgGfCfcu ugUfaGfcccouscsu	2279	đổi nghĩ a	23
GAUGGGCUACAAG GCCAUAUU	1184	gsasugggCfuAfCfAf aggccauauuL96	2280	có nghĩ a	21

- 263 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
AAUAUGGCCUUGU AGCCCAUCUU	1185	asAfsuauGfgCfCfu guAfgCfccaucsusu	2281	đổi nghĩ a	23
ACUGGAGAGAAUU GGAAUGGG	1186	ascsuggaGfaGfAfAf uuggaauggg ^{L96}	2282	có nghĩ a	21
CCCAUCCAAUUC UCUCCAGUGC	1187	csCfscauUfcCfAfau ucUfcUfccagusgsc	2283	đổi nghĩ a	23
CUGGAGAGAAUUG GAAUGGGU	1188	csusggagAfgAfAfUf uggaaugggu ^{L96}	2284	có nghĩ a	21
ACCAUUCCAAUU CUCUCCAGUG	1189	asCfsccaUfuCfCfaa uuCfuCfuccagsusg	2285	đổi nghĩ a	23
UAGCACUGGAGAG AAUUGGAA	1190	usasgcacUfgGfAfGf agaauuggaa ^{L96}	2286	có nghĩ a	21
UCCAAUUCUCUC CAGUGCUACC	1191	usUfsccaAfuUfCfuc ucCfaGfugcuascsc	2287	đổi nghĩ a	23
GUAGCACUGGAGA GAAUUGGA	1192	gsusagcaCfuGfGfAf gagaauugga ^{L96}	2288	có nghĩ a	21

- 264 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
UCCAAUUCUCUCC AGUGCUACCU	1193	usCfscaaUfuCfUfcu ccAfgUfgcuacscsu	2289	đổi nghĩ a	23
ACAGUGGACACAC CUUACCUG	1194	ascsgugGfaCfAfCf accuuaccugL96	2290	có nghĩ a	21
CAGGUAAGGUGUG UCCACUGUCA	1195	csAfsghuAfaGfGfug ugUfcCfacuguscsa	2291	đổi nghĩ a	23
CAGUGGACACACC UUACCUGG	1196	csasguggAfcAfCfAf ccuuaccuggL96	2292	có nghĩ a	21
CCAGGUAAGGUGU GUCCACUGUC	1197	csCfsaggUfaAfGfgu guGfuCfcacugsusc	2293	đổi nghĩ a	23
UGUGACAGUGGAC ACACCUUA	1198	usgsugacAfgUfGfGf acacaccuuaL96	2294	có nghĩ a	21
UAAGGUGUGUCCA CUGUCACAAA	1199	usAfsaggUfgUfGfuc caCfuGfucacasasa	2295	đổi nghĩ a	23
UUGUGACAGUGGA CACACCUU	1200	ususgugaCfaGfUfGf gacacaccuuL96	2296	có nghĩ a	21

- 265 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
AAGGUGUGUCCAC UGUCACAAAU	1201	asAfsgggUGfUGfUfcc acUfgUfcacaasasu	2297	đổi nghĩ a	23
GAAGACUGACAUC AUUGCCAA	1202	gsasagacUfgAfCfAf ucauugccaaL96	2298	có nghĩ a	21
UUGGCAAUGAUGU CAGUCUUCUC	1203	usUfsggcAfaUfGfau guCfaGfucuucsusc	2299	đổi nghĩ a	23
AAGACUGACAUCA UUGCCAAU	1204	asasgacuGfaCfAfUf cauugccaaL96	2300	có nghĩ a	21
AUUGGCAAUGAUG UCAGUCUUCU	1205	asUfsuggCfaAfUfga ugUfcAfgucuuscsu	2301	đổi nghĩ a	23
CUGAGAAGACUGA CAUCAUUG	1206	csusgagaAfgAfCfUf gacaucauugL96	2302	có nghĩ a	21
CAAUGAUGUCAGU CUUCUCAGCC	1207	csAfsaugAfuGfUfca guCfuUfcucagscsc	2303	đổi nghĩ a	23
GCUGAGAAGACUG ACAUCAUU	1208	gscsugagAfaGfAfCf ugacaucauuL96	2304	có nghĩ a	21

- 266 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
AAUGAUGUCAGUC UUCUCAGCCA	1209	asAfsugaUfgUfCfag ucUfuCfucagcscsa	2305	đổi nghĩ a	23
GCUCAGGUUCAA GUGUUGGU	1210	gscsucagGfuUfCfAf aaguguugguL96	2306	có nghĩ a	21
ACCAACACUUUGA ACCUGAGCUU	1211	asCfscaaCfaCfUfuu gaAfcCfugagcsusu	2307	đổi nghĩ a	23
CUCAGGUUCAAAG UGUUGGUA	1212	csuscaggUfuCfAfAf aguguugguaL96	2308	có nghĩ a	21
UACCAACACUUUG AACCUGAGCU	1213	usAfsccaAfcAfCfuu ugAfaCfcugagscsu	2309	đổi nghĩ a	23
GUAAGCUCAGGUU CAAAGUGU	1214	gsusaagcUfcAfGfGf uucaaaguguL96	2310	có nghĩ a	21
ACACUUUGAACCU GAGCUUACAA	1215	asCfsacuUfuGfAfac cuGfaGfcuuacsasa	2311	đổi nghĩ a	23
UGUAAGCUCAGGU UCAAGUG	1216	usgsuaagCfuCfAfGf guucaaagugL96	2312	có nghĩ a	21

- 267 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
CACUUUGAACCG AGCUUACAAU	1217	csAfscuuUfgAfAfcc ugAfgCfuuacasasu	2313	đổi nghĩ a	23
AUGUAUUACUUGA CAAAGAGA	1218	asusguauUfaCfUfUf gacaaagagaL96	2314	có nghĩ a	21
UCUCUUUGUCAAG UAAUACAUGC	1219	usCfsucuUfuGfUfca agUfaAfuacausgsc	2315	đổi nghĩ a	23
UGUAUUACUUGAC AAAGAGAC	1220	usgsuauuAfcUfUfGf acaaagagacL96	2316	có nghĩ a	21
GUCUCUUUGUCAA GUAUACAUG	1221	gsUfscucUfuUfGfuc aaGfuAfauacasusg	2317	đổi nghĩ a	23
CAGCAUGUAUUAC UUGACAAA	1222	csasgc auGfuAfUfUf acuugacaaaL96	2318	có nghĩ a	21
UUUGUCAAGUAAU ACAUGCUGAA	1223	usUfsuguCfaAfGfua auAfcAfugcugsasa	2319	đổi nghĩ a	23
UCAGCAUGUAUUA CUUGACAA	1224	uscsagcaUfgUfAfUf uacuugacaaL96	2320	có nghĩ a	21

- 268 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
UUGUCAAGUAAUA CAUGCUGAAA	1225	usUfsgucAfaGfUfaa uaCfaUfgcugasasa	2321	đổi nghĩ a	23
CUGCAACUGUAUA UCUACAAG	1226	csusgcaaCfuGfUfAf uaucaacaagL96	2322	có nghĩ a	21
CUUGUAGAUAUAC AGUUGCAGCC	1227	csUfsuguAfgAfUfau acAfgUfugcagscsc	2323	đổi nghĩ a	23
UGCAACUGUAUAU CUACAAGG	1228	usgscaacUfgUfAfUf aucuacaaggL96	2324	có nghĩ a	21
CCUUGUAGAUUA CAGUUGCAGC	1229	csCfsuugUfaGfAfua uaCfaGfuugcasgsc	2325	đổi nghĩ a	23
UUGGCUGCAACUG UAUAUCUA	1230	ususggcuGfcAfAfCf uguauaucuaL96	2326	có nghĩ a	21
UAGAUAUACAGUU GCAGCCAACG	1231	usAfsgauAfuAfCfag uuGfcAfgccaascsg	2327	đổi nghĩ a	23
GUUGGCUGCAACU GUAUAUCU	1232	gsusuggcUfgCfAfAf cuguauaucuL96	2328	có nghĩ a	21

- 269 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
AGAUAUACAGUUG CAGCCAACGA	1233	asGfsauaUfaCfAfgu ugCfaGfccaacsgsa	2329	đổi nghĩ a	23
CAAAGAUGAAGA AACUUUGG	1234	csasaaugAfuGfAfAf gaaacuuuggL96	2330	có nghĩ a	21
CCAAAGUUUCUUC AUCAUUUGCC	1235	csCfsaaaGfuUfUfcu ucAfuCfauuugscsc	2331	đổi nghĩ a	23
AAAUGAUGAAGAA ACUUUGGC	1236	asasaugaUfgAfAfGf aaacuuuggcL96	2332	có nghĩ a	21
GCCAAAGUUUCUU CAUCAUUUGC	1237	gsCfscaaAfgUfUfuc uuCfaUfcuuusgsc	2333	đổi nghĩ a	23
GGGGCAAUGAUG AAGAAACU	1238	gsgsggcaAfaUfGfAf ugaagaaacuL96	2334	có nghĩ a	21
AGUUUCUUCAUCA UUUGCCCCAG	1239	asGfsuuuCfuUfCfau caUfuUfgccccsasg	2335	đổi nghĩ a	23
UGGGGCAAUGAU GAAGAAAC	1240	usgsgggcAfaAfUfGf augaagaaacL96	2336	có nghĩ a	21

- 270 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
GUUUCUUCAUCAU UUGCCCCAGA	1241	gsUfsuucUfuCfAfuc auUfuGfccccasgsa	2337	đổi nghĩ a	23
CAAAGGGUGUCGU UCUUUUC	1242	csasaaggGfuGfUfCf guucuuuuccL96	2338	có nghĩ a	21
GGAAAAGAACGAC ACCCUUUGUA	1243	gsGfsaaaAfgAfAfcg acAfcCfcuuugsusa	2339	đổi nghĩ a	23
AAAGGGUGUCGUU CUUUUCCA	1244	asasagggUfgUfCfGf uucuuuuccaL96	2340	có nghĩ a	21
UGGAAAAGAACGA CACCCUUUGU	1245	usGfsgaaAfaGfAfac gaCfaCfccuuusgsu	2341	đổi nghĩ a	23
AAUACAAAGGGUG UCGUUCUU	1246	asasuacaAfaGfGfGf ugucguucuuL96	2342	có nghĩ a	21
AAGAACGACACCC UUUGUAUUGA	1247	asAfsgaaCfgAfCfac ccUfuUfguauusgsa	2343	đổi nghĩ a	23
CAAUACAAAGGGU GUCGUUCU	1248	csasauacAfaAfGfGf gugucguucuuL96	2344	có nghĩ a	21

- 271 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
AGAACGACACCCU UUGUAUUGAA	1249	asGfsaacGfaCfAfcc cuUfuGfuauugsasa	2345	đổi nghĩ a	23
AAAGGCACUGAUG UUCUGAAA	1250	asasaggcAfcUfGfAf uguucugaaaL96	2346	có nghĩ a	21
UUUCAGAACAUCA GUGCCUUUCC	1251	usUfsucaGfaAfCfau caGfuGfccuuuscsc	2347	đổi nghĩ a	23
AAGGCACUGAUGU UCUGAAAG	1252	asasggcaCfuGfAfUf guucugaaagL96	2348	có nghĩ a	21
CUUUCAGAACAUC AGUGCCUUUC	1253	csUfsuucAfgAfAfca ucAfgUfgccuususc	2349	đổi nghĩ a	23
GCGGAAAGGCACU GAUGUUCU	1254	gscsggaaAfgGfCfAf cugauguucuL96	2350	có nghĩ a	21
AGAACAUCAGUGC CUUUCCGCAC	1255	asGfsaacAfuCfAfgu gcCfuUfuccgcsasc	2351	đổi nghĩ a	23
UGCGGAAAGGCAC UGAUGUUC	1256	usgscggaAfaGfGfCf acugauguucL96	2352	có nghĩ a	21

- 272 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
GAACAUCAGUGCC UUUCCGCACA	1257	gsAfsacaUfcAfGfug ccUfuUfccgcascsa	2353	đổi nghĩ a	23
AAGGAUGCUCGG AAUGUUGC	1258	asasggauGfcUfCfCf ggaauguugcL96	2354	có nghĩ a	21
GCAACAUUCCGGA GCAUCCUUGG	1259	gsCfsaacAfuUfCfcg gaGfcAfuccuusgsg	2355	đổi nghĩ a	23
AGGAUGCUCGGGA AUGUUGCU	1260	asgsgaugCfuCfCfGf gaauguugcuL96	2356	có nghĩ a	21
AGCAACAUUCCGG AGCAUCCUUG	1261	asGfscaaCfaUfUfcc ggAfgCfauccususg	2357	đổi nghĩ a	23
AUCCAAGGAUGCU CCGGAAUG	1262	asusccaaGfgAfUfGf cuccggaaugL96	2358	có nghĩ a	21
CAUUCCGGAGCAU CCUUGGAUAC	1263	csAfsuucCfgGfAfgc auCfcUfuggausasc	2359	đổi nghĩ a	23
UAUCCAAGGAUGC UCCGGAAU	1264	usasuccaAfgGfAfUf gcuccggaauL96	2360	có nghĩ a	21

- 273 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
AUCCGGAGCAUC CUUGGAUACA	1265	asUfsuccGfgAfGfca ucCfuUfggauascsa	2361	đổi nghĩ a	23
AAUGGGUGGCGGU AAUUGGUG	1266	asasugggUfgGfCfGf guaauuggugL96	2362	có nghĩ a	21
CACCAAUUACCGC CACCCAUUCC	1267	csAfsccaAfuUfAfcc gcCfaCfccauuscsc	2363	đổi nghĩ a	23
AUGGGUGGCGGUA AUUGGUGA	1268	asusggguGfgCfGfGf uaauugggugaL96	2364	có nghĩ a	21
UCACCAAUUACCG CCACCCAUUC	1269	usCfsaccAfaUfUfac cgCfcAfcccaususc	2365	đổi nghĩ a	23
UUGGAAUGGGUGG CGGUAAUU	1270	ususggaaUfgGfGfUf ggcgguaaauL96	2366	có nghĩ a	21
AAUUACCGCCACC CAUUCCAAUU	1271	asAfsuuaCfcGfCfca ccCfaUfuccaasusu	2367	đổi nghĩ a	23
AUUGGAAUGGGUG GCGGUAAU	1272	asusuggaAfuGfGfGf uggcgguaaauL96	2368	có nghĩ a	21

- 274 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
AUUACCGCCACCC AUUCCAAUUC	1273	asUfsuacCfgCfCfac ccAfuUfccaaususc	2369	đổi nghĩ a	23
GGAAAGGCACUGA UGUUCUGA	1274	gsgsaaagGfcAfCfUf gauguucugaL96	2370	có nghĩ a	21
UCAGAACAUCAGU GCCUUUCCGC	1275	usCfsagaAfcAfUfca guGfcCfuuuccsgsc	2371	đổi nghĩ a	23
GAAAGGCACUGAU GUUCUGAA	1276	gsasaaggCfaCfUfGf auguucugaaL96	2372	có nghĩ a	21
UUCAGAACAUCAG UGCCUUUCCG	1277	usUfscagAfaCfAfuc agUfgCfcuuucscsg	2373	đổi nghĩ a	23
GUGCGGAAAGGCA CUGAUGUU	1278	gsusgcfgAfaAfGfGf cacugauguuL96	2374	có nghĩ a	21
AACAUCAGUGCCU UUCCGCACAC	1279	asAfscauCfaGfUfgc cuUfuCfcgcacsasc	2375	đổi nghĩ a	23
UGUGCGGAAAGGC ACUGAUGU	1280	usgsugcgGfaAfAfGf gcacugauguL96	2376	có nghĩ a	21

- 275 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
ACAUCAGUGCCUU UCCGCACACC	1281	asCfsaucAfgUfGfcc uuUfcCfgcacascsc	2377	đổi nghĩ a	23
AAUUGUAAGCUCA GGUUCAAA	1282	asasuuguAfaGfCfUf cagguucaaaaL96	2378	có nghĩ a	21
UUUGAACCUGAGC UUACAAUUUA	1283	usUfsugaAfcCfUfga gcUfuAfcaauususa	2379	đổi nghĩ a	23
AUUGUAAGCUCAG GUUCAAG	1284	asusuguaAfgCfUfCf agguucaaaagL96	2380	có nghĩ a	21
CUUUGAACCUGAG CUUACAAUUU	1285	csUfsuugAfaCfCfug agCfuUfacausususu	2381	đổi nghĩ a	23
CUUAAAUUGUAAG CUCAGGUU	1286	csusuaaaaUfuGfUfAf agcucagguuL96	2382	có nghĩ a	21
AACCUGAGCUUAC AAUUUAAGAA	1287	asAfscCuGfaGfCfu acAfaUfuuaagsasa	2383	đổi nghĩ a	23
UCUUAAAUUGUAA GCUCAGGU	1288	uscsuuaaAfuUfGfUf aagcucagguL96	2384	có nghĩ a	21

- 276 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
ACCUGAGCUUACA AUUUAAGAAC	1289	asCfscugAfgCfUfua caAfuUfuaagasasc	2385	đổi nghĩ a	23
GCAAACACUAAGG UGAAAAGA	1290	gscsaaacAfcUfAfAf ggugaaaagaL96	2386	có nghĩ a	21
UCUUUUCACCUUA GUGUUUGCUA	1291	usCfsuuuUfcAfCfcu uaGfuGfuuugcsusa	2387	đổi nghĩ a	23
CAAACACUAAGGU GAAAAGAU	1292	csasaacaCfuAfAfGf gugaaaagauL96	2388	có nghĩ a	21
AUCUUUUCACCUU AGUGUUUGCU	1293	asUfscuuUfuCfAfcc uuAfgUfguuugscsu	2389	đổi nghĩ a	23
GGUAGCAAACACU AAGGUGAA	1294	gsgsuagcAfaAfCfAf cuaaggugaaL96	2390	có nghĩ a	21
UUCACCUUAGUGU UUGCUACCUC	1295	usUfscacCfuUfAfgu guUfuGfcuaccsusc	2391	đổi nghĩ a	23
AGGUAGCAAACAC UAAGGUGA	1296	asgsguagCfaAfAfCf acuaaggugaL96	2392	có nghĩ a	21

- 277 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
UCACCUUAGUGUU UGCUACCUCC	1297	usCfsaccUfuAfGfug uuUfgCfuaccuscsc	2393	đổi nghĩ a	23
AGGUAGCAAACAC UAAGGUGA	1298	asgsguagCfaAfAfCf acuaaggugaL96	2394	có nghĩ a	21
UCACCUUAGUGUU UGCUACCUCC	1299	usCfsaccUfuAfGfug uuUfgCfuaccuscsc	2395	đổi nghĩ a	23
GGUAGCAAACACU AAGGUGAA	1300	gsgsuagcAfaAfCfAf cuaaggugaaL96	2396	có nghĩ a	21
UUCACCUUAGUGU UUGCUACCUC	1301	usUfscacCfuUfAfgu guUfuGfcuaccsusc	2397	đổi nghĩ a	23
UUGGAGGUAGCAA ACACUAAG	1302	ususggagGfuAfGfCf aaacacuaagL96	2398	có nghĩ a	21
CUUAGUGUUUGCU ACCUCCAAUU	1303	csUfsuagUfgUfUfug cuAfcCfuccaasusu	2399	đổi nghĩ a	23
AUUGGAGGUAGCA AACACUAA	1304	asusuggaGfgUfAfGf caaacacuaaL96	2400	có nghĩ a	21

- 278 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
UUAGUGUUUGCUA CCUCCAAUUU	1305	usUfsaguGfuUfUfgc uaCfcUfccaaususu	2401	đổi nghĩ a	23
UAAAGUGCUGUAU CCUUUAGU	1306	usasaaguGfcUfGfUf auccuuuaguL96	2402	có nghĩ a	21
ACUAAAGGAUACA GCACUUUAGC	1307	asCfsuaaAfgGfAfua caGfcAfcuuuasgsc	2403	đổi nghĩ a	23
AAAGUGCUGUAUC CUUUAGUA	1308	asasagugCfuGfUfAf uccuuuaguaL96	2404	có nghĩ a	21
UACUAAAGGAUAC AGCACUUUAG	1309	usAfscuaAfaGfGfau acAfgCfacuuusag	2405	đổi nghĩ a	23
AGGCUAAAGUGCU GUAUCCUU	1310	asgsgcuaAfaGfUfGf cuguauccuuL96	2406	có nghĩ a	21
AAGGAUACAGCAC UUUAGCCUGC	1311	asAfsggaUfaCfAfgc acUfuUfagccusgsc	2407	đổi nghĩ a	23
CAGGCUAAAGUGC UGUAUCCU	1312	csasggcuAfaAfGfUf gcuguauccuL96	2408	có nghĩ a	21

- 279 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
AGGAUACAGCACU UUAGCCUGCC	1313	asGfsgauAfcAfGfca cuUfuAfgccugscsc	2409	đổi nghĩ a	23
AAGACAUUGGUGA GGAAAAAU	1314	asasgacaUfuGfGfUf gaggaaaaauL96	2410	có nghĩ a	21
AUUUUUCCUCACC AAUGUCUUGU	1315	asUfsuuuUfcCfUfca ccAfaUfgucuusgsu	2411	đổi nghĩ a	23
AGACAUUGGUGAG GAAAAAUC	1316	asgsacauUfgGfUfGf aggaaaaaucL96	2412	có nghĩ a	21
GAUUUUUCCUCAC CAAUGUCUUG	1317	gsAfsuuuUfuCfCfuc acCfaAfugucususg	2413	đổi nghĩ a	23
CGACAAGACAUUG GUGAGGAA	1318	csgsacaaGfaCfAfUf uggugaggaaL96	2414	có nghĩ a	21
UUCCUCACCAAUG UCUUGUCGAU	1319	usUfscCuCfaCfCfaa ugUfcUfugucgsasu	2415	đổi nghĩ a	23
UCGACAAGACAUU GGUGAGGA	1320	uscsgacaAfgAfCfAf uuggugaggaL96	2416	có nghĩ a	21

- 280 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
UCCUCACCAAUGU CUUGUCGAUG	1321	usCfscucAfcCfAfau guCfuUfgucgasusg	2417	đổi nghĩ a	23
AAGAUGUCCUCGA GAUACUAA	1322	asasgaugUfcCfUfCf gagauacuaaL96	2418	có nghĩ a	21
UUAGUAUCUCGAG GACAUCUUGA	1323	usUfsaguAfuCfUfcg agGfaCfaucusgsa	2419	đổi nghĩ a	23
AGAUGUCCUCGAG AUACUAAA	1324	asgsauguCfcUfCfGf agauacuaaaL96	2420	có nghĩ a	21
UUUAGUAUCUCGA GGACAUCUUG	1325	usUfsuagUfaUfCfuc gaGfgAfcaucususg	2421	đổi nghĩ a	23
GUUCAAGAUGUCC UCGAGAU	1326	gsusucaaGfaUfGfUf ccucgagauaL96	2422	có nghĩ a	21
UAUCUCGAGGACA UCUUGAACAC	1327	usAfsucuCfGfGfga caUfcUfugaacsasc	2423	đổi nghĩ a	23
UGUUCAAGAUGUC CUCGAGAU	1328	usgsuucaAfgAfUfGf uccucgagauL96	2424	có nghĩ a	21

- 281 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
AUCUCGAGGACAU CUUGAACACC	1329	asUfscucGfaGfGfac auCfuUfgaacascsc	2425	đổi nghĩ a	23
GAGAAAGGUGUUC AAGAUGUC	1330	gsasgaaaGfgUfGfUf ucaagaugucL96	2426	có nghĩ a	21
GACAUCUUGAACA CCUUUCUCCC	1331	gsAfscauCfuUfGfaa caCfcUfuucuscsc	2427	đổi nghĩ a	23
AGAAAGGUGUUCA AGAUGUCC	1332	asgsaaagGfuGfUfUf caagauguccL96	2428	có nghĩ a	21
GGACAUCUUGAAC ACCUUUCUCC	1333	gsGfsacaUfcUfUfga acAfcCfuucuscsc	2429	đổi nghĩ a	23
GGGGGAGAAAGGU GUUCAAGA	1334	gsgsgggaGfaAfAfGf guguucaagaL96	2430	có nghĩ a	21
UCUUGAACACCUU UCUCCCCCUG	1335	usCfsuugAfaCfAfcc uuUfcUfcccccsusg	2431	đổi nghĩ a	23
AGGGGGAGAAAGG UGUUCAAG	1336	asgsggggAfgAfAfAf gguguucaagL96	2432	có nghĩ a	21

- 282 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
CUUGAACACCUUU CUCCCCUGG	1337	csUfsugaAfcAfCfcu uuCfuCfccccusgsg	2433	đổi nghĩ a	23
GCUGGGAAGAUAU CAAAUGGC	1338	gscsugggAfaGfAfUf aucaaauggcL96	2434	có nghĩ a	21
GCCAUUUGAUUAUC UUCCCAGCUG	1339	gsCfscauUfuGfAfua ucUfuCfccagcsusg	2435	đổi nghĩ a	23
CUGGGAAGAUUAUC AAAUGGCU	1340	csusgggaAfgAfUfAf ucaaauggcL96	2436	có nghĩ a	21
AGCCAUUUGAUAU CUUCCCAGCU	1341	asGfsccaUfuUfGfau auCfuUfcccagscsu	2437	đổi nghĩ a	23
AUCAGCUGGGAAG AUAUCAA	1342	asuscagcUfgGfGfAf agauaucaaaL96	2438	có nghĩ a	21
UUUGAUUAUCUCC CAGCUGAUAG	1343	usUfsugaUfaUfCfu ccCfaGfcugausasg	2439	đổi nghĩ a	23
UAUCAGCUGGGAA GAUAUCAA	1344	usasucagCfuGfGfGf aagauaucaaL96	2440	có nghĩ a	21

- 283 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
UUGAUAUCUUCCC AGCUGAUAGA	1345	usUfsgauAfuCfUfuc ccAfgCfugauasgsa	2441	đổi nghĩ a	23
UCUGUCGACUUCU GUUUUAGG	1346	uscsugucGfaCfUfUf cuguuuuaggL96	2442	có nghĩ a	21
CCUAAAACAGAAG UCGACAGAUC	1347	csCfsuaaAfaCfAfga agUfcGfacagasusc	2443	đổi nghĩ a	23
CUGUCGACUUCUG UUUUAGGA	1348	csusgucgAfcUfUfCf uguuuuaggaL96	2444	có nghĩ a	21
UCCUAAAACAGAA GUCGACAGAU	1349	usCfscuaAfaAfCfag aaGfuCfagacagsasu	2445	đổi nghĩ a	23
CAGAUCUGUCGAC UUCUGUUU	1350	csasgaucUfgUfCfGf acuucuguuuL96	2446	có nghĩ a	21
AAACAGAAGUCGA CAGAUCUGUU	1351	asAfsacaGfaAfGfuc gaCfaGfaucugsusu	2447	đổi nghĩ a	23
ACAGAUCUGUCGA CUUCUGUU	1352	ascsagauCfuGfUfCf gacuucuguuL96	2448	có nghĩ a	21

- 284 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:		Chiề u dài
AACAGAAGUCGAC AGAUCUGUUU	1353	asAfscagAfaGfUfcg acAfgAfucugususu	2449	đổi nghĩ a	23
UACUUCUUUGAAU GUAGAUUU	1354	usascuucUfuUfGfAf auguagauuuL96	2450	có nghĩ a	21
AAAUCUACAUUCA AAGAAGUAUC	1355	asAfsaucUfaCfAfuu caAfaGfaaguasusc	2451	đổi nghĩ a	23
ACUUCUUUGAAUG UAGAUUUC	1356	ascsuucuUfuGfAfAf uguagauuucL96	2452	có nghĩ a	21
GAAAUCAUAUUC AAAGAAGUAU	1357	gsAfsaauCfuAfCfau ucAfaAfgaagusasu	2453	đổi nghĩ a	23
GUGAUACUUCUUU GAAUGUAG	1358	gsusgauaCfuUfCfUf uugaauguagL96	2454	có nghĩ a	21
CUACAUUCAAGA AGUAUCACCA	1359	csUfsacaUfuCfAfaa gaAfgUfaucacscsa	2455	đổi nghĩ a	23
GGUGAUACUUCUU UGAAUGUA	1360	gsgsugauAfcUfUfCf uuugaauguaL96	2456	có nghĩ a	21

- 285 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
UACAUUCAAGAA GUAUCACCAA	1361	usAfscauUfcAfAfag aaGfuAfucaccsasa	2457	đổi nghĩ a	23
UGGGAAGAUAUCA AAUGGCUG	1362	usgsggaaGfaUfAfUf caaauggcugL96	2458	có nghĩ a	21
CAGCCAUUUGAUA UCUUCCCAGC	1363	csAfsgccAfuUfUfga uaUfcUfucccasgsc	2459	đổi nghĩ a	23
GGGAAGAUAUCAA AUGGCUGA	1364	gsgsgaagAfuAfUfCf aaauggcugaL96	2460	có nghĩ a	21
UCAGCCAUUUGAU AUCUUCCCAG	1365	usCfsagcCfaUfUfug auAfuCfuucccsasg	2461	đổi nghĩ a	23
CAGCUGGGAAGAU AUCAA AUG	1366	csasgcugGfgAfAfGf auaucaaaugL96	2462	có nghĩ a	21
CAUUUGAUAUUCUU CCCAGCUGAU	1367	csAfsuuuGfaUfAfuc uuCfcCfagcugsasu	2463	đổi nghĩ a	23
UCAGCUGGGAAGA UAUCAA AU	1368	uscsagcuGfgGfAfAf gauaucaaaauL96	2464	có nghĩ a	21

- 286 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:		Chiề u dài
AUUUGAUAUCUUC CCAGCUGAUA	1369	asUfsuugAfuAfUfcu ucCfcAfgcugasusa	2465	đổi nghĩ a	23
UCCAAAGUCUAUA UAUGACUA	1370	uscscaaaGfuCfUfAf uaaugacuaL96	2466	có nghĩ a	21
UAGUCAUAUAUAG ACUUUGGAAG	1371	usAfsugcAfuAfUfau agAfcUfuuggasasg	2467	đổi nghĩ a	23
CCAAAGUCUAUAU AUGACUAU	1372	cscsaaagUfcUfAfUf aauaugacuauL96	2468	có nghĩ a	21
AUAGUCAUAUAUA GACUUUGGAA	1373	asUfsaguCfaUfAfua uaGfaCfuugggsasa	2469	đổi nghĩ a	23
UACUUCCAAAGUC UAUAUAUG	1374	usascuucCfaAfAfGf ucuauauaugL96	2470	có nghĩ a	21
CAUAUAUAGACUU UGGAAGUACU	1375	csAfsuauAfuAfGfac uuUfgGfaaguascsu	2471	đổi nghĩ a	23
GUACUUCCAAAGU CUAUAUAU	1376	gsusacuuCfcAfAfAf gucuauauauL96	2472	có nghĩ a	21

- 287 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
AUAUAUAGACUUU GGAAGUACUG	1377	asUfsauaUfaGfAfcu uuGfgAfaguacsusg	2473	đổi nghĩ a	23
UUAUGAACACAUC GCUAAAUC	1378	ususaugaAfcAfAfCf augcuaaaucL96	2474	có nghĩ a	21
GAUUUAGCAUGUU GUUCAUAAUC	1379	gsAfsuuuAfgCfAfug uuGfuUfcauaasusc	2475	đổi nghĩ a	23
UAUGAACACAUC CUAAAUCA	1380	usasugaaCfaAfCfAf ugcuaaaucaL96	2476	có nghĩ a	21
UGAUUUAGCAUGU UGUUCAUAAU	1381	usGfsauuUfaGfCfau guUfgUfcauasasu	2477	đổi nghĩ a	23
AUGAUUAUGAACA ACAUGCUA	1382	asusgauuAfuGfAfAf caacaugcuL96	2478	có nghĩ a	21
UAGCAUGUUGUUC AUAAUCAUUG	1383	usAfsagcaUfgUfUfgu ucAfuAfaucausug	2479	đổi nghĩ a	23
AAUGAUUAUGAAC ACAUGCUC	1384	asasugauUfaUfGfAf acaacaugcuL96	2480	có nghĩ a	21

- 288 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
AGCAUGUUGUUCA UAAUCAUUGA	1385	asGfscauGfuUfGfuu caUfaAfucauusgsa	2481	đổi nghĩ a	23
AAUUCCCCACUUC AAUACAAA	1386	asasuuccCfcAfCfUf ucaauacaaaL96	2482	có nghĩ a	21
UUUGUAUUGAAGU GGGGAAUUA	1387	usUfsuguAfuUfGfaa guGfgGfgaauusasc	2483	đổi nghĩ a	23
AUUCCCCACUUCA AUACAAAG	1388	asusucccCfaCfUfUf caauacaaagL96	2484	có nghĩ a	21
CUUUGUAUUGAAG UGGGGAAUUA	1389	csUfsuugUfaUfUfga agUfgGfggaaususa	2485	đổi nghĩ a	23
CUGUAAUUCCCCA CUUCAUA	1390	csusguaaUfuCfCfCf cacuucaaual96	2486	có nghĩ a	21
UAUUGAAGUGGGG AAUUACAGAC	1391	usAfsuugAfaGfUfgg ggAfaUfuacagsasc	2487	đổi nghĩ a	23
UCUGUAAUUCCCC ACUUCAAU	1392	uscsuguaAfuUfCfCf ccacuucaaual96	2488	có nghĩ a	21

- 289 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
AUUGAAGUGGGGA AUUACAGACU	1393	asUfsugaAfgUfGfgg gaAfuUfacagascsu	2489	đổi nghĩ a	23
UGAUGUGCGUAAC AGAUUCAA	1394	usgsauguGfcGfUfAf acagauucaaL96	2490	có nghĩ a	21
UUGAAUCUGUUAC GCACAUCAUC	1395	usUfsgaaUfcUfGfuu acGfcAfcaucasusc	2491	đổi nghĩ a	23
GAUGUGCGUAACA GAUUCAAA	1396	gsasugugCfgUfAfAf cagauucaaaaL96	2492	có nghĩ a	21
UUUGAAUCUGUUA CGCACAUCAU	1397	usUfsugaAfuCfUfgu uaCfgCfacaucsasu	2493	đổi nghĩ a	23
UGGAUGAUGUGCG UAACAGAU	1398	usgsgaugAfuGfUfGf cguaacagauL96	2494	có nghĩ a	21
AUCUGUUACGCAC AUCAUCCAGA	1399	asUfscugUfuAfCfgc acAfuCfauccasgsa	2495	đổi nghĩ a	23
CUGGAUGAUGUGC GUAACAGA	1400	csusggauGfaUfGfUf gcguaacagaL96	2496	có nghĩ a	21

- 290 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
UCUGUUACGCACA UCAUCCAGAC	1401	usCfsuguUfaCfGfca caUfcAfuccagsasc	2497	đổi nghĩ a	23
GAAUGGGUGGCGG UAAUUGGU	1402	gsasauggGfuGfGfCf gguaauugguL96	2498	có nghĩ a	21
ACCAAUUACCGCC ACCCAUUCCA	1403	asCfscaaUfuAfCfcg ccAfcCfcuucscsa	2499	đổi nghĩ a	23
AAUGGGUGGCGGU AAUUGGUG	1404	asasugggUfgGfCfGf guaauuggugL96	2500	có nghĩ a	21
CACCAAUUACCGC CACCCAUUCC	1405	csAfsccaAfuUfAfcc gcCfaCfccauuscsc	2501	đổi nghĩ a	23
AUUGGAAUGGGUG GCGGUAAU	1406	asusuggaAfuGfGfGf uggcgguaauL96	2502	có nghĩ a	21
AUUACCGCCACCC AUUCCAAUUC	1407	asUfsuacCfGfCfCfac ccAfuUfccaaususc	2503	đổi nghĩ a	23
AAUUGGAAUGGGU GGCGGUAA	1408	asasuuggAfaUfGfGf guggcgguaaL96	2504	có nghĩ a	21

- 291 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
UUACCGCCACCCA UUCCAAUUCU	1409	usUfsaccGfcCfAfcc caUfuCfcaauuscsu	2505	đổi nghĩ a	23
UCCGGAAUGUUGC UGAAACAG	1410	uscscggaAfuGfUfUf gcugaaacagL96	2506	có nghĩ a	21
CUGUUUCAGCAAC AUUCCGGAGC	1411	csUfsguuUfcAfGfca acAfuUfccggasgsc	2507	đổi nghĩ a	23
CCGGAAUGUUGCU GAAACAGA	1412	cscsggaaUfgUfUfGf cugaaacagaL96	2508	có nghĩ a	21
UCUGUUUCAGCAA CAUCCGGAG	1413	usCfsuguUfuCfAfgc aaCfaUfuccggsasg	2509	đổi nghĩ a	23
AUGCUCCGGAAUG UUGCUGAA	1414	asusgcucCfgGfAfAf uguugcugaaL96	2510	có nghĩ a	21
UUCAGCAACAUUC CGGAGCAUCC	1415	usUfscagCfaAfCfau ucCfgGfagcauscsc	2511	đổi nghĩ a	23
GAUGCUCCGGAAU GUUGCUGA	1416	gsasugcuCfcGfGfAf auguugcugaL96	2512	có nghĩ a	21

- 292 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
UCAGCAACAUUCC GGAGCAUCCU	1417	usCfsagcAfaCfAfuu ccGfgAfgcaucscsu	2513	đổi nghĩ a	23
UGUCCUCGAGAU CUAAAGGA	1418	usgsuccuCfgAfGfAf uacuaaaggaL96	2514	có nghĩ a	21
UCCUUUAGUAUCU CGAGGACAUC	1419	usCfscuuUfaGfUfau cuCfgAfggacasusc	2515	đổi nghĩ a	23
GUCCUCGAGAUAC UAAAGGAA	1420	gsusccucGfaGfAfUf acuaaaggaaL96	2516	có nghĩ a	21
UCCUUUAGUAUC UCGAGGACAU	1421	usUfscuuUfuAfGfua ucUfcGfaggacsasu	2517	đổi nghĩ a	23
AAGAUGUCCUCGA GAUACUAA	1422	asasgaugUfcCfUfCf gagauacuaaL96	2518	có nghĩ a	21
UUAGUAUCUCGAG GACAUCUUGA	1423	usUfsaguAfuCfUfcg agGfaCfaucuusgsa	2519	đổi nghĩ a	23
CAAGAUGUCCUCG AGAUACUA	1424	csasagauGfuCfCfUf cgagauacuaL96	2520	có nghĩ a	21

- 293 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:		Chiề u dài
UAGUAUCUCGAGG ACAUCUUGAA	1425	usAfsguaUfcUfCfga ggAfcAfucuugsasa	2521	đổi nghĩ a	23
ACAACAUGCUGAAA UCAGUACU	1426	ascsaacaUfgCfUfAf aaucaguacuL96	2522	có nghĩ a	21
AGUACUGAUUUAG CAUGUUGUUC	1427	asGfsuacUfgAfUfuu agCfaUfguugususc	2523	đổi nghĩ a	23
CAACAUGCUGAAAU CAGUACUU	1428	csasacauGfcUfAfAf aucaguacuuL96	2524	có nghĩ a	21
AAGUACUGAUUUA GCAUGUUGUU	1429	asAfsguaCfuGfAfu uaGfcAfuguugsusu	2525	đổi nghĩ a	23
AUGAACAACAUGC UAAAUCAG	1430	asusgaacAfaCfAfUf gcuaaaucagL96	2526	có nghĩ a	21
CUGAUUUAGCAUG UUGUUCAUAA	1431	csUfsgauUfuAfGfca ugUfuGfuucausasa	2527	đổi nghĩ a	23
UAUGAACAACAUG CUAAAUCA	1432	usasugaaCfaAfCfAf ugcuaaaaucaL96	2528	có nghĩ a	21

- 294 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
UGAUUUAGCAUGU UGUUCAUAAU	1433	usGfsauuUfaGfCfau guUfgUfucauasasu	2529	đổi nghĩ a	23
GCCAAGGCUGUGU UUGUGGGG	1434	gscscaagGfcUfGfUf guuuguggggG96	2530	có nghĩ a	21
CCCCACAAACACA GCCUUGGCGC	1435	csCfscCaCfaAfAfca caGfcCfuuggcsgsc	2531	đổi nghĩ a	23
CCAAGGCUGUGUU UGUGGGGA	1436	cscsaaggCfuGfUfGf uuuguggggaG96	2532	có nghĩ a	21
UCCCCACAAACAC AGCCUUGGCG	1437	usCfscCaAfcAfAfac acAfgCfcuuggscsg	2533	đổi nghĩ a	23
UGGCGCCAAGGCU GUGUUUGU	1438	usgsgcgcCfaAfGfGf cuguguuuguG96	2534	có nghĩ a	21
ACAAACACAGCCU UGGCGCCAAG	1439	asCfsaaaCfaCfAfgc cuUfgGfcgccasag	2535	đổi nghĩ a	23
UUGGCGCCAAGGC UGUGUUUG	1440	ususggcgCfcAfAfGf gcuguguuugG96	2536	có nghĩ a	21

- 295 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:		Chiều u dài
CAAACACAGCCUU GGCGCCAAGA	1441	csAfsaacAfcAfGfcc uuGfgCfgccaasgsa	2537	đổi nghĩ a	23
UGAAAGCUCUGGC UCUUGGCG	1442	usgsaaagCfuCfUfGf gcucuuggcgL96	2538	có nghĩ a	21
CGCCAAGAGCCAG AGCUUUCAGA	1443	csGfscCaAfgAfGfcc agAfgCfuucasgsa	2539	đổi nghĩ a	23
GAAAGCUCUGGCU CUUGGCGC	1444	gsasaagcUfcUfGfGf cucuuggcgL96	2540	có nghĩ a	21
GCGCCAAGAGCCA GAGCUUUCAG	1445	gsCfsgccAfaGfAfgc caGfaGfcuuucsasg	2541	đổi nghĩ a	23
GUUCUGAAAGCUC UGGCUCUU	1446	gsusucugAfaAfGfCf ucuggcucuuL96	2542	có nghĩ a	21
AAGAGCCAGAGCU UUCAGAACAU	1447	asAfsgagCfcAfGfag cuUfuCfagaacsasu	2543	đổi nghĩ a	23
UGUUCUGAAAGCU CUGGCUCU	1448	usgsuucuGfaAfAfGf cucuggcucuuL96	2544	có nghĩ a	21

- 296 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
AGAGCCAGAGCUU UCAGAACAUC	1449	asGfsagcCfaGfAfgc uuUfcAfgaacasusc	2545	đổi nghĩ a	23
CAGCCACUAUUGA UGUUCUGC	1450	csasgccaCfuAfUfUf gauguucugcL96	2546	có nghĩ a	21
GCAGAACAUCAAU AGUGGCUGGC	1451	gsCfsagaAfcAfUfca auAfgUfggcugsgsc	2547	đổi nghĩ a	23
AGCCACUAUUGAU GUUCUGCC	1452	asgscacUfaUfUfGf auguucugccL96	2548	có nghĩ a	21
GGCAGAACAUCAA UAGUGGCUGG	1453	gsGfscagAfaCfAfuc aaUfaGfuggcusgsg	2549	đổi nghĩ a	23
GUGCCAGCCACUA UUGAUGUU	1454	gsusgccaGfcCfAfCf uauugauguuL96	2550	có nghĩ a	21
AACAUCAUAGUG GCUGGCACCC	1455	asAfscauCfaAfUfag ugGfcUfggcacscsc	2551	đổi nghĩ a	23
GGUGCCAGCCACU AUUGAUGU	1456	gsgsugccAfgCfCfAf cuauugauguL96	2552	có nghĩ a	21

- 297 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
ACAUCAAUAGUGG CUGGCACCCC	1457	asCfsaucAfaUfAfgu ggCfuGfgcaccscsc	2553	đổi nghĩ a	23
ACAAGGACCGAGA AGUCACCA	1458	ascsaaggAfcCfGfAf gaagucaccaL96	2554	có nghĩ a	21
UGGUGACUUCUCG GUCCUUGUAG	1459	usGfsgugAfcUfUfcu cgGfuCfcuugusasg	2555	đổi nghĩ a	23
CAAGGACCGAGAA GUCACCAA	1460	csasaggaCfcGfAfGf aagucaccaaL96	2556	có nghĩ a	21
UUGGUGACUUCUC GGUCCUUGUA	1461	usUfsgguGfaCfUfuc ucGfgUfccuugsusa	2557	đổi nghĩ a	23
AUCUACAAGGACC GAGAAGUC	1462	asuscuacAfaGfGfAf ccgagaagucL96	2558	có nghĩ a	21
GACUUCUCGGUCC UUGUAGAUAU	1463	gsAfscuuCfuCfGfgu ccUfuGfuagausus	2559	đổi nghĩ a	23
UAUCUACAAGGAC CGAGAAGU	1464	usasucuaCfaAfGfGf accgagaaguL96	2560	có nghĩ a	21

- 298 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
ACUUCUCGGUCCU UGUAGAUUA	1465	asCfsuucUfcGfGfuc cuUfgUfagauasusa	2561	đổi nghĩ a	23
CAGAAUGUGAAAG UCAUCGAC	1466	csasgaauGfuGfAfAf agucaucgacL96	2562	có nghĩ a	21
GUCGAUGACUUUC ACAUUCUGGC	1467	gsUfscgaUfgAfCfu ucAfcAfuucugsgsc	2563	đổi nghĩ a	23
AGAAUGUGAAAGU CAUCGACA	1468	asgsaaugUfgAfAfAf gucaucgacaL96	2564	có nghĩ a	21
UGUCGAUGACUUU CACAUUCUGG	1469	usGfsucgAfuGfAfcu uuCfaCfauucusgsg	2565	đổi nghĩ a	23
GUGCCAGAAUGUG AAAGUCAU	1470	gsusgccaGfaAfUfGf ugaaagucauL96	2566	có nghĩ a	21
AUGACUUUCACAU UCUGGCACCC	1471	asUfsgacUfuUfCfac auUfcUfggcacscsc	2567	đổi nghĩ a	23
GGUGCCAGAAUGU GAAAGUCA	1472	gsgsugccAfgAfAfUf gugaaagucaL96	2568	có nghĩ a	21

- 299 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
UGACUUUCACAUU CUGGCACCCA	1473	usGfsacuUfuCfAfca uuCfuGfgcaccscsa	2569	đổi nghĩ a	23
AGAUGUCCUCGAG AUACUAAA	1474	asgsauguCfcUfCfGf agauacuaaaL96	2570	có nghĩ a	21
UUUAGUAUCUCGA GGACAUCUUG	1475	usUfsuagUfaUfCfuc gaGfgAfcaucususg	2571	đổi nghĩ a	23
GAUGUCCUCGAGA UACUAAAG	1476	gsasugucCfuCfGfAf gauacuaaaL96	2572	có nghĩ a	21
CUUUAGUAUCUCG AGGACAUCUU	1477	csUfsuuaGfuAfUfcu cgAfgGfacaucsusu	2573	đổi nghĩ a	23
UUCAAGAUGUCCU CGAGAUAC	1478	ususcaagAfuGfUfCf cucgagauacL96	2574	có nghĩ a	21
GUAUCUCGAGGAC AUCUUGAACA	1479	gsUfsaucUfcGfAfgg acAfuCfuugaascsa	2575	đổi nghĩ a	23
GUUCAAGAUGUCC UCGAGAU	1480	gsusucaaGfaUfGfUf ccucgagauaL96	2576	có nghĩ a	21

- 300 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
UAUCUCGAGGACA UCUUGAACAC	1481	usAfsucuCfgAfGfga caUfcUfugaacsasc	2577	đổi nghĩ a	23
GUGGACUUGCUGC AUAUGUGG	1482	gsusggacUfuGfCfUf gcauauguggL96	2578	có nghĩ a	21
CCACAUAUGCAGC AAGUCCACUG	1483	csCfsacaUfaUfGfca gcAfaGfuccacsusg	2579	đổi nghĩ a	23
UGGACUUGCUGCA UAUGUGGC	1484	usgsgacuUfgCfUfGf cauauguggcL96	2580	có nghĩ a	21
GCCACAUAUGCAG CAAGUCCACU	1485	gsCfscacAfuAfUfgc agCfaAfguccascsu	2581	đổi nghĩ a	23
GACAGUGGACUUG CUGCAUAU	1486	gsascaguGfgAfCfUf ugcugcauauL96	2582	có nghĩ a	21
AUAUGCAGCAAGU CCACUGUCGU	1487	asUfsaugCfaGfCfaa guCfcAfcugucsgsu	2583	đổi nghĩ a	23
CGACAGUGGACUU GCUGCAUA	1488	csgsacagUfgGfAfCf uugcugcauaL96	2584	có nghĩ a	21

- 301 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
UAUGCAGCAAGUC CACUGUCGUC	1489	usAfsugcAfgCfAfag ucCfaCfugucgsusc	2585	đổi nghĩ a	23
AACCAGUACUUUA UCAUUUUC	1490	asasccagUfaCfUfUf uaucauuuucL96	2586	có nghĩ a	21
GAAAAUGAUAAAG UACUGGUUUC	1491	gsAfsaaaUfgAfUfaa agUfaCfugguususc	2587	đổi nghĩ a	23
ACCAGUACUUUAU CAUUUUCU	1492	ascscaguAfcUfUfUf aucauuuucuL96	2588	có nghĩ a	21
AGAAAAUGAUAAA GUACUGGUUU	1493	asGfsaaaAfuGfAfua aaGfuAfcuggususu	2589	đổi nghĩ a	23
UUGAAACCAGUAC UUUAUCAU	1494	ususgaaaCfcAfGfUf acuuuaucauL96	2590	có nghĩ a	21
AUGAUAAAGUACU GGUUUCAAAA	1495	asUfsgauAfaAfGfua cuGfgUfuucaasasa	2591	đổi nghĩ a	23
UUUGAAACCAGUA CUUUAUCA	1496	ususugaaAfcCfAfGf uacuuuaucaL96	2592	có nghĩ a	21

- 302 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
UGAUAAAGUACUG GUUUCAAAAU	1497	usGfsauaAfaGfUfac ugGfuUfucaaasasu	2593	đổi nghĩ a	23
CGAGAAGUCACCA AGAAGCUA	1498	csgsagaaGfuCfAfCf caagaagcuaL96	2594	có nghĩ a	21
UAGCUUCUUGGUG ACUUCUCGGU	1499	usAfsgcuUfcUfUfgg ugAfcUfucucgsgsu	2595	đổi nghĩ a	23
GAGAAGUCACCAA GAAGCUAG	1500	gsasgaagUfcAfCfCf aagaagcuagL96	2596	có nghĩ a	21
CUAGCUUCUUGGU GACUUCUCGG	1501	csUfsagcUfuCfUfug guGfaCfuucucsgsg	2597	đổi nghĩ a	23
GGACCGAGAAGUC ACCAAGAA	1502	gsgsaccgAfgAfAfGf ucaccaagaaL96	2598	có nghĩ a	21
UUCUUGGUGACUU CUCGGUCCUU	1503	usUfscuuGfgUfGfac uuCfuCfpgguccsusu	2599	đổi nghĩ a	23
AGGACCGAGAAGU CACCAAGA	1504	asgsgaccGfaGfAfAf gucaccaagaL96	2600	có nghĩ a	21

- 303 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
UCUUGGUGACUUC UCGGUCCUUG	1505	usCfsuugGfuGfAfcu ucUfcGfguccusug	2601	đổi nghĩ a	23
UCAAAGUGUUGGU AAUGCCUG	1506	uscsaaagUfgUfUfGf guaaugccugL96	2602	có nghĩ a	21
CAGGCAUUACCAA CACUUUGAAC	1507	csAfsggcAfuUfAfcc aaCfaCfuuugasasc	2603	đổi nghĩ a	23
CAAAGUGUUGGUA AUGCCUGA	1508	csasaaguGfuUfGfGf uaaugccugaL96	2604	có nghĩ a	21
UCAGGCAUUACCA ACACUUUGAA	1509	usCfsaggCfaUfUfac caAfcAfcuuugsasa	2605	đổi nghĩ a	23
AGGUUCAAGUGU UGGUAAUG	1510	asgsguucAfaAfGfUf guugguaaugL96	2606	có nghĩ a	21
CAUUACCAACACU UUGAACCUGA	1511	csAfsuuaCfcAfAfca cuUfuGfaaccusgsa	2607	đổi nghĩ a	23
CAGGUUCAAGUG UUGGUAAU	1512	csasgguuCfaAfAfGf uguugguaauL96	2608	có nghĩ a	21

- 304 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
AUUACCAACACUU UGAACCUGAG	1513	asUfsuacCfaAfCfac uuUfgAfaccugsasg	2609	đổi nghĩ a	23
UAUUACUUGACAA AGAGACAC	1514	usasuuacUfuGfAfCf aaagagacacL96	2610	có nghĩ a	21
GUGUCUCUUUGUC AAGUAAUACA	1515	gsUfsgucUfcUfUfug ucAfaGfuaauascsa	2611	đổi nghĩ a	23
AUUACUUGACAAA GAGACACU	1516	asusuacuUfgAfCfAf aagagacacuL96	2612	có nghĩ a	21
AGUGUCUCUUUGU CAAGUAAUAC	1517	asGfsuguCfuCfUfu guCfaAfguaausasc	2613	đổi nghĩ a	23
CAUGUAUUACUUG ACAAAGAG	1518	csasuguaUfuAfCfUf ugacaaagagL96	2614	có nghĩ a	21
CUCUUUGUCAAGU AAUACAUGCU	1519	csUfscuuUfgUfCfaa guAfaUfacaugscsu	2615	đổi nghĩ a	23
GCAUGUAUUACUU GACAAAGA	1520	gscsauguAfuUfAfCf uugacaaagaL96	2616	có nghĩ a	21

- 305 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
UCUUUGUCAAGUA AUACAUGCUG	1521	usCfsuuuGfuCfAfag uaAfuAfcaugcsusg	2617	đổi nghĩ a	23
AAAGUCAUCGACA AGACAUUG	1522	asasagucAfuCfGfAf caagacauugL96	2618	có nghĩ a	21
CAAUGUCUUGUCG AUGACUUUCA	1523	csAfsaugUfcUfUfgu cgAfuGfacuuuscsa	2619	đổi nghĩ a	23
AAGUCAUCGACAA GACAUUGG	1524	asasgucaUfcGfAfCf aagacauuggL96	2620	có nghĩ a	21
CCAAUGUCUUGUC GAUGACUUUC	1525	csCfsaauGfuCfUfug ucGfaUfgacuususc	2621	đổi nghĩ a	23
UGUGAAAGUCAUC GACAAGAC	1526	usgsugaaAfgUfCfAf ucgacaagacL96	2622	có nghĩ a	21
GUCUUGUCGAUGA CUUUCACAUU	1527	gsUfscuuGfuCfGfau gaCfuUfucacasusu	2623	đổi nghĩ a	23
AUGUGAAAGUCAU CGACAAGA	1528	asusgugaAfaGfUfCf aucgacaagaL96	2624	có nghĩ a	21

- 306 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
UCUUGUCGAUGAC UUUCACAUUC	1529	usCfsuugUfcGfAfug acUfuUfcacaususc	2625	đổi nghĩ a	23
AUAUGUGGCUAAA GCAAUAGA	1530	asusauguGfgCfUfAf aagcaauagaL96	2626	có nghĩ a	21
UCUAUUGCUUUAG CCACAU AUGC	1531	usCfsuauUfgCfUfuu agCfcAfcau ausgsc	2627	đổi nghĩ a	23
UAUGUGGCUAAAG CAAUAGAC	1532	usasugugGfcUfAfAf agcaauagacL96	2628	có nghĩ a	21
GUCUAUUGCUUUA GCCACAU AUG	1533	gsUfscuaUfuGfCfuu uaGfcCfacauasusg	2629	đổi nghĩ a	23
CUGCAUAUGUGGC UAAAGCAA	1534	csusgc auAfuGfUfGf gcuaaagcaaL96	2630	có nghĩ a	21
UUGCUUUAGCCAC AUAUGCAGCA	1535	usUfsgcuUfuAfGfcc acAfuAfugcagscsa	2631	đổi nghĩ a	23
GCUGCAUAUGUGG CUAAAGCA	1536	gscsugcaUfaUfGfUf ggcuaaagcaL96	2632	có nghĩ a	21

- 307 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
UGC UUAGCCACA UAUGCAGCAA	1537	usGfscuuUfaGfCfca caUfaUfgcagcsasa	2633	đổi nghĩ a	23
AGACGACAGUGGA CUUGCUGC	1538	asgsacgaCfaGfUfGf gacuugcugcL96	2634	có nghĩ a	21
GCAGCAAGUCCAC UGUCGUCUCC	1539	gsCfsagcAfaGfUfcc acUfgUfcgucuscsc	2635	đổi nghĩ a	23
GACGACAGUGGAC UUGCUGCA	1540	gsascgacAfgUfGfGf acuugcugcaL96	2636	có nghĩ a	21
UGCAGCAAGUCCA CUGUCGUCUC	1541	usGfscagCfaAfGfuc caCfuGfucgucsusc	2637	đổi nghĩ a	23
UUGGAGACGACAG UGGACUUG	1542	ususggagAfcGfAfCf aguggacuugL96	2638	có nghĩ a	21
CAAGUCCACUGUC GUCUCCAAAA	1543	csAfsaguCfcAfCfug ucGfuCfuccaasasa	2639	đổi nghĩ a	23
UUUGGAGACGACA GUGGACUU	1544	ususuggaGfaCfGfAf caguggacuul96	2640	có nghĩ a	21

- 308 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
AAGUCCACUGUCG UCUCCAAAAU	1545	asAfsgucCfaCfUfgu cgUfcUfccaaasasu	2641	đổi nghĩ a	23
GGCCACCUCCUCA AUUGAAGA	1546	gsgscacCfuCfCfUf caauugaagaL96	2642	có nghĩ a	21
UCUUCAAUUGAGG AGGUGGCCCA	1547	usCfsuucAfaUfUfga ggAfgGfuggccscsa	2643	đổi nghĩ a	23
GCCACCUCCUCAA UUGAAGAA	1548	gscscaccUfcCfUfCf aauugaagaaL96	2644	có nghĩ a	21
UUCUUCAAUUGAG GAGGUGGCCC	1549	usUfscuuCfaAfUfug agGfaGfguggcscsc	2645	đổi nghĩ a	23
CCUGGGCCACCUC CUCAAUUG	1550	cscsugggCfcAfCfCf uccucaauugL96	2646	có nghĩ a	21
CAAUUGAGGAGGU GGCCCAGGAA	1551	csAfsauuGfaGfGfag guGfgCfccaggsasa	2647	đổi nghĩ a	23
UCCUGGGCCACCU CCUCAAUU	1552	uscscuggGfcCfAfCf cuccucaauuL96	2648	có nghĩ a	21

- 309 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
AAUUGAGGAGGUG GCCCAGGAAC	1553	asAfsuugAfgGfAfgg ugGfcCfcaggasasc	2649	đổi nghĩ a	23
UGUAUGUUACUUC UUAGAGAG	1554	usgsuaugUfuAfCfUf ucuuagagagL96	2650	có nghĩ a	21
CUCUCUAAGAAGU AACAUACAUC	1555	csUfscucUfaAfGfaa guAfaCfauacasusc	2651	đổi nghĩ a	23
GUAUGUUACUUCU UAGAGAGA	1556	gsusauguUfaCfUfUf cuuagagagaL96	2652	có nghĩ a	21
UCUCUCUAAGAAG UAACAUACAU	1557	usCfsucuCfuAfAfga agUfaAfcauacsasu	2653	đổi nghĩ a	23
AGGAUGUAUGUUA CUUCUUAG	1558	asgsgaugUfaUfGfUf uacuucuuagL96	2654	có nghĩ a	21
CUAAGAAGUAACA UACAUCCUAA	1559	csUfsaagAfaGfUfaa caUfaCfauccusasa	2655	đổi nghĩ a	23
UAGGAUGUAUGUU ACUUCUUA	1560	usasggauGfuAfUfGf uuacuucuaL96	2656	có nghĩ a	21

- 310 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
UAAGAAGUAACAU ACAUCCUAAA	1561	usAfsagaAfgUfAfac auAfcAfuccuasasa	2657	đổi nghĩ a	23
AAAUGUUUUAGGA UGUAUGUU	1562	asasauguUfuUfAfGf gauguauguuL96	2658	có nghĩ a	21
AACAUACAUCCUA AAACAUUUGG	1563	asAfscauAfcAfUfcc uaAfaAfcauuusgsg	2659	đổi nghĩ a	23
AAUGUUUUAGGAU GUAUGUUA	1564	asasuguuUfuAfGfGf auguauguuaL96	2660	có nghĩ a	21
UAACAUACAUCCU AAAACAUUUG	1565	usAfsacaUfaCfAfuc cuAfaAfacauususg	2661	đổi nghĩ a	23
AUCCAAAUGUUUU AGGAUGUA	1566	asusccaaAfuGfUfUf uuaggauguaL96	2662	có nghĩ a	21
UACAUCCUAAAAC AUUUGGAUUAU	1567	usAfscauCfcUfAfaa acAfuUfuggausasu	2663	đổi nghĩ a	23
UAUCCAAAUGUUU UAGGAUGU	1568	usasuccaAfaUfGfUf uuuaggauguL96	2664	có nghĩ a	21

- 311 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
ACAUCCUAAAACA UUUGGAUUA	1569	asCfsaucCfuAfAfaa caUfuUfggauasusa	2665	đổi nghĩ a	23
AUGGGUGGCGGUA AUUGGUGA	1570	asusggguGfgCfGfGf uaauuggugaL96	2666	có nghĩ a	21
UCACCAAUUACCG CCACCCAUC	1571	usCfsaccAfaUfUfac cgCfcAfcccaususc	2667	đổi nghĩ a	23
UGGGUGGCGGUAA UUGGUGAU	1572	usgsggugGfcGfGfUf aauggugauL96	2668	có nghĩ a	21
AUCACCAAUUACC GCCACCAUU	1573	asUfscacCfaAfUfua ccGfcCfaccasusu	2669	đổi nghĩ a	23
UGGAAUGGGUGGC GGUAAUUG	1574	usgsgaauGfgGfUfGf gcgguaauugL96	2670	có nghĩ a	21
CAAUUACCGCCAC CCAUUCCAUA	1575	csAfsauuAfcCfGfcc acCfcAfuuccasasu	2671	đổi nghĩ a	23
UUGGAAUGGGUGG CGGUAAUU	1576	ususggaaUfgGfGfUf ggcgguaauuL96	2672	có nghĩ a	21

- 312 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
AAUUACCGCCACC CAUUCCAAUU	1577	asAfsuuaCfcGfCfca ccCfaUfuccaasusu	2673	đổi nghĩ a	23
UUCAAAGUGUUGG UAAUGCCU	1578	ususcaaaaGfuGfUfUf gguaaugccuL96	2674	có nghĩ a	21
AGGCAUUACCAAC ACUUUGAACC	1579	asGfsgcaUfuAfCfca acAfcUfuugaascsc	2675	đổi nghĩ a	23
UCAAAGUGUUGGU AAUGCCUG	1580	uscsaaagUfgUfUfGf guaaugccugL96	2676	có nghĩ a	21
CAGGCAUUACCAA CACUUUGAAC	1581	csAfsggcAfuUfAfcc aaCfaCfuugasasc	2677	đổi nghĩ a	23
CAGGUCAAAGUG UUGGUAAU	1582	csasgguuCfaAfAfGf uguugguaauL96	2678	có nghĩ a	21
AUUACCAACACUU UGAACCUGAG	1583	asUfsuacCfaAfCfac uuUfgAfaccugsasg	2679	đổi nghĩ a	23
UCAGGUCAAAGU GUUGGUAA	1584	uscsagguUfcAfAfAf guguugguaaL96	2680	có nghĩ a	21

- 313 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
UUACCAACACUUU GAACCUGAGC	1585	usUfsaccAfaCfAfcu uuGfaAfccugasgsc	2681	đổi nghĩ a	23
CCACCUCCUCAAU UGAAGAAG	1586	cscsaccuCfcUfCfAf auugaagaagL96	2682	có nghĩ a	21
CUUCUCAAUUGA GGAGGUGGCC	1587	csUfsucuUfcAfAfu gaGfgAfgguggscsc	2683	đổi nghĩ a	23
CACCUCCUCAAUU GAAGAAGU	1588	csasccucCfuCfAfAf uugaagaaguL96	2684	có nghĩ a	21
ACUUCUCAAUUG AGGAGGUGGC	1589	asCfsuucUfuCfAfau ugAfgGfaggugsgsc	2685	đổi nghĩ a	23
UGGGCCACCUCCU CAAUUGAA	1590	usgsggccAfcCfUfCf cucaauugaaL96	2686	có nghĩ a	21
UUCAAUUGAGGAG GUGGCCAGG	1591	usUfscaaUfuGfAfgg agGfuGfgcccasgsg	2687	đổi nghĩ a	23
CUGGGCCACCUCC UCAAUUGA	1592	csusgggcCfaCfCfUf ccucaauugaL96	2688	có nghĩ a	21

- 314 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
UCAAUUGAGGAGG UGGCCAGGA	1593	usCfsaauUfgAfGfga ggUfgGfcccagsgsa	2689	đổi nghĩ a	23
GAGUGGGUGCCAG AAUGUGAA	1594	gsasguggGfuGfCfCf agaaugugaaL96	2690	có nghĩ a	21
UUCACAUUCUGGC ACCCACUCAG	1595	usUfscacAfuUfCfug gcAfcCfcacucsasg	2691	đổi nghĩ a	23
AGUGGGUGCCAGA AUGUGAAA	1596	asgsugggUfgCfCfAf gaaugugaaaL96	2692	có nghĩ a	21
UUUCACAUUCUGG CACCCACUCA	1597	usUfsucaCfaUfUfcu ggCfaCfccacuscsa	2693	đổi nghĩ a	23
CUCUGAGUGGGUG CCAGAAUG	1598	csuscugaGfuGfGfGf ugccagaaugL96	2694	có nghĩ a	21
CAUUCUGGCACCC ACUCAGAGCC	1599	csAfsuucUfgGfCfac ccAfcUfcagagscsc	2695	đổi nghĩ a	23
GCUCUGAGUGGGU GCCAGAAU	1600	gscsucugAfgUfGfGf gugccagaaauL96	2696	có nghĩ a	21

- 315 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
AUUCUGGCACCCA CUCAGAGCCA	1601	asUfsucuGfgCfAfcc caCfuCfagagcscsa	2697	đổi nghĩ a	23
GCACUGAUGUUCU GAAAGCUC	1602	gscsacugAfuGfUfUf cugaaagcucL96	2698	có nghĩ a	21
GAGCUUUCAGAAC AUCAGUGCCU	1603	gsAfsghcuUfuCfAfga acAfuCfagugcscsu	2699	đổi nghĩ a	23
CACUGAUGUUCUG AAAGCUCU	1604	csascugaUfgUfUfCf ugaaagcucucL96	2700	có nghĩ a	21
AGAGCUUUCAGAA CAUCAGUGCC	1605	asGfsagcUfuUfCfag aaCfaUfcagugscsc	2701	đổi nghĩ a	23
AAAGGCACUGAUG UUCUGAAA	1606	asasaggcAfcUfGfAf uguucugaaaL96	2702	có nghĩ a	21
UUUCAGAACAUCA GUGCCUUUCC	1607	usUfsucaGfaAfCfau caGfuGfccuuuscsc	2703	đổi nghĩ a	23
GAAAGGCACUGAU GUUCUGAA	1608	gsasaaggCfaCfUfGf auguucugaaL96	2704	có nghĩ a	21

- 316 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:		Chiề u dài
UUCAGAACAUCAG UGCCUUUCCG	1609	usUfscagAfaCfAfuc agUfgCfcuuucscsg	2705	đổi nghĩ a	23
GGGAAGGUGGAAG UCUUCCUG	1610	gsgsgaagGfuGfGfAf agucuuccugL96	2706	có nghĩ a	21
CAGGAAGACUUCC ACCUUCCCUU	1611	csAfsggaAfgAfCfuu ccAfcCfuucccsusu	2707	đổi nghĩ a	23
GGAAGGUGGAAGU CUUCCUGG	1612	gsgsaaggUfgGfAfAf gucuuccuggL96	2708	có nghĩ a	21
CCAGGAAGACUUC CACCUUCCCU	1613	csCfsaggAfaGfAfcu ucCfaCfcuuccscsu	2709	đổi nghĩ a	23
GGAAGGGAAGGUG GAAGUCUU	1614	gsgsaaggGfaAfGfGf uggaagucuuL96	2710	có nghĩ a	21
AAGACUUCCACCU UCCCUUCCAC	1615	asAfsgacUfuCfCfac cuUfcCfcuuccsasc	2711	đổi nghĩ a	23
UGGAAGGGAAGGU GGAAGUCU	1616	usgsgaagGfgAfAfGf guggaagucuuL96	2712	có nghĩ a	21

- 317 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
AGACUCCACCUU CCCUUCCACA	1617	asGfsacuUfcCfAfcc uuCfcCfuuccascsa	2713	đổi nghĩ a	23
UGCUAAAUCAGUA CUUCCAAA	1618	usgscuaaaAfuCfAfGf uacuuccaaaL96	2714	có nghĩ a	21
UUUGGAAGUACUG AUUUAGCAUG	1619	usUfsuggAfaGfUfac ugAfuUfuagcasusg	2715	đổi nghĩ a	23
GCUAAAUCAGUAC UUCCAAAG	1620	gscsuaaaaUfcAfGfUf acuuccaaagL96	2716	có nghĩ a	21
CUUUGGAAGUACU GAUUUAGCAU	1621	csUfsuugGfaAfGfua cuGfaUfuuagcsasu	2717	đổi nghĩ a	23
AACAUGCUIAAAUC AGUACUUC	1622	asascaugCfuAfAfAf ucaguacuucL96	2718	có nghĩ a	21
GAAGUACUGAUUU AGCAUGUUGU	1623	gsAfsaguAfcUfGfau uuAfgCfauguusgsu	2719	đổi nghĩ a	23
CAACAUGCUIAAU CAGUACUU	1624	csasacauGfcUfAfAf aucaguacuL96	2720	có nghĩ a	21

- 319 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
UCAUCCUGAGUUG UGGCGGCAGU	1633	usCfsaucCfuGfAfgu ugUfgGfcggcasgsu	2729	đổi nghĩ a	23
GCAACCGUCUGGA UGAUGUGC	1634	gscsaaccGfuCfUfGf gaugaugugcL96	2730	có nghĩ a	21
GCACAUCAUCCAG ACGGUUGCCC	1635	gsCfsacaUfcAfUfcc agAfcGfguugcscsc	2731	đổi nghĩ a	23
CAACCGUCUGGAU GAUGUGCG	1636	csasaccgUfcUfGfGf augaugugcgL96	2732	có nghĩ a	21
CGCACAUCAUCCA GACGGUUGCC	1637	csGfscacAfuCfAfuc caGfaCfpgguugscsc	2733	đổi nghĩ a	23
CUGGGCAACCGUC UGGAUGAU	1638	csusgggcAfaCfCfGf ucuggaugauL96	2734	có nghĩ a	21
AUCAUCCAGACGG UUGCCCAGGU	1639	asUfscauCfcAfGfac ggUfuGfcccagsgsu	2735	đổi nghĩ a	23
CCUGGGCAACCGU CUGGAUGA	1640	cscsugggCfaAfCfCf gucuggaugaL96	2736	có nghĩ a	21

- 318 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
AAGUACUGAUUUA GCAUGUUGUU	1625	asAfsguaCfuGfAfu uaGfcAfuguugsusu	2721	đổi nghĩ a	23
CCACAACUCAGGA UGAAAAAU	1626	cscsacaaCfuCfAfGf gaugaaaaauL96	2722	có nghĩ a	21
AUUUUUCAUCCUG AGUUGUGGCG	1627	asUfsuuuUfcAfUfcc ugAfgUfuguggscsg	2723	đổi nghĩ a	23
CACAACUCAGGAU GAAAAAUU	1628	csascaacUfcAfGfGf augaaaaauL96	2724	có nghĩ a	21
AAUUUUUCAUCCU GAGUUGUGGC	1629	asAfsuuuUfuCfAfuc cuGfaGfuugugsgsc	2725	đổi nghĩ a	23
GCCGCCACAACUC AGGAUGAA	1630	gscscgccAfcAfAfCf ucaggaugaaL96	2726	có nghĩ a	21
UUCAUCCUGAGUU GUGGCGGCAG	1631	usUfscauCfcUfGfag uuGfuGfgcggsasg	2727	đổi nghĩ a	23
UGCCGCCACAACU CAGGAUGA	1632	usgscgcCfaCfAfAf cucaggaugaL96	2728	có nghĩ a	21

- 320 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
UCAUCCAGACGGU UGCCCAGGUA	1641	usCfsaucCfaGfAfcg guUfgCfccaggsusa	2737	đổi nghĩ a	23
GCAAUGAUGAAG AAACUUUG	1642	gscsaaauGfaUfGfAf agaaacuuugL96	2738	có nghĩ a	21
CAAAGUUUCUUCA UCAUUUGCCC	1643	csAfsaagUfuUfCfuu caUfcAfuuugcscsc	2739	đổi nghĩ a	23
CAAUGAUGAAGA AACUUUGG	1644	csasaaugAfuGfAfAf gaaacuuuggL96	2740	có nghĩ a	21
CCAAAGUUUCUUC AUCAUUUGCC	1645	csCfsaaaGfuUfUfcu ucAfuCfauuugscsc	2741	đổi nghĩ a	23
UGGGGCAAUGAU GAAGAAAC	1646	usgsgggcAfaAfUfGf augaagaaacL96	2742	có nghĩ a	21
GUUUCUUCAUCAU UUGCCCCAGA	1647	gsUfsuucUfuCfAfuc auUfuGfccccasgsa	2743	đổi nghĩ a	23
CUGGGGCAAUGA UGAAGAAA	1648	csusggggCfaAfAfUf gaugaagaaaL96	2744	có nghĩ a	21

- 321 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
UUUCUUCAUCAU UGCCCCAGAC	1649	usUfsucuUfcAfUfca uuUfgCfcccagsasc	2745	đổi nghĩ a	23
CCAAGGCUGUGUU UGUGGGGA	1650	cscsaaggCfuGfUfGf uuuguggggaL96	2746	có nghĩ a	21
UCCCCACAAACAC AGCCUUGGCG	1651	usCfsccccAfcAfAfac acAfgCfcuuggscsg	2747	đổi nghĩ a	23
CAAGGCUGUGUUU GUGGGGAG	1652	csasaggcUfgUfGfUf uuguggggagL96	2748	có nghĩ a	21
CUCCCCACAAACA CAGCCUUGGC	1653	csUfsccccCfaCfAfaa caCfaGfccuugsgsc	2749	đổi nghĩ a	23
GGCGCCAAGGCUG UGUUUGUG	1654	gsgscgccAfaGfGfCf uguguuugugL96	2750	có nghĩ a	21
CACAAACACAGCC UUGGCGCCAA	1655	csAfscaaAfcAfCfag ccUfuGfgcgccsasa	2751	đổi nghĩ a	23
UGGCGCCAAGGCU GUGUUUGU	1656	usgsgcgcCfaAfGfGf cuguguuuguL96	2752	có nghĩ a	21

- 322 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
ACAAACACAGCCU UGGCGCCAAG	1657	asCfsaaaCfaCfAfgc cuUfgGfcgccasasg	2753	đổi nghĩ a	23
ACUGCCGCCACAA CUCAGGAU	1658	ascsugccGfcCfAfCf aacucaggauL96	2754	có nghĩ a	21
AUCCUGAGUUGUG GCGGCAGUUU	1659	asUfscCuGfaGfUfug ugGfcGfgcagususu	2755	đổi nghĩ a	23
CUGCCGCCACAAC UCAGGAUG	1660	csusgccgCfcAfCfAf acucaggauL96	2756	có nghĩ a	21
CAUCCUGAGUUGU GGCGGCAGUU	1661	csAfsuccUfgAfGfuu guGfgCfggcagsusu	2757	đổi nghĩ a	23
UCAAACUGCCGCC ACAACUCA	1662	uscsaaacUfgCfCfGf ccacaacucaL96	2758	có nghĩ a	21
UGAGUUGUGGCGG CAGUUUGAAU	1663	usGfsaguUfgUfGfgc ggCfaGfuuugasasu	2759	đổi nghĩ a	23
UCAAACUGCCGC CACAACUC	1664	ususcaaaCfuGfCfCf gccacaacucL96	2760	có nghĩ a	21

- 323 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:		Chiề u dài
GAGUUGUGGCGGC AGUUUGAAUC	1665	gsAfsguuGfuGfGfcg gcAfgUfuugaasusc	2761	đổi nghĩ a	23
GGGAAGAUUAUCAA AUGGCUGA	1666	gsgsgaagAfuAfUfCf aaauggcugaL96	2762	có nghĩ a	21
UCAGCCAUUUGAU AUCUUCCCAG	1667	usCfsagcCfaUfUfug auAfuCfuucccsasg	2763	đổi nghĩ a	23
GGAAGAUUAUCAA UGGCUGAG	1668	gsgsaagaUfaUfCfAf aauggcugagL96	2764	có nghĩ a	21
CUCAGCCAUUUGA UAUCUUCCCA	1669	csUfscagCfcAfUfuu gaUfaUfcuuccscsa	2765	đổi nghĩ a	23
AGCUGGGAAGAU UCAAAUGG	1670	asgscuggGfaAfGfAf uaucaaauggL96	2766	có nghĩ a	21
CCAUUUGAUUAUCU UCCCAGCUGA	1671	csCfsauuUfgAfUfau cuUfcCfcagcusgsa	2767	đổi nghĩ a	23
CAGCUGGGAAGAU AUCAAUG	1672	csasgcugGfgAfAfGf auaucaaaugL96	2768	có nghĩ a	21

- 324 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
CAUUUGAUUAUCUU CCCAGCUGAU	1673	csAfsuuuGfaUfAfuc uuCfcCfagcugsasu	2769	đổi nghĩ a	23
AAUCAGUACUCC AAAGUCUA	1674	asasucagUfaCfUfUf ccaaagucuaL96	2770	có nghĩ a	21
UAGACUUUGGAAG UACUGAUUUA	1675	usAfsgacUfuUfGfga agUfaCfugauususa	2771	đổi nghĩ a	23
AUCAGUACUCCA AAGUCUAU	1676	asuscaguAfcUfUfCf caaagucuaL96	2772	có nghĩ a	21
AUAGACUUUGGAA GUACUGAUUU	1677	asUfsagaCfuUfUfgg aaGfuAfcugaususu	2773	đổi nghĩ a	23
GCUAAAUCAGUAC UUCCAAAG	1678	gscsuaaaaUfcAfGfUf acuuccaaagL96	2774	có nghĩ a	21
CUUUGGAAGUACU GAUUUAGCAU	1679	csUfsuugGfaAfGfua cuGfaUfuuagcsasu	2775	đổi nghĩ a	23
UGCUIAAAUCAGUA CUUCCAAA	1680	usgscuaaaAfuCfAfGf uacuuccaaaL96	2776	có nghĩ a	21

- 325 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
UUUGGAAGUACUG AUUUAGCAUG	1681	usUfsuggAfaGfUfac ugAfuUfuagcasusg	2777	đổi nghĩ a	23
UCAGCAUGCCAAU AUGUGUGG	1682	uscsagcaUfgCfCfAf auauguguggL96	2778	có nghĩ a	21
CCACACAUAUUGG CAUGCUGACC	1683	csCfsacaCfaUfAfuu ggCfaUfgcugascsc	2779	đổi nghĩ a	23
CAGCAUGCCAAUA UGUGUGGG	1684	csasgcAuGfcCfAfAf uaugugugggL96	2780	có nghĩ a	21
CCCACACAUAUUG GCAUGCUGAC	1685	csCfscacAfcAfUfau ugGfcAfugcugsasc	2781	đổi nghĩ a	23
AGGGUCAGCAUGC CAAUAUGU	1686	asgsggucAfgCfAfUf gccaauauguL96	2782	có nghĩ a	21
ACAUAUUGGCAUG CUGACCCUCU	1687	asCfsauaUfuGfGfca ugCfuGfaccuscsu	2783	đổi nghĩ a	23
GAGGGUCAGCAUG CCAAUAUG	1688	gsasggguCfaGfCfAf ugccaauaugL96	2784	có nghĩ a	21

- 326 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
CAUAUUGGCAUGC UGACCCUCUG	1689	csAfsuauUfgGfCfau gcUfgAfcccucsusg	2785	đổi nghĩ a	23
GCAUAUGUGGCUA AAGCAAUA	1690	gscsauauGfuGfGfCf uaaagcaauaL96	2786	có nghĩ a	21
UAUUGCUIIUAGCC ACAUAUGCAG	1691	usAfsuugCfuUfUfag ccAfcAfuaugcsasg	2787	đổi nghĩ a	23
CAUAUGUGGCUAA AGCAAUAG	1692	csasuaugUfgGfCfUf aaagcaauagL96	2788	có nghĩ a	21
CUAUUGCUIIUAGC CACAU AUGCA	1693	csUfsauuGfcUfUfua gcCfaCfauaugscsa	2789	đổi nghĩ a	23
UGCUGCAUAUGUG GCUAAAGC	1694	usgscugcAfuAfUfGf uggcuaaagcL96	2790	có nghĩ a	21
GCUUUAGCCACAU AUGCAGCAAG	1695	gsCfsuuuAfgCfCfac auAfuGfcagcasasg	2791	đổi nghĩ a	23
UUGCUGCAUAUGU GGCUAAAG	1696	ususgcugCfaUfAfUf guggcuaaagL96	2792	có nghĩ a	21

- 327 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
CUUUAGCCACAUA UGCAGCAAGU	1697	csUfsuuaGfcCfAfca uaUfgCfagcaasgsu	2793	đổi nghĩ a	23
AAAUGAUGAAGAA ACUUUGGC	1698	asasaugaUfgAfAfGf aaacuuuggcL96	2794	có nghĩ a	21
GCCAAAGUUUCUU CAUCAUUUGC	1699	gsCfscaaAfgUfUfuc uuCfaUfcauuusgsc	2795	đổi nghĩ a	23
AAUGAUGAAGAAA CUUUGGCU	1700	asasugauGfaAfGfAf aacuuuggcuL96	2796	có nghĩ a	21
AGCCAAAGUUUCU UCAUCAUUUG	1701	asGfscCaAfaGfUfuu cuUfcAfucaususg	2797	đổi nghĩ a	23
GGGCAAUGAUGA AGAAACUU	1702	gsgsgcaaAfuGfAfUf gaagaaacuuL96	2798	có nghĩ a	21
AAGUUUCUUCAUC AUUUGCCCCA	1703	asAfsguuUfcUfUfca ucAfuUfugccccscsa	2799	đổi nghĩ a	23
GGGGCAAUGAUG AAGAAACU	1704	gsgsggcaAfaUfGfAf ugaagaaacuuL96	2800	có nghĩ a	21

- 328 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
AGUUUCUUCAUCA UUUGCCCCAG	1705	asGfsuuuCfuUfCfau caUfuUfgccccsasg	2801	đổi nghĩ a	23
GAGAUACUAAAGG AAGAAUUC	1706	gsasgauaCfuAfAfAf ggaagaauucL96	2802	có nghĩ a	21
GAAUUCUUCCUUU AGUAUCUCGA	1707	gsAfsauuCfuUfCfcu uuAfgUfaucucsgsa	2803	đổi nghĩ a	23
AGAUACUAAAGGA AGAAUUC	1708	asgsauacUfaAfAfGf gaagaauuccL96	2804	có nghĩ a	21
GGAAUUCUUCCUU UAGUAUCUCG	1709	gsGfsaaUfcUfUfcc uuUfaGfuaucuscsg	2805	đổi nghĩ a	23
CCUCGAGAUACUA AAGGAAGA	1710	cscsucgaGfaUfAfCf uaaaggaagaL96	2806	có nghĩ a	21
UCUUCCUUUAGUA UCUCGAGGAC	1711	usCfsuucCfuUfUfag uaUfcUfcgaggsasc	2807	đổi nghĩ a	23
UCCUCGAGAUACU AAAGGAAG	1712	uscscucgAfgAfUfAf cuaaaggaagL96	2808	có nghĩ a	21

- 329 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
CUUCCUUUAGUAU CUCGAGGACA	1713	csUfsuccUfuUfAfgu auCfuCfagaggascsa	2809	đổi nghĩ a	23
ACAACUCAGGAUG AAAAUUU	1714	ascsaacuCfaGfGfAf ugaaaaauuuL96	2810	có nghĩ a	21
AAAUUUUUCAUCC UGAGUUGUGG	1715	asAfsauuUfuUfCfau ccUfgAfguugusgsg	2811	đổi nghĩ a	23
CAACUCAGGAUGA AAAAUUU	1716	csasacucAfgGfAfUf gaaaaauuuuL96	2812	có nghĩ a	21
AAAAUUUUCAUC CUGAGUUGUG	1717	asAfsaauUfuUfUfca ucCfuGfaguugsusg	2813	đổi nghĩ a	23
CGCCACAACUCAG GAUGAAAA	1718	csgsccacAfaCfUfCf aggaugaaaaL96	2814	có nghĩ a	21
UUUUCAUCCUGAG UUGUGGCGGC	1719	usUfsuucAfuCfCfug agUfuGfuggcgsgsc	2815	đổi nghĩ a	23
CCGCCACAACUCA GGAUGAAA	1720	cscsgccaCfaAfCfUf caggaugaaaaL96	2816	có nghĩ a	21

- 330 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
UUUCAUCCUGAGU UGUGGCGGCA	1721	usUfsucaUfcCfUfga guUfgUfggcggscsa	2817	đổi nghĩ a	23
AGGGAAGGUGGAA GUCUCCU	1722	asgsggaaGfgUfGfGf aagucuuccuL96	2818	có nghĩ a	21
AGGAAGACUUCCA CCUUCCCUUC	1723	asGfsgaaGfaCfUfuc caCfcUfucccususc	2819	đổi nghĩ a	23
GGGAAGGUGGAAG UCUUCCUG	1724	gsgsgaagGfuGfGfAf agucuuccugL96	2820	có nghĩ a	21
CAGGAAGACUUCC ACCUUCCCUU	1725	csAfsggaAfgAfCfu ccAfcCfuucccsusu	2821	đổi nghĩ a	23
UGGAAGGGAAGGU GGAAGUCU	1726	usgsgaagGfgAfAfGf guggaagucuL96	2822	có nghĩ a	21
AGACUUCCACCUU CCCUUCCACA	1727	asGfsacuUfcCfAfcc uuCfcCfuuccascsa	2823	đổi nghĩ a	23
GUGGAAGGGAAGG UGGAAGUC	1728	gsusggaaGfgGfAfAf gguggaagucL96	2824	có nghĩ a	21

- 331 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:		Chiề u dài
GACUCCACCUUC CCUCCACAG	1729	gsAfscuuCfcAfCfcu ucCfcUfuccacsasg	2825	đổi nghĩ a	23
GGCGAGCUUGCCA CUGUGAGA	1730	gsgscgagCfuUfGfCf cacugugagaL96	2826	có nghĩ a	21
UCUCACAGUGGCA AGCUCGCCGU	1731	usCfsucaCfaGfUfgg caAfgCfucgccsgsu	2827	đổi nghĩ a	23
GCGAGCUUGCCAC UGUGAGAG	1732	gscsgagcUfuGfCfCf acugugagagL96	2828	có nghĩ a	21
CUCUCACAGUGGC AAGCUCGCCG	1733	csUfscucAfcAfGfug gcAfaGfcucgcscsg	2829	đổi nghĩ a	23
GGACGGCGAGCUU GCCACUGU	1734	gsgsacggCfgAfGfCf uugccacuguL96	2830	có nghĩ a	21
ACAGUGGCAAGCU CGCCGUCCAC	1735	asCfsaguGfgCfAfag cuCfgCfcguccsasc	2831	đổi nghĩ a	23
UGGACGGCGAGCU UGCCACUG	1736	usgsgacgGfcGfAfGf cuugccacugL96	2832	có nghĩ a	21

- 332 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
CAGUGGCAAGCUC GCCGUCCACA	1737	csAfsugugGfcAfAfgc ucGfcCfguccascsa	2833	đổi nghĩ a	23
AUGUGCGUAAACAG AUUCAAAAC	1738	asusgugcGfuAfAfCf agauucaaaacL96	2834	có nghĩ a	21
GUUUGAAUCUGUU ACGCACAUCA	1739	gsUfsuugAfaUfCfug uuAfcGfcacauscsa	2835	đổi nghĩ a	23
UGUGCGUAAACAGA UUCAAAACU	1740	usgsugcgUfaAfCfAf gauucaaaacuL96	2836	có nghĩ a	21
AGUUUGAAUCUGU UACGCACAUC	1741	asGfsuuuGfaAfUfcu guUfaCfgcacasusc	2837	đổi nghĩ a	23
GAUGAUGUGCGUA ACAGAUUC	1742	gsasugauGfuGfCfGf uaacagauucL96	2838	có nghĩ a	21
GAAUCUGUUACGC ACAUCAUCCA	1743	gsAfsaucUfgUfUfac gcAfcAfucaucscsa	2839	đổi nghĩ a	23
GGAUGAUGUGCGU AACAGAUU	1744	gsgsaugaUfgUfGfCf guaacagauuL96	2840	có nghĩ a	21

- 333 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
AAUCUGUUACGCA CAUCAUCCAG	1745	asAfsucuGfuUfAfcg caCfaUfcauccsasg	2841	đổi nghĩ a	23
GGGUCAGCAUGCC AAUAUGUG	1746	gsgsgucaGfcAfUfGf ccaauaugugL96	2842	có nghĩ a	21
CACAUAUUGGCAU GCUGACCCUC	1747	csAfscauAfuUfGfgc auGfcUfgacccsusc	2843	đổi nghĩ a	23
GGUCAGCAUGCCA AUAUGUGU	1748	gsgsucagCfaUfGfCf caauauguguL96	2844	có nghĩ a	21
ACACAUAUUGGCA UGCUGACCCU	1749	asCfsacaUfaUfUfgg caUfgCfugaccscsu	2845	đổi nghĩ a	23
CAGAGGGUCAGCA UGCCAAUA	1750	csasgaggGfuCfAfGf caugccaauaL96	2846	có nghĩ a	21
UAUUGGCAUGCUG ACCCUCUGUC	1751	usAfsuugGfcAfUfgc ugAfcCfcucugsusc	2847	đổi nghĩ a	23
ACAGAGGGUCAGC AUGCCAAU	1752	ascsagagGfgUfCfAf gcaugccaauL96	2848	có nghĩ a	21

- 334 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
AUUGGCAUGCUGA CCCUCUGUCC	1753	asUfsuggCfaUfGfcu gaCfcCfucuguscsc	2849	đổi nghĩ a	23
GCUUGAAUGGGAU CUUGGUGU	1754	gscsuugaAfuGfGfGf aucuugguguL96	2850	có nghĩ a	21
ACACCAAGAUCCC AUUCAAGCCA	1755	asCfsaccAfaGfAfuc ccAfuUfcaagcscsa	2851	đổi nghĩ a	23
CUUGAAUGGGAUC UUGGUGUC	1756	csusugaaUfgGfGfAf ucuuggugucL96	2852	có nghĩ a	21
GACACCAAGAUCC CAUUCAAGCC	1757	gsAfscacCfaAfGfau ccCfaUfucaagscsc	2853	đổi nghĩ a	23
CAUGGCUUGAAUG GGAUCUUG	1758	csasuggcUfuGfAfAf ugggaucuuL96	2854	có nghĩ a	21
CAAGAUCCCAUUC AAGCCAUGUU	1759	csAfsagaUfcCfCfau ucAfaGfccaugssusu	2855	đổi nghĩ a	23
ACAUGGCUUGAAU GGGAUCUU	1760	ascsauggCfuUfGfAf augggaucuuL96	2856	có nghĩ a	21

- 335 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:		Chiề u dài
AAGAUCCCAUUCA AGCCAUGUUU	1761	asAfsgauCfcCfAfuu caAfgCfcaugususu	2857	đổi nghĩ a	23
UCAAUUGGCUGAG AAGACUGA	1762	uscsaaauGfgCfUfGf agaagacugaL96	2858	có nghĩ a	21
UCAGUCUUCUCAG CCAUUUGAUA	1763	usCfsaguCfuUfCfuc agCfcAfuuugasusa	2859	đổi nghĩ a	23
CAAUUGGCUGAGA AGACUGAC	1764	csasaaugGfcUfGfAf gaagacugacL96	2860	có nghĩ a	21
GUCAGUCUUCUCA GCCAUUUGAU	1765	gsUfscagUfcUfUfcu caGfcCfauuugsasu	2861	đổi nghĩ a	23
GAUAUCAAAUGGC UGAGAAGA	1766	gsasuaucAfaAfUfGf gcugagaagaL96	2862	có nghĩ a	21
UCUUCUCAGCCAU UUGAUAUCUU	1767	usCfsuucUfcAfGfcc auUfuGfauaucsusu	2863	đổi nghĩ a	23
AGAUAUCAAUUGG CUGAGAAG	1768	asgsauauCfaAfAfUf ggcugagaagL96	2864	có nghĩ a	21

- 336 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
CUUCUCAGCCAUU UGAUAUCUUC	1769	csUfsucuCfaGfCfca uuUfgAfuaucususc	2865	đổi nghĩ a	23
GAAAGUCAUCGAC AAGACAUU	1770	gsasaaguCfaUfCfGf acaagacauuL96	2866	có nghĩ a	21
AAUGUCUUGUCGA UGACUUUCAC	1771	asAfsuguCfuUfGfuc gaUfgAfcuuucsasc	2867	đổi nghĩ a	23
AAAGUCAUCGACA AGACAUUG	1772	asasagucAfuCfGfAf caagacauugL96	2868	có nghĩ a	21
CAAUGUCUUGUCG AUGACUUUCA	1773	csAfsaugUfcUfUfgu cgAfuGfacuuuscsa	2869	đổi nghĩ a	23
AUGUGAAAGUCAU CGACAAGA	1774	asusgugaAfaGfUfCf aucgacaagaL96	2870	có nghĩ a	21
UCUUGUCGAUGAC UUUCACAUUC	1775	usCfsuugUfcGfAfug acUfuUfcacaususc	2871	đổi nghĩ a	23
AAUGUGAAAGUCA UCGACAAG	1776	asasugugAfaAfGfUf caucgacaagL96	2872	có nghĩ a	21

- 337 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:		Chiề u dài
CUUGUCGAUGACU UUCACAUUCU	1777	csUfsuguCfgAfUfga cuUfuCfacauuscsu	2873	đổi nghĩ a	23
GGCUAAUUUGUAU CAAUGAUU	1778	gsgscuaaUfuUfGfUf aucaugauuL96	2874	có nghĩ a	21
AAUCAUUGAUACA AAUUAGCCGG	1779	asAfsucaUfuGfAfua caAfaUfuagccsgsg	2875	đổi nghĩ a	23
GCUAAUUUGUAUC AAUGAUUA	1780	gscsuaauUfuGfUfAf ucaaugauuaL96	2876	có nghĩ a	21
UAAUCAUUGAUAC AAAUUAGCCG	1781	usAfsaucAfuUfGfau acAfaAfuuagcscsg	2877	đổi nghĩ a	23
CCCCGGCUAAUUU GUAUCAAU	1782	cscscggCfuAfAfUf uuguaucaauL96	2878	có nghĩ a	21
AUUGAUACAAAUU AGCCGGGGGA	1783	asUfsugaUfaCfAfaa uuAfgCfcggggsgsa	2879	đổi nghĩ a	23
CCCCGGCUAAUU UGUAUCAA	1784	cscscggGfcUfAfAf uuuguaucaaL96	2880	có nghĩ a	21

- 338 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
UUGAUACAAAUUA GCCGGGGGAG	1785	usUfsgauAfcAfAfau uaGfcCfgggggsasg	2881	đổi nghĩ a	23
UGUCGACUUCUGU UUUAGGAC	1786	usgsucgaCfuUfCfUf guuuuaggacL96	2882	có nghĩ a	21
GUCCUAAAACAGA AGUCGACAGA	1787	gsUfscCuAfaAfAfca gaAfgUfcgacasgsa	2883	đổi nghĩ a	23
GUCGACUUCUGUU UUAGGACA	1788	gsuscgacUfuCfUfGf uuuuaggacaL96	2884	có nghĩ a	21
UGUCCUAAAACAG AAGUCGACAG	1789	usGfsuccUfaAfAfac agAfaGfucgacsasg	2885	đổi nghĩ a	23
GAUCUGUCGACUU CUGUUUUA	1790	gsasucugUfcGfAfCf uucuguuuuuL96	2886	có nghĩ a	21
UAAAACAGAAGUC GACAGAUCUG	1791	usAfsaaaCfaGfAfag ucGfaCfagaucsusg	2887	đổi nghĩ a	23
AGAUCUGUCGACU UCUGUUUU	1792	asgsaucuGfuCfGfAf cuucuguuuuL96	2888	có nghĩ a	21

- 339 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:		Chiề u dài
AAAACAGAAGUCG ACAGAUCUGU	1793	asAfsaacAfgAfAfgu cgAfcAfgaucusgsu	2889	đổi nghĩ a	23
CCGAGAAGUCACC AAGAAGCU	1794	cscsgagaAfgUfCfAf ccaagaagcuL96	2890	có nghĩ a	21
AGCUUCUUGGUGA CUUCUCGGUC	1795	asGfscuuCfuUfGfgu gaCfuUfcucggsusc	2891	đổi nghĩ a	23
CGAGAAGUCACCA AGAAGCUA	1796	csgsagaaGfuCfAfCf caagaagcuaL96	2892	có nghĩ a	21
UAGCUUCUUGGUG ACUUCUCGGU	1797	usAfs'gcuUfcUfUfgg ugAfcUfucucgsgsu	2893	đổi nghĩ a	23
AGGACCGAGAAGU CACCAAGA	1798	asgsgaccGfaGfAfAf gucaccaagaL96	2894	có nghĩ a	21
UCUUGGUGACUUC UCGGUCCUUG	1799	usCfsuugGfuGfAfcu ucUfcGfguccusug	2895	đổi nghĩ a	23
AAGGACCGAGAAG UCACCAAG	1800	asasggacCfgAfGfAf agucaccaagL96	2896	có nghĩ a	21

- 340 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
CUUGGUGACUUCU CGGUCCUUGU	1801	csUfsuggUfgAfCfu cuCfgGfuccuusgsu	2897	đổi nghĩ a	23
AAACAUGGCUUGA AUGGGAUC	1802	asasacauGfgCfUfUf gaaugggaucL96	2898	có nghĩ a	21
GAUCCCAUUCAAG CCAUGUUUAA	1803	gsAfsuccCfaUfUfca agCfcAfuguuusasa	2899	đổi nghĩ a	23
AACAUGGCUUGAA UGGGAUCU	1804	asascaugGfcUfUfGf aaugggaucL96	2900	có nghĩ a	21
GAUCCCAUUCAA GCCAUGUUUA	1805	asGfsaucCfcAfUfuc aaGfcCfauguususa	2901	đổi nghĩ a	23
UGUUAACAUGGC UUGAAUGG	1806	usgsuuAAfCfAfUfGf gcuugaauggL96	2902	có nghĩ a	21
CCAUUCAAGCCAU GUUUAACAGC	1807	csCfsauuCfaAfGfcc auGfuUfuaacasgsc	2903	đổi nghĩ a	23
CUGUUAACAUGG CUUGAAUG	1808	csusguuaAfaCfAfUf ggcuugaaugL96	2904	có nghĩ a	21

- 341 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
CAUUCAAGCCAUG UUUAACAGCC	1809	csAfsuucAfaGfCfca ugUfuUfaacagscsc	2905	đổi nghĩ a	23
GACUUGCUGCAUA UGUGGCUA	1810	gsascuugCfuGfCfAf uauguggcuaL96	2906	có nghĩ a	21
UAGCCACAUAUGC AGCAAGUCCA	1811	usAfsgccAfcAfUfau gcAfgCfaagucscsa	2907	đổi nghĩ a	23
ACUUGCUGCAUAU GUGGCUAA	1812	ascsuugcUfgCfAfUf auguggcuaaL96	2908	có nghĩ a	21
UUAGCCACAUAUG CAGCAAGUCC	1813	usUfsagcCfaCfAfua ugCfaGfcaaguscs	2909	đổi nghĩ a	23
AGUGGACUUGCUG CAUAUGUG	1814	asgsuggaCfuUfGfCf ugcauaugugL96	2910	có nghĩ a	21
CACAUAUGCAGCA AGUCCACUGU	1815	csAfscauAfuGfCfag caAfgUfccacusgsu	2911	đổi nghĩ a	23
CAGUGGACUUGC GCAUAUGU	1816	csasguggAfcUfUfGf cugcauauguL96	2912	có nghĩ a	21

- 342 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
ACAUAUGCAGCAA GUCCACUGUC	1817	asCfsauaUfgCfAfgc aaGfuCfcacugsusc	2913	đổi nghĩ a	23
UAAUUCAGUACUU CCAAAGUC	1818	usasaaucaUfgUfAfCf uuccaaagucL96	2914	có nghĩ a	21
GACUUUGGAAGUA CUGAUUUAGC	1819	gsAfscuuUfgGfAfag uaCfuGfauuuasgsc	2915	đổi nghĩ a	23
AAAUUCAGUACUUC CAAAGUCU	1820	asasaaucaGfuAfCfUf uccaaagucL96	2916	có nghĩ a	21
AGACUUUGGAAGU ACUGAUUUAG	1821	asGfsacuUfuGfGfaa guAfcUfgauuusasg	2917	đổi nghĩ a	23
AUGCUAAAUCAGU ACUUCCAA	1822	asusgcuaAfaUfCfAf guacuuccaaL96	2918	có nghĩ a	21
UUGGAAGUACUGA UUUAGCAUGU	1823	usUfsggaAfgUfAfcu gaUfuUfagcausgsu	2919	đổi nghĩ a	23
CAUGCUAAAUCAG UACUUCCA	1824	csasugcuAfaAfUfCf aguacuuccaL96	2920	có nghĩ a	21

- 343 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều u dài
UGGAAGUACUGAU UUAGCAUGUU	1825	usGfsgaaGfuAfCfug auUfuAfgcaugsusu	2921	đổi nghĩ a	23
UCCUCAAUUGAAG AAGUGGCG	1826	uscscucaAfuUfGfAf agaaguggcgL96	2922	có nghĩ a	21
CGCCACUUCUUCA AUUGAGGAGG	1827	csGfscCaCfuUfCfu caAfuUfgaggasgsg	2923	đổi nghĩ a	23
CCUCAAUUGAAGA AGUGGCGG	1828	cscsucaaUfuGfAfAf gaaguggcgL96	2924	có nghĩ a	21
CCGCCACUUCUUC AAUUGAGGAG	1829	csCfsgccAfcUfUfcu ucAfaUfugaggsasg	2925	đổi nghĩ a	23
CACCUCCUCAAUU GAAGAAGU	1830	csasccucCfuCfAfAf uugaagaaguL96	2926	có nghĩ a	21
ACUUCUUCAAUUG AGGAGGUGGC	1831	asCfsuucUfuCfAfau ugAfgGfaggugsgsc	2927	đổi nghĩ a	23
CCACCUCCUCAAU UGAAGAAG	1832	cscsaccuCfcUfCfAf auugaagaagL96	2928	có nghĩ a	21

- 344 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
CUUCUCAAUUGA GGAGGUGGCC	1833	csUfsucuUfcAfAfuu gaGfgAfgguggscsc	2929	đổi nghĩ a	23
CAAGAUGUCCUCG AGAUACUA	1834	csasagauGfuCfCfUf cgagauacuaL96	2930	có nghĩ a	21
UAGUAUCUCGAGG ACAUCUUGAA	1835	usAfsquaUfcUfCfga ggAfcAfucuugsasa	2931	đổi nghĩ a	23
AAGAUGUCCUCGA GAUACUAA	1836	asasgaugUfcCfUfCf gagauacuaaL96	2932	có nghĩ a	21
UUAGUAUCUCGAG GACAUCUUGA	1837	usUfsaguAfuCfUfcg agGfaCfaucusgsa	2933	đổi nghĩ a	23
UGUUCAAGAUGUC CUCGAGAU	1838	usgsuucaAfgAfUfGf uccucgagauL96	2934	có nghĩ a	21
AUCUCGAGGACAU CUUGAACACC	1839	asUfscucGfaGfGfac auCfuUfgaacascsc	2935	đổi nghĩ a	23
GUGUUCAAGAUGU CCUCGAGA	1840	gsusguucAfaGfAfUf guccucgagaL96	2936	có nghĩ a	21

- 345 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:		Chiề u dài
UCUCGAGGACAUC UUGAACACCU	1841	usCfsucgAfgGfAfca ucUfuGfaacacscsu	2937	đổi nghĩ a	23
ACAUGC UAAAUCA GUACUCC	1842	ascsaugcUfaAfAfUf caguacuuccL96	2938	có nghĩ a	21
GGAAGUACUGAUU UAGCAUGUUG	1843	gsGfsaagUfaCfUfga uuUfaGfcaugusug	2939	đổi nghĩ a	23
CAUGC UAAAUUCAG UACUCCA	1844	csasugcuAfaAfUfCf aguacuuccaL96	2940	có nghĩ a	21
UGGAAGUACUGAU UUAGCAUGUU	1845	usGfsgaaGfuAfCfug auUfuAfgcaugsusu	2941	đổi nghĩ a	23
AACAACAUGC UAA AUCAGUAC	1846	asascaacAfuGfCfUf aaaucaguacL96	2942	có nghĩ a	21
GUACUGAUUUAGC AUGUUGUUCA	1847	gsUfsacuGfaUfUfua gcAfuGfuuguuscsa	2943	đổi nghĩ a	23
GAACAACAUGC UAA AAUCAGUA	1848	gsasacaaCfaUfGfCf uaaaucaguaL96	2944	có nghĩ a	21

- 346 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
UACUGAUUUAGCA UGUUGUUCAU	1849	usAfscugAfuUfUfag caUfgUfuguucsasu	2945	đổi nghĩ a	23
GAAAGGCACUGAU GUUCUGAA	1850	gsasaaggCfaCfUfGf auguucugaaL96	2946	có nghĩ a	21
UUCAGAACAUCAG UGCCUUUCCG	1851	usUfscagAfaCfAfuc agUfgCfcuuucscsg	2947	đổi nghĩ a	23
AAAGGCACUGAUG UUCUGAAA	1852	asasaggcAfcUfGfAf uguucugaaaL96	2948	có nghĩ a	21
UUUCAGAACAUCA GUGCCUUUCC	1853	usUfsucaGfaAfCfau caGfuGfccuuuscsc	2949	đổi nghĩ a	23
UGCGGAAAGGCAC UGAUGUUC	1854	usgscggaAfaGfGfCf acugauguucL96	2950	có nghĩ a	21
GAACAUCAGUGCC UUUCCGCACA	1855	gsAfsacaUfcAfGfug ccUfuUfccgcascsa	2951	đổi nghĩ a	23
GUGCGGAAAGGCA CUGAUGUU	1856	gsusgcfgAfaAfGfGf cacugauguuL96	2952	có nghĩ a	21

- 347 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
AACAUCAGUGCCU UUCCGCACAC	1857	asAfscauCfaGfUfgc cuUfuCfcgcacsasc	2953	đổi nghĩ a	23
GUCAGCAUGCCAA UAUGUGUG	1858	gsuscagcAfuGfCfCf aauaugugugL96	2954	có nghĩ a	21
CACACAUAUUGGC AUGCUGACCC	1859	csAfscacAfuAfUfug gcAfuGfcugacscsc	2955	đổi nghĩ a	23
UCAGCAUGCCAAU AUGUGUGG	1860	uscsagcaUfgCfCfAf aauauguguggL96	2956	có nghĩ a	21
CCACACAUAUUGG CAUGCUGACC	1861	csCfsacaCfaUfAfuu ggCfaUfgcugascsc	2957	đổi nghĩ a	23
GAGGGUCAGCAUG CCAAUAUG	1862	gsasggguCfaGfCfAf ugccaauaugL96	2958	có nghĩ a	21
CAUAUUGGCAUGC UGACCCUCUG	1863	csAfsuauUfgGfCfau gcUfgAfcccucsusg	2959	đổi nghĩ a	23
AGAGGGUCAGCAU GCCAAUAU	1864	asgsagggUfcAfGfCf augccaauauL96	2960	có nghĩ a	21

- 348 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
AUAUUGGCAUGCU GACCCUCUGU	1865	asUfsauuGfgCfAfug cuGfaCfccucusgsu	2961	đổi nghĩ a	23
GAUGCUCGGAU GUUGCUGA	1866	gsasugcuCfcGfGfAf auguugcugaL96	2962	có nghĩ a	21
UCAGCAACAUUCC GGAGCAUCCU	1867	usCfsagcAfaCfAfuu ccGfgAfgcaucscsu	2963	đổi nghĩ a	23
AUGCUCGGAUG UUGCUGAA	1868	asusgcucCfgGfAfAf uguugcugaaL96	2964	có nghĩ a	21
UUCAGCAACAUUC CGGAGCAUCC	1869	usUfscagCfaAfCfau ucCfgGfagcauscsc	2965	đổi nghĩ a	23
CAAGGAUGCUCG GAAUGUUG	1870	csasaggaUfgCfUfCf cggauguugL96	2966	có nghĩ a	21
CAACAUUCCGGAG CAUCCUUGGA	1871	csAfsacaUfuCfCfagg agCfaUfccuugsgsa	2967	đổi nghĩ a	23
CCAAGGAUGCUC GGAAUGUU	1872	cscsaaggAfuGfCfUf ccggauguuL96	2968	có nghĩ a	21

- 349 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiều dài
AACAUUCCGGAGC AUCCUUGGAU	1873	asAfscauUfcCfGfga gcAfuCfcuuggsasu	2969	đổi nghĩ a	23
GCGUACAGAUUC AAACUGCC	1874	gscsguaaCfaGfAfUf ucaaacugccL96	2970	có nghĩ a	21
GGCAGUUUGAAUC UGUUACGCAC	1875	gsGfscagUfuUfGfaa ucUfgUfuacgcsasc	2971	đổi nghĩ a	23
CGUACAGAUUCA AACUGCCG	1876	csgsuaacAfgAfUfUf caaacugccgL96	2972	có nghĩ a	21
CGGCAGUUUGAAU CUGUUACGCA	1877	csGfsgcaGfuUfUfga auCfuGfuuacgscsa	2973	đổi nghĩ a	23
AUGUGCGUACAG AUUCAAAAC	1878	asusgugcGfuAfAfCf agauucaaaacL96	2974	có nghĩ a	21
GUUUGAAUCUGUU ACGCACAUCA	1879	gsUfsuugAfaUfCfug uuAfcGfcacauscsa	2975	đổi nghĩ a	23
GAUGUGCGUAACA GAUUCAAA	1880	gsasugugCfgUfAfAf cagauucaaaaL96	2976	có nghĩ a	21

- 350 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:	sợi	Chiề u dài
UUUGAAUCUGUUA CGCACAUCAU	1881	usUfsugaAfuCfUfgu uaCfgCfacaucsasu	2977	đổi nghĩ a	23
AGAGAAGAUGGGC UACAAGGC	1882	asgsagaaGfaUfGfGf gcuacaaggcL96	2978	có nghĩ a	21
GCCUUGUAGCCCA UCUUCUCUGC	1883	gsCfscuuGfuAfGfcc caUfcUfucucusgsc	2979	đổi nghĩ a	23
GAGAAGAUGGGCU ACAAGGCC	1884	gsasgaagAfuGfGfGf cuacaaggccL96	2980	có nghĩ a	21
GGCCUUGUAGCCC AUCUUCUCUG	1885	gsGfscuuUfgUfAfgc ccAfuCfuucucsusg	2981	đổi nghĩ a	23
AGGCAGAGAAGAU GGGCUACA	1886	asgsgcagAfgAfAfGf augggcuacaL96	2982	có nghĩ a	21
UGUAGCCCAUCUU CUCUGCCUGC	1887	usGfsuagCfcCfAfuc uuCfuCfugccusgsc	2983	đổi nghĩ a	23
CAGGCAGAGAAGA UGGGCUAC	1888	csasggcaGfaGfAfAf gaugggcuacL96	2984	có nghĩ a	21

- 351 -

Trình tự không được cải biến	SEQ ID NO:	Trình tự được cải biến	SEQ ID NO:		Chiề u dài
GUAGCCCAUCUUC UCUGCCUGCC	1889	gsUfsagcCfcAfUfcu ucUfcUfgccugscsc	2985	đổi nghĩ a	23

- 352 -

Yêu cầu bảo hộ

1. Tác nhân ARNi sợi kép ức chế sự biểu hiện của hydroxyaxit oxidaza (HAO1) trong tế bào,

trong đó tác nhân ARNi sợi kép có chứa sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa tạo thành vùng mạch kép,

trong đó sợi đối nghĩa có chứa ít nhất 15 nucleotit liên tiếp khác biệt ở không nhiều hơn 3 nucleotit so với trình tự nucleotit 5'-UAUAUUUCCAGGAUGAAAGUCCA-3' (SEQ ID NO: 706);

trong đó tất cả các nucleotit của sợi có nghĩa và tất cả các nucleotit của sợi đối nghĩa chứa cải biến nucleotit, và

trong đó ít nhất một sợi liên hợp với phối tử.

2. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm 1, trong đó ít nhất một trong các cải biến nucleotit được chọn từ nhóm gồm có cải biến nucleotit deoxy-tymin (dT) có đầu tận cùng 3', cải biến nucleotit 2'-O-metyl, cải biến nucleotit 2'-flo, cải biến nucleotit 2'-deoxy, cải biến nucleotit bị khóa, cải biến nucleotit mất bazơ, cải biến nucleotit 2'-amino, cải biến nucleotit 2'-alkyl, cải biến nucleotit morpholino, cải biến phosphoramidat, cải biến nucleotit chứa bazơ không tự nhiên, nucleotit chứa cải biến nhóm 5'-phosphorothioat, nucleotit chứa cải biến 5' phosphat hoặc chất bất chức 5' phosphat, và nucleotit tận cùng liên kết với cải biến dẫn xuất cholesteryl hoặc nhóm bisđexylamit của axit dodecanoic.

3. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm 1 hoặc 2, trong đó tất cả các nucleotit của sợi có nghĩa và tất cả các nucleotit của sợi đối nghĩa độc lập chứa cải biến nucleotit 2'-O-metyl hoặc cải biến nucleotit 2'-flo.

4. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 3, trong đó ít nhất một sợi bao gồm phần nhô 3' có ít nhất 1 nucleotit.

5. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 3, trong đó ít nhất một sợi bao gồm phần nhô ở đầu 3' có ít nhất 2 nucleotit.

- 353 -

6. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 5, trong đó tác nhân này còn bao gồm ít nhất một kết nối phosphorothioat hoặc metylphosphonat liên nucleotit.

7. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm 6, trong đó kết nối phosphorothioat hoặc metylphosphonat liên nucleotit là ở đầu 3' của một sợi.

8. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm 7, trong đó sợi là sợi đối nghĩa.

9. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm 7, trong đó sợi là sợi có nghĩa.

10. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm 6, trong đó kết nối phosphorothioat hoặc metylphosphonat liên nucleotit là ở đầu 5' của một sợi.

11. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm 10, trong đó sợi là sợi đối nghĩa.

12. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm 10, trong đó sợi là sợi có nghĩa.

13. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm 6, trong đó kết nối phosphorothioat hoặc metylphosphonat liên nucleotit là ở cả đầu 5' và 3' của một sợi.

14. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm 13, trong đó sợi là sợi đối nghĩa.

15. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm 6, trong đó tác nhân ARNi này chứa 6-8 liên kết phosphothioat giữa các nucleotit.

16. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm 15, trong đó sợi đối nghĩa bao gồm hai cầu nối phosphorothioat liên nucleotit ở đầu tận cùng 5' và hai cầu nối phosphorothioat liên nucleotit ở đầu tận cùng 3', và sợi có nghĩa bao gồm ít nhất hai cầu nối phosphorothioat liên nucleotit ở đầu tận cùng 5' hoặc đầu tận cùng 3'.

17. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 16, trong đó cặp bazơ ở vị trí 1 của đầu 5' của sợi đối nghĩa của sợi kép là cặp bazơ AU.

18. Tác nhân ARNi sợi kép ức chế sự biểu hiện của hydroxyaxit oxidaza (HAO1) trong tế bào,

trong đó tác nhân ARNi sợi kép bao gồm sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa tạo ra vùng sợi kép,

- 354 -

trong đó sợi có nghĩa có chứa ít nhất 15 nucleotit liên tiếp khác biệt ở không nhiều hơn 3 nucleotit so với trình tự nucleotit GACUUUCAUCCUGGAAUAUA (SEQ ID NO: 589) và sợi đối nghĩa có chứa ít nhất 15 nucleotit liên tiếp khác biệt ở không nhiều hơn 3 nucleotit so với trình tự nucleotit UAUAUUUCCAGGAUGAAAGUCCA (SEQ ID NO: 706),

trong đó tất cả các nucleotit của sợi có nghĩa độc lập bao gồm cải biến được chọn từ nhóm gồm có cải biến 2'-O-metyl và cải biến 2'-floro,

trong đó sợi có nghĩa bao gồm hai kết nối phosphorothioat liên nucleotit ở đầu 5',

trong đó tất cả các nucleotit của sợi đối nghĩa bao gồm cải biến được chọn từ nhóm gồm có cải biến ở 2'-O-metyl và cải biến ở 2'-flo,

trong đó sợi đối nghĩa bao gồm hai kết nối phosphorothioat liên nucleotit ở đầu 5' và hai kết nối phosphorothioat liên nucleotit ở đầu 3', và

trong đó sợi có nghĩa liên hợp với phối tử là một hoặc nhiều dẫn xuất GalNAc.

19. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 18, trong đó vùng sợi kép có chiều dài 15-30 cặp nucleotit.

20. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 19, trong đó mỗi sợi có chiều dài 15-30 nucleotit.

21. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm 20, trong đó mỗi sợi độc lập có chiều dài 19-30 nucleotit.

22. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm 20, trong đó mỗi sợi độc lập có chiều dài 19-25 nucleotit.


23. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm 20, trong đó mỗi sợi độc lập có chiều dài 19-23 nucleotit.

24. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 16, trong đó phối tử là một hoặc nhiều dẫn xuất GalNAc.

25. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 24, trong đó phối tử là một hoặc nhiều dẫn xuất GalNAc được gắn qua liên kết nhánh hóa trị hai hoặc hóa trị ba.


- 355 -

26. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm 25, trong đó phối tử là



27. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 26, trong đó phối tử được gắn vào đầu 3' của sợi có nghĩa.

28. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm 27, trong đó tác nhân ARNi sợi kép liên hợp với phối tử như được thể hiện trong sơ đồ sau đây



trong đó X là O hoặc S.

29. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 28, trong đó sợi có nghĩa có chứa ít nhất 17 nucleotit liên tiếp khác biệt ở không nhiều hơn 3 nucleotit so với trình tự nucleotit UAUAUUUCCAGGAUGAAAGUCCA (SEQ ID NO: 706).

30. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 29, trong đó sợi có nghĩa có chứa ít nhất 17 nucleotit liên tiếp khác biệt ở không nhiều hơn 3 nucleotit so với trình tự nucleotit GACUUUCAUCCUGGAAAUAUA (SEQ ID NO: 589) và sợi đối nghĩa có chứa ít nhất 17 nucleotit liên tiếp khác biệt ở không nhiều hơn 3 nucleotit so với trình tự nucleotit UAUAUUUCCAGGAUGAAAGUCCA (SEQ ID NO: 706).

- 356 -

31. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 30, trong đó sợi có nghĩa có chứa ít nhất 19 nucleotit liên tiếp khác biệt ở không nhiều hơn 3 nucleotit so với trình tự nucleotit UAUAUUUCCAGGAUGAAAGUCCA (SEQ ID NO: 706).

32. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 31, trong đó sợi có nghĩa có chứa ít nhất 19 nucleotit liên tiếp khác biệt ở không nhiều hơn 3 nucleotit so với trình tự nucleotit GACUUUCAUCCUGGAAAUAUA (SEQ ID NO: 589) và sợi đối nghĩa có chứa ít nhất 17 nucleotit liên tiếp khác biệt ở không nhiều hơn 3 nucleotit so với trình tự nucleotit UAUAUUUCCAGGAUGAAAGUCCA (SEQ ID NO: 706).

33. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 32, trong đó sợi có nghĩa có chứa trình tự nucleotit UAUAUUUCCAGGAUGAAAGUCCA (SEQ ID NO: 706).

34. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 33, trong đó sợi có nghĩa có chứa trình tự nucleotit GACUUUCAUCCUGGAAAUAUA (SEQ ID NO: 589) và sợi đối nghĩa có chứa trình tự nucleotit UAUAUUUCCAGGAUGAAAGUCCA (SEQ ID NO: 706).

35. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 34, trong đó sợi có nghĩa gồm trình tự nucleotit UAUAUUUCCAGGAUGAAAGUCCA (SEQ ID NO: 706).

36. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 35, trong đó sợi có nghĩa gồm trình tự nucleotit GACUUUCAUCCUGGAAAUAUA (SEQ ID NO: 589) và sợi đối nghĩa gồm trình tự nucleotit UAUAUUUCCAGGAUGAAAGUCCA (SEQ ID NO: 706).

37. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 36, trong đó sợi có nghĩa chứa trình tự nucleotit 5'-gsascuuuCfaUfCfCfuggaaaua-3' (SEQ ID NO:213) và sợi đối nghĩa chứa trình tự nucleotit 5'-usAfsuauUfuCfCfaggaUfgAfaagucscsa-3' (SEQ ID NO:330),


trong đó a, g, c, và u lần lượt là nucleotit A, G, C, và U được cải biến 2'-O-methyl (2'-OMe); Af, Gf, Cf, và Uf lần lượt là nucleotit A, G, C, và U được cải biến 2'-flo; và s là kết nối phosphorothioat.

- 357 -

38. Tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 37, trong đó sợi có nghĩa chứa trình tự nucleotit 5'-gsascuuuCfaUfCfCfuggaaaua-3' (SEQ ID NO:213) và sợi đối nghĩa chứa trình tự nucleotit 5'-usAfsuauUfuCfCfaggaUfgAfaagucscsa-3' (SEQ ID NO:330),

trong đó a, g, c, và u lần lượt là nucleotit A, G, C, và U được cải biến 2'-O-metyl (2'-OMe); Af, Gf, Cf, và Uf lần lượt là nucleotit A, G, C, và U được cải biến 2'-flo; và s là kết nối phosphorothioat,

trong đó phối tử liên hợp với đầu 3' của sợi có nghĩa như được thể hiện trong sơ đồ sau đây



, trong đó X là O.

39. Tế bào phân lập chứa tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 38.

40. Dược phẩm chứa tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 38.

41. Dược phẩm theo điểm 40, trong đó tác nhân ARNi sợi kép có mặt trong dung dịch không đậm.

42. Dược phẩm theo điểm 41, trong đó dung dịch không đậm là nước.

43. Dược phẩm theo điểm 41, trong đó dung dịch không đậm là nước muối.

44. Dược phẩm theo điểm 40, trong đó tác nhân ARNi sợi kép có mặt trong dung dịch đậm.

46. Được phẩm theo điểm 44, trong đó dung dịch đệm này là nước muối đệm phosphat (PBS).


47. Tác nhân ARNi sợi kép ức chế sự biểu hiện của hydroxyaxit oxidaza (HAO1) trong tế bào,

trong đó tác nhân ARNi sợi kép bao gồm sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa tạo ra vùng sợi kép,

trong đó sợi có nghĩa có chứa trình tự nucleotit 5'- gsascuuuCfaUfCfCfuggaaaaua-3' (SEQ ID NO:213) và sợi đối nghĩa chứa trình tự nucleotit 5'- usAfsuauUfuCfCfaggaUfgAfaagucscsa-3' (SEQ ID NO:330),

trong đó a, g, c, và u lần lượt là nucleotit A, G, C, và U được cải biến 2'-O-metyl (2'-OMe); Af, Gf, Cf, và Uf lần lượt là nucleotit A, G, C, và U được cải biến 2'-flo; và s là kết nối phosphorothioat,

trong đó phối tử liên hợp với đầu 3' của sợi có nghĩa như được thể hiện trong sơ đồ sau đây



48. Tế bào phân lập chứa tác nhân ARNi sợi kép theo điểm 47.

49. Được phẩm chứa tác nhân ARNi sợi kép theo điểm 47.

50. Tác nhân ARNi sợi kép ức chế sự biểu hiện của hydroxyaxit oxidaza (HAO1) trong tế bào,


- 359 -

trong đó tác nhân ARNi sợi kép bao gồm sợi có nghĩa và sợi đối nghĩa tạo ra vùng sợi kép,

trong đó sợi có nghĩa gồm trình tự nucleotit 5'- gsascuuuCfaUfCfCfuggaaaua-3' (SEQ ID NO:213) và sợi đối nghĩa gồm trình tự nucleotit 5'- usAfsuauUfuCfCfaggaUfgAfaagucscsa-3' (SEQ ID NO:330),

trong đó a, g, c, và u lần lượt là nucleotit A, G, C, và U được cải biến 2'-O-metyl (2'-OMe); Af, Gf, Cf, và Uf lần lượt là nucleotit A, G, C, và U được cải biến 2'-flo; và s là kết nối phosphorothioat,

trong đó phối tử liên hợp với đầu 3' của sợi có nghĩa như được thể hiện trong sơ đồ sau đây



51. Tế bào phân lập chứa tác nhân ARNi sợi kép theo điểm 50.
52. Dược phẩm chứa tác nhân ARNi sợi kép theo điểm 50.
53. Phương pháp ức chế *in vitro* sự biểu hiện HAO1 trong tế bào, phương pháp này bao gồm các bước:
 - (a) cho tế bào tiếp xúc với tác nhân ARNi sợi kép theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 38, 47, và 50, hoặc dược phẩm theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 40 đến 46, 49, và 52; và
 - (b) duy trì tế bào sản xuất được trong bước (a) trong thời gian đủ để đạt được sự thoái hóa của bản phiên mã mARN của gen HAO1, bằng cách đó ức chế sự biểu hiện của gen HAO1 trong tế bào.


(SEQ ID NO:1) .
>gi|11184232|ref|NM_017545.2| Hydroxylase oxidase (glycolate oxidase) 1 (HAO1)Homo sapiens, mARN
CTGGATAGCAATAACCTGTGAAATGCTCCCCGGCTAATTTGTATCAATGATATGAACAACATGCTA
AATCAGTACTTCCAAAGTCTATATATGACTATTACAGGTCTGGGCAATGATGAAGAACTTTGGCTGA
TAATATTGCAGCAATTTCCAGATGGAAGCTGTATCCAAAGGATGCTCCGGAATGTTGCTGAACAGATCTG
TCGACTTCTGTTTAAAGACAGAGGTGACATGCCAATATGTTGGGGCTACGGCCATGCAGCGCATGG
CTCATGTGGACGGAGCTTGCCACTGTGAGAGCTGTGAGTCCCTGGGAACGGGCATGATGTTGAGTTT
CTGGGCCACCTCCTCAATTGAAGAAGTGGCGGAGCTGTGAGGACCTTCCGTCAGGACCTTCCGTCGCTGCAACTGTAT
ATCTCAAGGACCGAGAGTCAACCAAGAGCTAGTGGCAGGACAGAGATGGCTAACAGATTCAAACTGCCGCC
TTGTGACAGTGGACACACCTTACCTGGGCAACCGTCTGGATGATGTCGTAACAGATTCAAATGGCTGA
ACAACCTAGGATGAAATTTTGAACACAGTACCTTATCATTTCTCTGAGGAAAATTTGGAGACGAC
AGTGAAGTGTGATATGTGGCTAAAGCAATAGACCACTATCAGCTGGAGAGATATCAATGGCTGA
GAAGCTGACATCATTTGCCAATTTGTGCAAGGGCATTTTGAAGGTGATGATGCCAGGAGTCTTCTGGACGGGCTGTAA
ACATGGCTTGAATGGATCTTGGTGTGCAATCATGGGCTCGCAACTCGATGGGTGCCAGGCTGTGCGGA
GATGTTCTGCCAGAAATTTGGAGGCTGTGGAAGGAGGTGGAAGTCTTCTGGCCCAAGGCTGTGTTGGGAGACCAATCGTTG
AAGGCACTGATCTTGAAGCTCTGGCTTTGGCCCAAGGCTGTGAGATGCTCGACAGACATTTGTTGAGGAAAATCCTTTGG
GGCTTAGCTTCCAGGGGGAGAAAGGTGTTCAAGATGCTCGACAGACATTTTTCAGCATGATTAATCTTG
GCCATGGCTCTGAGTGGTGCCAGAAATGTGAAAGTCAAGATGCTCGACAGACATTTTTCAGCATGATTAATCTTG
CCGTTTCCAAAGATCTGACAGTGACAAATATTTTCCCATCTGTAATTTTCAATACAAAGGGTGTGCTCT
ACAAAGAGACACTGTGACAGGGTGACCAAGTCTGTAATTTCCCACTTCAATGAGGTCTCTAGGAACCTTT
TTTCCAAACAAATAGCAATCCCTTTTATTTTCAATGCTTTTGAATTTTCAATGAGGTCTCTAGGAACCTTT
TAGAAAGAAATGGACTTTTCACTCTGGAATATAATTAATGTTTAAATTTGAGGTAGCAACACTAAGGT
ACAAGCTCATCCCCCTGGCAGGCTAAAGTGTGATATCTTTAGTAAATTTGAGGTAGCAACACTAAGGT
GAAAGATAATGATCTCATTTGTTTATTAACCTGTATTTCTGTTACATGCTTTTAAACAGTGGTCTTAA
ATTGTAAGCTCAGGTTCAAAGTGTGGTAAATGCTGATTCACAACTTTGAGAGGTAGCACTGGAGAGAA
TTGGAATGGGTGGCGGTAATTTGGTGAATCTTTTGAATGTAGATTTCCAAATCAATCTTTAGTGTCTGA
ATAATCCAAATGTTTATAGGATGATGTTACTTCTTAGAGAGAAATAAGCATTTTGGGAGAAAT

HÌNH 1


2/30

(SEQ ID NO:2)
 >gi|133893166|ref|NM_010403.2| Hydroxyait oxidaza 1, ♂ gan (Hao1) Mus musculus , mARN
 GGTGCCCCACCAATGTTGGCTCGACTGGTCTGCATCAGTGATTATGAACAGCATGTCGGATC
 AGTGCTCAGAAAGTCAGTGATGACTATTACAGGTCTGGGCAAAATGATCAGGAGCGTTAGCTGATAAC
 ATCCAAGCATTTTCTAGATGGAAGCTCTATCCACGGATGCTCGCAACGTTGCTGATATCGATCTGTCAA
 CTTCTGTTTAGGACAGAGATCAGCATGCCAATATGTTGGGCTACTGCCATGCAGTGCATGGCTCA
 CGTGACGGGAGCTGGCCACTGTGGAGCCTGTTCAGACCATGGGAACCTGGCATGATGCTGAGTTCTTGG
 GCTACCTCTCAATAGAAGAGTGGCAGAAGCTGGCCAGAGGCACTTCGCTGGATGCAACTGTACATCT
 ACAAAGCCGTGAGATCAGCAGACAGATAGTGAAGCGAGCTGGAAGCAGGGTTACAAGGCCATATTGT
 GACTGTGACACCCCTTACCCTGGGCAACCGCATTTGATGACGTCGGGAACAGGTTCAAGCTGCCACACAA
 CTCAGGATGAAAACCTTTGAACCAATGATTTGGCACTTTCTCCTAAGGAAATTTTGGAGACAAACAGTG
 GACTTGTGATATGTCACCAAGCTATAGCCCATCTCTCAGCTGGATGATATACATGGCTCAGACG
 ATTGACATCAGTCCCTATTGTTGTAAAGGGCAATTTGAGAGGTGATGATGCCAAGGAAGCTGTTAAACAT
 GGTGTGATGGGATCTTGGTGTGGAATCATGGGCGCGACAACCTGGATGGGTGCCAGCTACTATTGATG
 TCCTGCCAGAGATTGTTGAGGCTGTGGAAGGGAAGGTAGAGTCTTCTCGATGGGAGAACCCATCATCTGGGGC
 TACTGATGTTCTCAAAGCTCTGGCCCTAGGAGCCCAAGCCGTTTTTGTGGGAAGACCCATCATCTGGGCA
 TTGGCTTTCCAGGGGGAAGGTTTCAAGATGTCCTCGAGATATTGAAGGAAGAATCCCTTGGCTGT
 TGCTCTGAGTGGTGCAGAAATGTGGAAGTCAATCCACAGACATTTGGTGAAGGAAATCCCTTGGCTGT
 TTCCAAGATCTGACAGTGCAATATTTTCCCATCTGTATTATTTTTTTTCCAGCGTGGATTACTTGACA
 AAGAGACATGTGCAGAGGTGACACAGACTGTAACTCCCACTTCTATACAAAGGCTGTCTCTTTT
 CCAACAAATAGCCACCCCTTTTCTTCAATGCTTTTGTGCTTTTCAATGGGTGCTCTAGGAACCTTCTAG
 AAGAAATGGACTTGCACTCCGAAATATATACTGTAAAGAAACATTTGAAATGTTGTTGGCA
 ACGTCATCCCTGGCAGGCTAAAGTGTGGGGAACAAAGATATCTCTGTGAGATTGCGAGTAGCATG
 CTGAAGTGAAGATACCTGACCTCACTGTTTCAATTAACCTGCTCTCTGTTTAGATTCTCTTAAGACAGTGGC
 TCTTACAGTTGACACTTGGCTTTGAAATGCTGGAAATGCCAGAGAAACATGAGGTTTGGATTGGCCATG
 TTGAGAAATAGACACCCCTAATTTTTTTGAAGGTAGATTTTTAGCTATATATCACACGCTCTGAATATGCTGGA
 CATTTTTTAACACACCCCTAATTTTTTTGAAGGTAGATTTTTAGCTATATATCACACGCTCTGAATATGCTGGA
 TGTTTTGTGGCACTCATTTGCAATTTGAAAGGATGTCTAGTCCAGTGTGGGACCAACATGGAGCTATTTTT
 ACTTTTGAACCTTGTCTCCTCATTTTAAATAAAGTGTGATCTTCCCTAATTCCTCTTTGAAATCTTT
 TTTGATTTTCTCCTCATTTATATAGTCACATTCAGTGTAAAGTACATATTTTGTGGGTCCTGGA
 TGAATAAAGATTGAAATCTTGTTCAGAGGAAGGCAAAAAAAGTCTTTTCTTTTATCACA


HÌNH 2




HÌNH 3A




HÌNH 3B




HÌNH 4A



HÌNH 4B




HÌNH 5B




HÌNH 5A

Bất hoạt AGXT ở gan




HÌNH 6A

6/30




HÌNH 6B

7/30



HÌNH 6C



HÌNH 6D

9/30

(SEQ ID NO:3)
 ATCTTCCCAAAATGCTTTATTTCTCTCTAAGAAGTAACATACATCCTAAACAATTGGATATATTTCAGACACTAAAGA
 TGTGATTGGAAATCTACATTCAAAGAAGTATACCAAAATTACGGCCACCCATTCCAATCTCTCCAAGTGTACCTTCTCAA
 AGTTGTGAATCAGGCATTACCAACACTTTGAACCTGAGCTTACAATTTAAGAACCACTGTTTTAAAGACATGTAAACAGA
 ATACAGGTTAATAAACAATGAGATCATTTCTTTTCAATGTTTTCTTTTAAACAGTTAATATATTCCAGGATGAA
 TTTAGCCCTGCCAGGGATGACGTTGTCTAAACACATTTTCAATGTTTTCTTTTAAACAGTTAATATATTCCAGGATGAA
 AGTCCATTCTTTCTAAAGGTTCTTAGGACACCCATTGAAAAGTCAAAAGCAATGAATAAAAGGATTGCTATTGTCAAG
 TGGAAAAGAACGACACCCCTTTGTAATTGAAGTGGGAATTACAGACTGTGTCAACCTCTGCACAGTGTCTCTTTGTCAAG
 TAATACATGCTGAAAAAATAATACAGATGGGAAAAATATTGTGCACGTGTCAGATCTTTGGAAACGGCCAAAGGATTTTC
 CTCACCAATGTCTGTGATGACTTTACATTTCTGGCACCCACTCAGAGCCATGGCCAAACCGGAATTCTTCTTTAGTAT
 CTCGAGGACATCTTGAACACCTTTCTCCCCCTGGAAGCTAAGCCCCAAACGATTGGTCTCCCCACAACAACAGCCTTGG
 CGCCAAAGCCAGAGCTTTCAGAACATCAGTGCCTTTCCGCACACCCCGTCCAGGAAGACTTCCACCTTCCCTTCCACA
 GCCTCCACAATTTCTGGCAGAACATCAATAGTGGCTGGACCCCATCGAGTGTGAGCCCCATGATTCGACACCAAGAT
 CCCATTCAAGCCATGTTTAAACAGCCTCCCTGSCATCATCACCTCTCAAAATGCCCTTTGCAACAATTGGCAATGATGTCA
 GTCCTCTCAGCCATTGATATCTTCCAGCTGATAGATGGGTCTATTGCTTTAGCCACATATGCAGCAAGTCCACTGTCTG
 TCTCCAAAAATTTCTCAGGAGAAATGATAAAGTACTGGTTTCAAAATTTTCACTGAGTTGTGGCGCAGTTTGAA
 TCTGTTACGCACATCATCCAGACGGTTGCCAGGTAAAGGTGTGTCCACTGTCAAAATATGGCCTGTAGCCCCATCTTCT
 CTGCTGCCGCACTAGCTTCTTGGTGACTTCTCGGTCTTGTAGATATACAGTTGCAGCCCAACGAAGTCCCTCAGGACCA
 GCTTCCGCCACTTCTTCAATTGAGGAGGTGGCCAGGAACCTCAACATCATGCCCGTCCAGGGACTGACAGGCTCTCAC
 AGTGGCAAGCTGCCGTCCACATGAGCCATGCGCTGCATGGCCGTAGCCCCACACATATTGGCATGTGACCCCTCTGTC
 CTAAACAGAAGTCGACAGATCTGTTTTCAGCAACATTCGGAGCATCTCTGGATACAGCTTCCATCTGGAAATGCTGCA
 ATATTATCAGCCAAAGTTTCTTCAATTTGCCCCCAGACCTGTAATAGTCATATATAGACTTTTGGAAAGTACTGATTTAGC
 ATGTTGTTCAATAATCATTTGATACAAAAATTAGCCGGGGAGCATTTTTCACAGGTTATTGCTATCCCCAG

HÌNH 7

(SEQ ID NO: 4)

TGTCATAAAAGGAAAGACTTTTTTTTTTTTTTGGCTTCCTTCTGAAACAAGAAATTCAAATCTTTTATTCATCAGGACCCCAAAAATATGTACTTTTAC
ACTGAATGTGACTATAAATGAGGAAAAGTCAGAAAAATCAAAAAGATCAAGAGGAATTAGGAAGTCAACACTTATTTTAAATGAGAAATGAGGAGAC
AAAGTTCAAAGTAAAAATAGCTCCATGTGTGCCAATCGGATGACACATCCCTTTCAAATGCAATGAGTGCCCAAAAACATCCAGACATATTCAG
ACGTGTGATATATAGCTAAAAATCTACCTTCAAAAAATGAGGTGTAAAAAATGAAAAGTTCTAGAAAAAATCACAAATTAACCACTCCATTT
CAATCTACCTGTGTATTTCTCAACATGGCAAAATCCAAACCTCATGTCTCTGGGCATTTCCAGCATTTCAAAGCCCAAGTGCAAACTGTAAAGAG
CCACTGTCTTAAGGAAATCTAAACAGAAAGACAGGTTAATGAACAGTCAGGTTCAGTATCTTTCACTTCAGCATGCTACCTGCAATCTCACCAGAGGATTA
TCTTTTGTTCGCCAGCACTTTAGCCTGCCAGGGTACGTTGCCCAACACATTTTCAATGTTTTCTTTTAAACAGTTAATATATTTCCAGAGTGCA
AGTCCATTTCTTCTPAGAAGTTCTTAGGACACCCATGAAAAGTCAAAAAGCAATGAAGGAAAAGGGGTGGCTATTTTGTGGAAAAAAGAACGACACCC
TTGTATAGAAGTGGGAGTTACAGTGTGTGTGTCACCTCTGCACAGTGTCTCTTTGTCAAGTAAATCCACGCTGGAAAAAATAATACAGATGGGAA
AATATTGTGCATCTTCCTTCAATATCTCGAGGACATCTGAAACACTTTCTCCCTCGGAAAGCCAGCCCAAGATGAGTGGGTCTTCCACAAAAA
GGCCAGTCGGAAATTCCTTCCATATCTCGAGGACATCTGAAACACTTTCTCCCTTACTCCCCATCCAGGAAGACTTCTACTCTCCCTCCACAGCCTCAACA
CGCTGTGGCTCCTAGGGCCAGAGCTTTGAGAACATCAGTACTTTCTTACTCCCCATCCAGGACCAAGATCCCATCCACCATGTTTAAACAGCTTC
ATCTGTGGCAGACATCAATAGTAGCTGGCACCCTCCAGTGTGCGGCCCATGATTCGACACCAAGATCCCATCCACCATGATGAGAGATGGGTCTA
CTTGGCATCATCACTCTCMAATGCCCCCTTACAAATAGGCAAGTGTCAATCGTCTGAGCCATGTAATATCATCCACAGCTGAGAGATGGGTCTA
TAGCTGTGCCACATATTCAGCAAGTCCACTGTGTCTCCAAAATTTCCCTTAGGAGAAAATGCCAAATCATTTGGTTTCAAAGTTTTCATCTCTGAGT
TGCTGTGGCAGCTTGAACCTGTTCCGACGTCATCAATGCGGTTCGCCAGGTAGGGGTGTCCACAGTCACAAAATATGCGCTTGTAAACCTGTCTCTC
AGTCCGCTTCACTATCTGTCTGTGATCTCAGGTCCTTTGTAGATGTACAGTTGCAATCCAGCGAATGCCTCTGGGCCAGCTTGTGCCACTTCTTCTA
TTGAGGAGGTAGCCCCAAGAACTCAGCATATGCCAGTTCCCATGTGTGACAGGCTCGCACAGATCGATATCAGCAACGTTGCGAAGCATCCGTGGGATA
ATGGCAGTAGCCCCAACACATATTGGCATGCTGACTCTCTGTCTCTAAACAGAAATTGACAGATCGATATCAGCAACGTTGCGAAGCATCCGTGGGATA
GAGCTTCCATCTAGAAAATGCTTTGGATGTTATCAGCTAACGTCCTCTGATCAATTTGCCCCAGACCTCTGTAATAGTCAATACACTGACTTCTGAAGCACTG
ATCGGACATGCTGTTCATAATCACTGATCGACACCAAGTCGAGGCAACATTTGTGGCAGGGTAGGGCAACC

8 HINH

11/30

(SEQ ID NO:5) .
 >gi|544464345|ref|XM 005568381.1| PREDICTED: Hydroxyxiti oxidaza (glycolat oxidaza) 1 (HAO1)

Macaca fascicularis, mARN
 GTGAGGATGAGAAAGCAATACATTAAAAAAACCCAAAAACCTCCATCTGGGATAACAATAACCTGTGA
 AAATGCTCCCCGGCTAATTGTATCAATGATATATGAACAACATGCTAAATCAGTACTTCCAAAGTCTAT
 ATATGACTATTATAGGCTGGAGCAATGATGAAGAAACTTTGGCCGATATGTTGCAGCATTTTCCAGA
 TGAAGCTGTATCCAGGATGCTCCGGAATGTGCTGAAACAGATCTGTCGACTTCTGTTTGTAGGACAGA
 GGGTCAGCATGCCAATATGCGTGGGGCCACGGCCATGCAAGCCATGGCTCATGTGGATGGCGAGCTTGC
 CACTGTGGAGCCCTGTCACTCCCTGGGAACGGGCAATGATGTTGAGTTCTTGGCCACCTCTCAATTGAA
 GAATGGCAGAAAGCTGCTCTGAGGCACCTTCGTTGTTGTAAGTATATCTATAAGGACCGAGAAAGTCA
 CCAAGAAGCTGGTGACGAGCAGAGAAAGACGGGCTACAGGCCATATTTGTGAGATGACAGTGGACTTCTGCATATGTGG
 CCTGGCAACCGTCTTGATGATGTACGTAAACAGATTCAGTCCAGCTGCCACCACTCAGGATGAAATATTT
 GAAACAGTACTTTATCAATTTCTCTGAGGAAATATCAATGGCTGAGAAAGATTCAAATGGCTGAGAAAGACTGACGTCATTTGCCAAT
 CTAAGCCGATAGACCCATCTATCAGCTGGGAAGATATCCAGGGAGGCTGTAAACATGGCTTGAATGGGATCTTG
 TGTGCAAAAGGGCATTTGAGAGGTGATGATGCCAGGGAGGCTGTAAACATGGCTTGAATGGGATCTTG
 GTGTGCAATCATGGGCTCGAACAATCTCTGATGGGTGCCAGCCACTATGATGTTCTGCCAGAAATTTGG
 AGGCCGTGGAAGGAAGGTGGAAGCTCTCTGGACGGGGGTGTCGGAAAGGCACATGATGTTCTGAAAGC
 TCTGGCTCTGGGCCCAAGGCTGTGTTGTGGGGAGACCAATCATTTGGGCTTAGCTTTCCAGGGGGAG
 AAAGGTGTTCAAGATGCTCTTGAGATACATAAGGAAGAAATTCCTTTGGCCGTTTCCAAGATCTGACAGTG
 AGAATGTGAAAGTCAACAGACATTTGGTGAGGAAATAATCCCTTTGGCCGTTTCCAAGATCTGACAGTG
 CACAATAATTTCCCATCTGTATTTATTTTTCAGCATGTATTTACTTGACAAAGAGACACTGTGACAGAG
 GGTGACCACAGTCTGTAATCCCCACTTCAATACAAAGGATGTCGTTCTTTCCAAACAAATAGCAATCC
 CTTTGTAGTTCAATTTGACTTTTCAATGGGTCTCTAGGAACCTTTTAGAAAGAAATGGACTTTTCAT
 CCTGGAAATATATTAAGTGTAAAGAAACATGAAATGTGTTAGACAACTCATCTCTGGCAGG
 CTAAGTACTGTATCCTTTAGTAATAATGGAGGTAGCAACACATAAGGTGAAAGATAATGATCTCATTTG
 TTTATTAACCTGTATCTGTTTGTAGATGTCCTTTAAACAGTGGTCTTAAATTTGTAAGCTCAGGTTCAAG
 CATTTGGAATGCTGTGATGACAAACATTGAGAAGTAGCCCTGGATAGAATTTGGAATGGATGGCAGTAAC
 GGTGATACCTCTTTGGAATGCACTTTCCAATCACAATCTTTAGTGTCTGAATATATCCAAATGTTTATAGGA
 TATATGTTACTTCTTAATCAGAGAGAAATAAAGCATTTTTTTGGGAAGGATA

HÌNH 9

12/30

(SEQ ID NO: 6) .
 >gi|564343200|ref|XM_006235096.1| PREDICTED : Hydroxyxit oxidaza (glycolat oxidaza) 1 (HA01) Rattus norvegicus,
 biến thể phiên mã X1,)
 mRNAATACGCTTGGCTTGGAAATCTAGAGTTCTGAGGATAGTAGACTTGGTGACCTCCAAAGTTCTAACCGAGACAGAAAGAGTCTCATGG
 CTTCTGTGACTACTATAGTGGAGCTCTATCCACGGATGCTCGCAAGTTGCTGATATCGACCTCTCGACTTCTGTTTATAGGACAGAGAGTGAGCAT
 GCCAATATGGGTGGGCTACGGCTATGCAGTGCAATGGCTCATGAGATGGGAGCTGGCCACTGTTCGAGCCTGTGAGACCATGGGAACATGGCATGA
 TGTGAGTTCTTGGGCCACTTCTCAATAGAGAGGTGGCAGAGGCTGGCCCGGAGGCACCTTCGCTGGACACCCCTTACCTGGGAAATCGCTTCGATGATGT
 GTCAGCAGTCAGTAGTGAAGAGGGCTGAGCAGATGGGTACAAGGCCATATTTGTGACTGTGGACACCCCTTACCTAGGGAAATTTTGGAGACAACAGTG
 GCGGAACAGGTTCAAGCTACCAACAGCTACAGATGAAATACTTTGAACCAACGATTTGGCAATTTCTCCTAAGGGAAATTTTGGAGACAACAGTG
 GCCTTGCTGAATATGTGGCACAAGCCATAGACCAATCTCTCAGCTGGATGGATATTAATGGCTCAGACGGTTGACCTCACCTGCCCCATTTCTGTAAAG
 GGAATTTGAGAGGTGATGCCCCAGGAAGCTGTAAACATGGTGGATGGATCTTCTGATGGGGACGACAACTGGATGGGGTGCC
 AGCTACTATTGATGCOCTGGAGCCAGAGATCGTTGAGGCTGTGGAAGGAGTGAAGTCTTCTGATGGGCTGGCTTCCAGGGGAGAAAGGTGTTCAAGATGTCCTCGAG
 AAGCTCTGGCCCTGGAGCCAGAGCTGTTTCTGAGTGGGTGCCAGATGTGAAGTCAATCGACAAGACATGGTGAGGAAATAATCCTTTGGCTGT
 ATACTGAAGGAAGATTCCGGCTGGCCATGGCTCTGAGTGGGTGCCAGATGTGAAGTCAATCGACAAGACATGGTGAGGAAATAATCCTTTGGCTGT
 TTCCAAGATCTGACAGTGCAATAATTTTCCCATCTGTATTAATTTTCCAGCAATAATAGCCACCCCTTCTCCTTCAATGCTTTGACTTTTCAATGGGTGCTT
 ACTGTAACCTCCCACTTCAACACAAGGCTGCTGTTCTTCTGGAATAATACTGTTAAAGAAACATTTGAATAATGTTTGGGCAACGTCATCCCCCTGGC
 AGGAACCTTCTAGAAAGATGGACTTGCAATCCCTGGAATAATACTGTTAAAGAGTAGCATGCCGAGTAAAGACACATGACCTCACTGTTTATTAACCTGTCTT
 AGGTAAAGTGAAGGGGAACAAAGATATCCTCTGGTGAATGGAGGTAGCATGCCGAGTAAAGACATGAGCCCTCACTGTTTATTAACCTGTCTT
 CTGTTTAGATTTCTTAAGACAGTGGCTCTTACAGTGTGGCTGGCTTTGAAATGCCGGAATGCCAGAGAAACATGGGGTTGGATTGGCCGTGT
 TGAGAAATAGCACCCGATAGAAATGAAACGGATGGTGGTAAATTTGTGATTTTCTAGAGACTTTTCAATTTTAAACACCCCTATTTCTTTGAAGGTGG
 ATTTCTAGCTATATATCGCATGTCTGAATATGTCTGGCTGTTTGTGGCACTCACTGTGTGTTGAAAGGAATGTGTCTAGTCCACTTGGGACCATGCAA
 AGTTATTTTATTTTGAACCTCTGCTCTTCATTTCCCAATTTTAAAGTGTGACTTCTCTAAATTTCCCTTGAATCATTTTATTTTCTCCTCCTCA
 TTTATAGTCACATTCAGTGTCAAGTATATATTTTGTGGGTCCATGCTGAATAAAGCTTTTAAATAATTTCTTGTCCAGAAA

HÌNH 10

13/30


(SEQ ID NO: 7)
TATCCCTCCCAAAAAATGCTTTATTTCTCTGATTAAGAAAGTAACATATATATCTTAAACATTTGGATATATTCAGACACTAAAGATGTGATTGGAA
AGCTGCATTCARAGAAGTATCCACCAGTTACTGCCATCCATTCCAAATCTATCCAGGGTACCCTCTCAATGTGTCAATCAGGCCATTTCCAATGCTT
TGAACCTGAGCTTACAAATTTAAGAACCACTGTTTAAAGACATCTAAAGACATATACAGATATACAGATCATTAATCTTTTCACTTTTAAACAGTTA
TTTGCTACCTCCAAATTTTACTAAAGGATACAGTACTTTAGCCTGCCAGAGGATGACGTTGTCTAAACACATTTTCAATGTCTTTTAAACAGTTA
ATATATTTCCAGGATGAAAGTCCATTTTCTTCTAAAGGATACAGTACTGCTGCTACCCCTCTGACAGTGTCTTTGTCAAGTAATACATGCTGCAAT
TTGGAAAAGAACGACATCCCTTTGTATTGAAAGTGGGAAATTAACAGCTGTGCTACCCCTTGGAAACGGCCAAAGGATTTTCCACCAATGTCTTGTGATGACTTTCACAT
AAAAATAACAGATGGGAAAATATTGTGCACTGTGACATCTTCTTTAGTATCTCAAGACATCTTGAAACACCTTTCTCCCTGGAAGCTAAGCCCCAA
CTGGCACCCACTCAAGCCATGGCCAAACCGGAATCTTCTTTAGTATCTCAAGACATCTTGAAACACCTTTCTCCGACACCCCCGTCCAGGAAGACTTCCA
ATGATTTGGTCTCCCCACAAACACAGCCTTGGCCCAAGAGCCAGAGCTTTTCAGAACATCAGTGGCTTTCCGACACACCCCCGTCCAGGAAGACTTCCA
CCTTCCCTTCCACGGCTCCACAAATTTCTGGCAGAACATCAATAGTGGCTGGCAACCCATCGAGTTGTGAGGCCCATGCTTCTCAGCCATTGATA
ATCAAGCCATGTTTAAACAGCCTCCCTGGCATCATCACCTCTCAAAATGCCCTTTGCAACAAATTTGGCAATGACGTCAGTCTTCCAAATTTTCTCAGGAGAAAATGATAAGTAC
TCTTCCAGCTGATAGATGGGTCTATCGCTTTAGCCACATATGCAGCAAGTCCACTGTCTCATCTCCAAATTTTCTCAGGAGAAAATGATAAGTAC
TGGTTCAAAATTTTTCATCCTGAGTTGTGGCAGCTTGAATCTGTTACGTACATCAAGACGGTTGCCAGGTAAGGTGTGTCCACTGTCCAC
AAATATGGCTTGTAGCCCGTCTCTGCTGCTGCAACCAAGCTTCTGTTGGTGAATCTCTCGCTCTTATAGATAATACAGTTACAAACCAAGAGTGGC
TCAGGACCAAGCTTGTGCCACTTCTCAATGAGGAGGTGGCCCAAGAACTCAACATCATGCGCGTTCCAGGACTGACAGGCTCGCACAGTGGCAA
GCTCGCCATCCACATGAGCCATGCGCTGCATGGCCGTGGCCCGCCAGCATATTTGGCATGCTGACCCCTGTGCTCTTAAACAGAAAGTCCAGACCTA
TTCAGCAACATCCGGAGCATCTTGGATACAGCTTCCATCTGGAAAATGCTGCAACATTTATCGGCCAAAGTTTCTTCAATCTTGTCTCCAGACCTA
TAATAGTCAATATAGACTTTTGGAAAGTACTGATTTAGCATGTTGTTTCAATAATCATTTGATGATAAAATAGCCGGGGGAGCATTTTTCACAGGTTATTGTT
ATCCACAGATGGAGTTTTTTGGTTTTTTTTTAATGTAATGTATTGCTTTTCTACATCCTCAC

HÌNH 11

14/30


(SEQ ID NO:8)
TTTCTGGACAAGAAATTTAAAGCTTTTATTCACCATGGAGCCCAAAATATATATACCTGACACTGAATCTGACTATATAATGAGAAGTGAGAAAAATAA
AAATGATTCAAGGGGAATTAGGAAGTCACACTTACTTTAAATGGGAATGAAGAGACAGAGTTTCAAAAATAAATAAATAAATCTTTGTCATGCTCCCAAGT
GGACTAGACACATCTCTTCAACACAGTGAAGTCCACAAAACAGCCAGACATATTCAGACATGCGATATATAGCTAGAAATCCACCTTCAAAAGAA
ATAGGGTGTAAATAAATGAAGTCTCTAGAAAAATCACAATTTACCACCATCCGTTTCAATTTCTATCGGTGCTATTTTCTCAACACACGCGCAATC
CAACCCCATGTTTCTCTGGGCATTTCCGGCATTTCAAGCCCAAGCCGACACTGTAAGAGCCACTGCTTTAAGGAAATCTAAACAGAAAGACAGGTT
AATAAACAGTGAAGTCAGTCTTTTACTTTCCGCAATGCTACCTCCAATCTCACAGAGGATATCTTTTGTTCCTCCCTTCTTTAGCCTGCCAGGGG
ATGACGTTGCCCAACACATTTTCAATGTTTCTTTTAAACAGTTAATATATTTCCAGGATGCAAGTCCATTTTCTTTCTAGAAGGTTCTTAGGACA
CCCATTTGAAAGTCAAAAGCAATGAAGGAGAGGGGTGGCTATTTTGTGGAAAAAGAACGACACCCCTTTGTGTGAAGTGGGAGTTACAGTCTGT
GGTCACCTCTGACAGTCTCTTTGTCAAGTAATCCATGCTGGAAAAAATAATACAGATGGGAAATAATTTGTGCACTGTTCAGATCTTTGGAAAC
AGCCAAAGGATTTTCTCACCACATGCTTTGTGCGATGACTTTCACATTTGGCACCCACTCAGAGCCATGGCCAGCGCGGAACCTTTCTTCAGTAT
CTCGAGGACATCTTGAACACACCTTTCTCCCTGGAAAGCCCAAGCCCAAGATGATGGTCTCCCCACAAAACAGCTCTGGCTCCAGGGCCATCAATAGT
TTTGAGAACATCGGTGCCCTTCTGACTCCCCATCCAGGAAGACTTCTACCTTCCCTTCCACAGCTCAACGATCTCTGGCTCCACATATTC
AGCTGGCAACCATCCAGTTGTCGCCCCATGATTCGACACTAAGATCCCATCCACACCATGTTTAAACAGCTTCTGGGCAATCATCACCTCTCAA
AATTTCCCTTACAAACAATGGGCAGTGAGTCAACCGTCTGAGCCATTAATATCATCCCCAGCTGAGAGATGGTCTATGGCTGTGGTAGCTTGAA
AGCAAGGCCACTGTTGCTCCAAATTTCCCTTAGGAGAAAAATGCCAAATCGTTGGTTTCAAGTTTTCATCTGAGCTGTGGTGGTAGCTTGAA
CCTGTTCCGCACATCATCGAAGCGATTTCCAGGTAAGGGGTGTCACAGTCAAAATATAGGCCCTGTAAACCCATCTGCTCAGCCCTCTTCTATGAGGAAGTGGC
CTGACTGTGACCTCAGATCTTTGTAGATGTAGAGTTGCATCCAGGAAAGTGCCTCCGGGCCAGCTCTGCCACCTCTTCTATGAGGAGTGGC
CCAGGAACCTCAATCATGCCAGTTCCCATGGTCTGACAGGCTCGAACAGTGGCCAGCTCCCATCCCATGAGCCATGCACTGCATAGCCGTAGC
CCCAACGCATATTGGCATGCTCACTCTCTGTCTCTTAAACAGAAAGTCGACAGTCTGATATCAGCAACGTTGCGCAGCATCCGTGGATAGAGCTTCCA
CTATAGTAGTCACAGAACCATGAGACTCTTTCTGCTCGGTAGAACTTGGAGGTCAACCAAGTCTACTATGCTCAGAAACTCTAGAAATTTCCAAA
GCCAGCAAGGCAGTAT

HÌNH 12



HÌNH 13


16/30



HÌNH 14


17/30

Liều lượng Đơn lẻ Ngày 10



HÌNH 15

18/30





HÌNH 16



19/30

**HÌNH 17**

20/30




HÌNH 18





HÌNH 19

22/30




HÌNH 20

23/30




HÌNH 21

24/30




HÌNH 22

25/30





HÌNH 23


26/30



HÌNH 24




HÌNH 25A





HÌNH 25B

29/30



HÌNH 26

30/30



HÌNH 27